

MAR

CAR

YHS

PVS

IA



ISAGOGAE Breues / plucide
 ac uberrime / In Anatomia hu-
 mani corporis a cõmun i Me-
 dicorũ Academia usitatã a
 Carlo in Almo Bononiẽ /
 si Gymnasio Ordinariã
 Chirurgiẽ Docẽte ad
 suorũ Scholasticorũ
 feces in lucem edi-
 date



¶ Nicolaus Bargilefius Bononi.

Iactavit quondam claro se Felfina alumno /
Italię sum mum Felfina docta decus :
Gręcia culta fuos cui non componere honores
Audeat : aut celebres promere Roma viros .
Inclita Mundini quam primum fcripta difendi
Affidua uidit uoluere quemq; manu .
Nunc uero quo nam merito te carmine dicam :
Iam tolles uisidum fydera ad alta caput .
Nam cura et magni efficit facundia Carpi
Laudibus ut furgas confpicienda nouis .
Dum quicquid ftudium fugit mente inq; feffellit
Mundini : (nam quis omnia noffe queat :)
Legit et in numerum meliusculumq; redegit .
Plurimaq; ingenti terfinae auxil ope .
Vt quondam fatio fueras quę prima fub orbes
Vna fores eadem gloria : & orbis honos .
Idem .

In Carpo feri difcent tua fcripta nepotes
Hęc Mundine etenim charta loquetur anus .

¶ Niger Cremonenfis de Cafalę maiori.
ad Lectorem .

Qui cupit erectos humani corporis artus
Sectaq; membra fuis quęq; uidere locis :
Ille legat docti perfecta uolumina Carpi
Nec fibi Mundinum iudicet efle fatis .
Ditior hic illo eft : & quod Mundinus omittit
Quo dę docet pariter plenius ifte refert .
Singula de noftro foluiſſe Promethea credes
Corporisq; tenti finxerat ante luto .

Illustris ac Clarissimo Dño. D. Alberto Pio, Carpeni
Comiti, et Dño meritis, Iacobus Berégarius
Carpenfis, S. P. D.

VM Diuturna, et pene eterna Illustris, Princeps
ea censei solet, quibus a primis annis assuescere
solemus: mihi persuasum est, nullam oblivionem
deletere potuisse q̄ plurima honestissima studia, quę
tecum in mansuetiorū mularū rudimentis sub soe
lid memoria Aldi Manutii Rō. p̄ceptoris nostri conferebam.
Et illud in primis nequa q̄ de alia ac divina mente tua excidisse
existimarem: quod per iocum experti placuit (nam gr̄as illa loco
plurimū gaudet) placuit autem ut potui Anatomia a nobis fie
ret: mihiq̄ sectionis munus demandatū est: utpote: qui sub gen
tore meo in Chirurgica arte ab infantia pene exercitatus forem.
Tanta (testor Deos imortales) ex illo tempore Anatomie dul
cedo: mētem animūq̄ meum tenuit: ut omnem etatem illi Me
dicinę elementis nō minori bonorū professorū utilitate: q̄ priua
ta uoluptate cōtriuierim: liberos huiusce disciplinę q̄ plurimos: sed
Indigestos lectitando: quos eorum authotes ad alia trāsferentes
uolumina: fabulas potius: q̄ Anatomia scribere uidebantur: quo
factum est: ut pauci: uel nulli hac nostra tempestate tam neces
sarię ac p̄ciosissimę artis finem nouerint. Accedebat insuper
ad eius ignotationem (sic mea fert opinio) scēda, ac multis flo
macosa membrorū sectio: creberrimaq̄ illorū attractatio: Et cū
ego q̄ plurima centena cadauerum secuerim: q̄ pauci etatis no
sit: Medici hanc artem nouerint: intellexi. Quate p̄tēnti ac
futuro sēculo p̄desse cupiens: non minus pium: q̄ liberrimū
fote putauī: cōmentaria quędam: et digestiones super Anato
mia Mundini componere: quę antiquorū philosophorū: pariter
et Medicorū sapiēter scripta de humani corporis admirabili mo
le demonstrant: illaq̄ copiose tradidita a q̄ plurimis medicinę stu
diosissimis uiris rogatus in lucem dedi. Cum autem actu: et ocu
lata fide Acadēmici Anatomia cognoscere cupiant: Ars in illis
cōmētariis diffusior est: q̄ ut breuiter cognosci possit. Et p̄p̄ea ad
cōmunē omnīū bonorū utilitatē p̄tēns perlucidū Enchiridion

omni alio sibi pari uberius de ipsa Anatomia composui : in quo omnia in cōmuni sectione designata appatent : eiusq; beneficio omnis longē inquisitionis labor aberit. Hocq; Alberte clarissime ac sapientissime princeps nūcupatim tibi dediciui eorū aductus exemplo : qui labores suos alicui deorū cōsecrarunt : ut sub illorū numine securius in manus hominū peruenirent : idq; instantis egēq; tu unus inter reip. Christianę primores / nō solū bonorū fortunę. Sed etius uis Minerę sis facile princeps. Naturalis. nā ac moralis Philosophiæ : & quę Deū cōtemplatur Theologiæ : & omnes deniq; scientię sunt tibi tanta amicitia / ac affinitate cōiunctę : ut sapientis nomen apud omnes merito tibi uēdicaueris. Et cura semper benignus fueris : siq; Carporū patrię meę / meiq; meritissimus Princeps. fortunas meas. ingenti / cogitationē / mentem deniq; omnem / benignitati tuę debere non eram in scius / & eo maximeq; in q̄dibus tuis omniū bonarū disciplinarū nido huiusce p̄ciosissimę artis principia tuo sub felici auspicio sumpserim. Suscipe igitur gloriosissime Princeps læto animo ac serena frōte hoc de Anatomia Enchiridion a fido / ac sincero mancipio tibi dicatū : quādo nō minus Regium sit munera quā tulacūq; fuerint / hilari frōte suscipere : q̄ p̄ciosissima. elargiri. Oblationes siquidē lacteas a cretensi pastore sōui datas gratissimas fuisse constat nec eorū munera aspemātur / qui cū Thus nō habeant / mola falsa lirant : tantū. n. ex labore meo q̄tatis nostrę medici tibi debebunt / quantum & uoluptatis : & utilitatis ex hoc libello suscipient / quo cum in hac materia alius breuior : & lucidior nō fuerit. Celsitudini tuę ad decantandas laudes semper obnoxii mecum dicent : deus tua uota secundet. Vale.

ISAGOGAE Iacobi Carpi in Anatomia humani corporis.

Illumina me dñe sp̃ritu ueritatis & manifestabo
opera manuum tuarum.

h OC Opus duas habet partes. Prima trinerſalis: Prima parte
opere.
Secunda particularia tractat: Prima notat ſecundū
aliquos hoc nomen Anatomia derivari ab Ana:
græce/ qđ latine ſignificat: per. Surſū/ Re/ Aequa
le/ Rectū/ et tomos: quod diuiſio/ ſeu ſectio dici/
tur/ quaſi recta per partes/ uel circa partes diuiſio/

¶ Sed uerius interpretando/ Ana in cōpoſitione/ p̃ter alia/ ſignifi
cat per ſingulas partes inueſtigationē quādam/ unde in cōpoſitiōe
hulus uerbi temno/ quod eſt incido/ ſignificat in ſingulas partes
ſeco/ inueſtigandi cauſa/ quę/ et quor ſint/ & quāq̃ ratio uideatur
dici de omnibus/ quę partes habent/ uſus tamen obtinuit/ ut de
animalibus/ et maxime de hominibus dicatur. Quid ſit ana
tomia & unde
dicatur.

¶ Eſt igitur Anatomia/ ſeu Anatome diuiſio omnium corporis
aialis partiū/ inueſtigādi cauſa/ earū ſubſtantiā/ quādratē/ nume
rū/ figurā/ ſitū/ et colligantiā/ & hæc in mortuis/ quibus pōt addi
cōplexio innata. Et ideo dicebat Gal. in libro de p̃ſtitutiōe artis
medicari/ iputo neceſſariū eſſe nobis/ cū hęc cōſtituimus antē:
nō ſolū cognoscere particulas & illarū cōpoſitionē/ ſed etia op
ationes earū/ & in hoc diſſerūt medici ab g̃ſificatoriſus. Illi. n. do/
mortū particulas ſolas et cōpoſitionē ſciunt/ nulla tamen earum
opera/ eo quia nō eſt animalia/ medicis autē mēbroꝝ hominis/ in
quātū eſt animalis/ operationes ſunt querendę/ per quia uere in uiuo
homine et nō mortuo operationes/ cōplexiones innate ac influen
tes/ et paſſiones ſunt. Ideo hæc tria in eis ultra p̃dicta inueſtigam
tur. Sūt igitur in reali anatomia oīa p̃dicta nouem cōſideranda/

¶ Sed quia a toto/ tanq̃ a notiori eſt incipiendum. Primo ſituato
aliquo cadauere ſup̃no in loco ſiſſioni ac oſtenſioni apto/ Prius
loco et a p̃lis riſor et a ſordibus optime mūdato/ a capite uſq̃ ad
pedes. Sciendū eſt corpus diuidi/ in quatuor partes. Iam tres uen
tres notabiles/ et i extrema. I. manus et pedes eſt alis quibūſdā.
Quarta ps ē teſta/ caput dicta/ eo qđ ibi ſenſus inſitū capiti/ in
quo mēbra aīalia p̃tineſt/ hæc ps cōiter ſup̃nus uēter appellat. Diuiſio cor /
poris.
Prima pars.

Secunda pars. ¶ Secunda pars est concauitas intra coxas & ossa eis annexa in qua principaliter spiritalia / seu uitalia / & aliqua alia mēbra sunt. Et hęc pectus et etiam cauius & uenter medius dicitur.

Tertia pars. ¶ Tertia pars est concauitas : quę est intra abdomen & partem dorſi infra septumtransuersum alias diafragma descēdendo ante usq; ad pectinē & retro usq; ad anum / in qua mēbra nutritiua & etiā generatiua p parte cōtinerunt & hęc uēter inferior nōcupat.

Quarta pars. ¶ Quarta pars est totū corporis residuū : uti collum / manus / & pedes / ac illis seruientia. Hęc pro prima parte.

¶ De Anatomia uentris inferioris.

**Secunda pars
opena.**

Ista parte uniuersali ad particulatē deuenio. In qua opator incipere debet sectionē a uentre inferiori in quo sunt multa mēbra prius anatomicizanda & abiciēda : ne corporis reliqui sua putredine & prauo odore (si postponatur) impediat.

¶ Dicamus igitur istum uentrem iuxta prędictas nouem conditiones considerari debere : Et primo circa substantiā : quę est diuersa tam secundum partes continentes q̃ contentas. Substantia partium cōtinentium loco suo apparebit : Cōtinentiū substantia in parte anteriori et laterali paniculatis et musculosa est : ut constrictioni et dilatationi apta sit propter impregnationem et cibaria et alia iis similia. est etiam uenosa ac Arteriosa.

**Figura nō
est mēbrā.**

¶ In istis partibus est etiam in corpore pingui notabilis pinguedo / In demacrato uero est pauca : et inter sum nullatet pinguedo nō est proptie membrum sed est adueniens et recedens cūq; superfluitas / utilis tamen.

¶ Posterior uero substantia huius uētris est carnosa / musculosa ossolua etiam parū mēbranosa : pariter uenosa & Arteriosa.

¶ Quātitas eius et figura patent : situs et locus suus est sub uentre uitaliū mēbrorū septotrāuerso mediāte : Incipiēdo a furcula pectoris inferiori et a confinibus septitrāuersi ab utroq; latere quinq; costarū inferiorū trāsit usq; ad partem in qua corpus bi partitur a magnis pedibus / quibus alligatur. Sua etiā colligantia est cū cerebro mediātib; neruis & cum corde mediātib; Arteris et cum uentre medio per musculos aliquos. De colligantia ipsius cum hepate et mēbris generationis omnibus notū est.

¶ Numero est unus uenter : Numerus tamen partium eius est diuersus : quia aliquę partes sunt cōtēte / aliquę cōtēntes. Cōtēntes

te sunt secur cum sua parua cysti continēte bilem: et Lien: et Ventrīculus a multis stomachus dicitur: licet male: et sex intestina cum uenis per ea dispersisset Renes cum suis emulgentibus: et Vesica cum portis utridibus: qui dicuntur emūctoria testū: et Mensēte reon cum suis glāduis: et Vena portę: et Vena chilis cum Arteria Aorta descendentes: & Venę ac Arterię Umbilicales: & Vasa seminaria cum Didymis et Testibus: et Martis in feminas: licet Didymi et Testes cum suo scroto seu oscheo sint extēiores: ponuntur tamen in isto uentre quia alligantur ei imediate.

*ris/bas cōtē/
ta in yēne inf/
teriori.*

¶ Partium uero continentū: Alię sunt cōmunes: alię proprię: & alię magis proprię: cōmunes sunt omnes illę partes / quę istum uentrem circūdant. L. anteriores: laterales: et posteriores: anteriores et laterales latine dicitur Sumen: antiquus uero Abdomen: gręce Epigastriū et ab aliquibus Hērion: et arabice Mirach: posteriores dicuntur Imum dorsi.

*Partes conti/
nētē.*

*Sumen.
Abdomen.
Epigastriū.
Hērion.
Mirach.*

¶ Partes uero proprię: alię sunt ante: alię a lateribus: alię postē: rūs: quę sunt ante a teōstioribus medicis cōiter ponitur quę.

¶ Prima a superiori incipiens: quę est in medio corporis circa furculam inferiorem pectoris: dicitur gladialis & feutalis charilago: & edam pōmū granatū: hęc tamen pars est cōmunis uentri medio et inferiori paruū occupans locum.

*Gladialis.
Feutalis char/
ilago pōmū
granatū.
Stomachal/
lis.*

¶ Secunda sub ista imediate est pars dicta stomachalis: quia stomachus. L. uentriculus est in ista regione cum sua parte anteriori: & hęc pars se extendit fere usq; ad Umbilicum.

¶ Tertia est pars umbilicalis: dicitur et est ea pars: in qua est Umbilicus clausus in medio abdominis: tam frustatus in nato a suo principali opere.

Umbilicalis.

¶ Quarta pars est dicta a Mundino fumen: quia est pars emittēdiū ipsius fumini: & ibi fumitur pars pro toto: hęc regio est ab Umbilico usq; ad pectinē.

Sumen.

¶ Quinta est pars pecten dicta: intra quā est os pubis seu pectinis: in ista regione intra uentrem incipit collū Vesicę in utroq; sexu: & marticis in femina.

*Ventri os pu/
bis.*

¶ Partes laterales proprię ab utroq; latere equaliter diuisę Cōmuniter a medicis sunt posite duę. L. supior & inferior: supior dicitur hypocōndriū: inferior dicitur illū uel flancus: la et dicitur lagona & cenona: In hypocōndrio dextro ē secur sine hēpar: Lien uero ē in

*Hypocōndriū
Sumen.
Flancus.
Lagona.
Cenona.*

- Inguē bubo.** sinistro. illoq; pars superior incipit a supremo ossium anchardū & terminatur uersus inferius in extremo huius uentris. ipsoq; infima pars dicitur inguen et bubo. hypochondria uero incipiunt ab extremis costarū mēdosarū. et inferius terminantur ad ilia: inter ilia et hypochondria apparet certa cavitās. quādo homo ad anteriora flexus. quę ab aliquibus uocatur colago. et ab aliquibus Irrua.
- Colago infū.** Partes posteriores proprie dicte. alię sunt in medio alię a lateribus. quę sunt in medio dicitur spina iserior et sili iserior dorsi.
- Spina iserior sili dorsi.** Laterales alię superiores et alię inferiores. superiores dicuntur regiones lumbares et renales: inferiores dicuntur partes supra clunes seu nates.
- Lumbaris regio Renalis Lumbosacra.** Partes uero magis proprie nominate. alię etiam sunt anteriores. alię laterales. et alię posteriores. Anteriores et laterales coincidunt. & sunt cutis primo occurrens. sub qua est pinguedo et octo musculi. quorū quatuor sunt obliqui. et duo longi. et quolati. oēs dilatati et uniti ad instar pāniculi: qui potest uocari limo ab Aui. uocatur pāniculus carnosus: nec ibi est alter pāniculus carnosus: ut putant moderni.
- Peritoneon. Sphac.** Sub musculis est membrana subtilis et dura. gręce peritoneon. alias peritonion dicta: & arabice Siphac. hęc omnia componunt abdomen. siue mirach.
- Caro libaris.** Posteriores uero partes etiam magis proprie dicte. sunt cutis. interdū aliqua pinguedo. Caro musculosa ab utroq; latere sphondiloz. lante et terro libaris ab aliquibus uocata: & caro nō musculosa simplex replēs huius partis loca uacua: & sphondili renū siue callatim. et tria ossa ossis sacri. siue tres sphondili arabice alho uis dicitur tres sphondili alhosos siue candē. et suę cartilagine. cū suis pāniculis. et neruis. uenis et arteriis. et pāniculo peritoniosillarum partium anatomia dicitur loco suo: Nūc autē ad anatomia abdomenis me conuerto: & primo de cute.
- Umbilica. Radix bota.** De cute Ventris inferioris et de Umbilico. Considerabis primo locū umbilici quī dicitur radix hominis. qui habet extra corpus uersus matricem duas uenas et sepiissime unam. et duas arterias putamine corticari obductas: qui in nouiter natis ligatur et secatur prope abdomen et per se cōsolidatur et clauditur. eius pars media sic cōsolidata Acrophalū dicitur: et quia corugata est dicitur Verula: et
- Acrophalum Utrula.**

græce Græp̄dictis cōsideratis seca cutem secundum crucem in longū et latū in toto abdomine: et exorta ipsam seruādo umbilicū illesum: quē sēpissime uidebis ingredi uentrē cū una uena notabili et duabus arteriis: quę in naris sunt frustratę a pprio ope.

Græc.
Locus umbilici.

¶ Vena est ascēdens penetrans in cōcauo hepatis i uena portę.

¶ Arterię descendunt per partē interiorem abdominis scire usq; ad pectinē: et trāsēūt ad dorsum a lateribus nescię: et implātūtur una a dextris alia a sinistris in arteriā aortam circa os sacrū infra Renes bifurcatā. Iste arterie aortę uocātur sempiternę.

Arterie sempiternę.

¶ Ex istis uasis meat sanguis et spiritus ad Iecur et ad Cor isantis in utero matris: istū umbilicū melius uidebis post anatomiam abdominis: quem cū diligentia seruabis cutē considerando: quę duplex est: prima est exterior: quę est mēbrorū grossa superflui: tasi: deo renascitur: secunda est interior neruea nō renascēs: sub qua uel in qua circa latera in quolibet sexu sunt duę uenę: una a dextris alia a sinistris cū difficultate i nato uisibiles: sed i scetibus triū mēsiū uel circa optime apparēt: quę ascēdunt usq; ad mamillas: quas cōserua pro anatomia mamillarū maxime i femina.

Uenę ad mamma: uel ad uena.

¶ In tota tñ cute corporis sunt p̄tenuēs uenę in fibras disperse: et adeo tenues et angustę: ut per eas penetrare sanguis nō possit aliud ue q̄ erilis humor: q̄ sudor et sanguinis setolitas appellat.

Fibrę.
Sudor.
Sanguis setolitas.

¶ De pinguedine.

Pinguedo.

p Ost cutim est semp aliqua pinguedo maxime i corpore nō resoluto ab ægritudine: maior in uno q̄ in alio: quam remoue: ut melius uideantur mēbra sub ea cōtenta.

¶ De Musculis uentris inferioris.

Octo musculi Abdominis.

p Ost pinguedinē sunt uidendi octo musculi abdominis: quos primo occurrūt quatuor obliqui nominari. Eorū duo locātur a dextris: et duo a sinistris: qui cum suis cordis regunt a summo ad Imum totum istum uentrem antierius et superęquitant omnes alios: In quolibet enim latere uentris et ante in medio abdominis unus ipsoq; est descendens: et unus ascēdens: descendentes sunt supra ascendentes: quos optime uidebis duce docta manu.

¶ Primo seperabis caute descendentes ab ascendētibz: et te peries in quolibet latere uētris eos inuicem inuicari: una Cruz est a dextris alia a sinistris: eorū pars carnea se se inuicem inctu:

ciat sicut neruea seu cordosa etiam se inuicem intercruciat, sui uisibilia tendunt semper oblique a lateribus uersus medium uentris. ita quoque cordę istos musculorū dextri lateris rēdunt ad sinistram partem eiusdem lateris dextris et cōtrario modo tendunt cordę musculorum sinistri lateris. Sin quolibet latere suę proprię cordę se se inuicem intercruciant.

¶ Et musculi obliqui incipiunt facere cordā cum obuiant musculis longis, et cordę musculorū dextri lateris & etiā sinistri terminantur ubi musculi longi sunt cōtiguusque locus est in medio uentris per lineam rectam, a pōmo granato usque ad pectinem.

¶ Descendentes trahunt ortum a pectore, ascendētes uero a regione suprema et anteriori ossiū ancharū, Apertū cordę sunt bitunicales, atque ualde de difficulti seperabiles, ortū a pāniculis regētibz cost et a uillis nerueis per eos dispersis.


¶ Duę tunicę cordarū musculorū descendētiū in quolibet latere & una tunica cordarū musculorū ascendētiū, supra tegit musculum longum sui lateris a summo ad imū: Vna etiam tunica musculorū obliquorū tegit seu inuoluit musculū longum sui lateris uersus inferius, s. uersus cordam musculi latius, quia musculi longi carent proprio pāntulo eos regente ut sensus demonstrat, et p̄dictos musculōs obliques optime uidere potes in tribus: imediātē sequentibus figuris: Omnes tamen eorum cordas in secādo diligenter uidequas non moueas integre, nisi supra musculōs longos existentes, quę autem sunt sub musculis longis feruande sunt usquequo Anatomizasti eos.

In hac fi-
gura hinc va-
riis musculos
obliquos hinc
dico. v. n. a
deum autem
a sinistra: qui
sit super obo
musculos. Co-
rum pars cas-
tra apparet a
sinistra. & i
medio v. n. o.
Super m. /
fentes. l. ego
sunt coram co-
dae. J. vna a
extremis a
sinistra: pel-
liculae & la-
tissimae termina-
tur in hinc
est i medio v. n.
trunc: vt videtur
& cordae illic
sunt. Quorum
pelliculae. J.
secunda: sub
& supra.



In hac fi-
 gura bene vi-
 de musculos
 oblique sitos
 dicitur se im-
 mit cū duob⁹
 descendent⁹ in
 alia figura po-
 situm qdē de
 scendentes sunt
 supra alios a/
 scendentes et o-
 suo vno ex p-
 duto muscu-
 lis descendenti-
 bus supra pos-
 siti alia figu-
 ra cum consti-
 tua superposita
 obliq⁹ muscu-
 li vni ex aliis
 ascendenti⁹ ob-
 liquis sedit si-
 mul figura. r.
 hinc graeco-
 rum musculo-
 rum et pars car-
 nes ē a lincis
 b⁹ Conde Ro-
 cop sunt i me-
 dio ventrisq⁹
 sunt et quarū
 pelluntur et
 hūc vni pelli-
 cuta est super
 quantē muscu-
 los lōgos: et
 ita vero pelli-
 cuta ē ita ma-
 sculos lōgos
 q⁹ adhibet cor-
 des latitudine
 hū musculos
 et istae cordae
 et terminant i
 lincisq⁹ ē im-
 dio vni et
 videri.






In hac fi-
 gura vides
 quicquid
 musculus lon-
 gus sub eo est
 una pectus
 que est d cor-
 da musculor
 obliquosque
 habet villas
 oblique et d
 via sub quoli-
 ber musculo
 loquor vides
 in hac figura
 e musculus lon-
 gus sunt illi qui
 pendunt inco-
 rporati ap-
 parent clausi
 a loco suo na-
 turali e pos-
 sine videri cor-
 dar pectus
 rui musculorū
 obliquos
 ascendenti.

De Musculis longis.

Vtuli longi seu recti sunt duo in medio abdominis sub
 m et supra cordas antedictas locati a funicula inferiori pec-
 toris tendentes cum suis uillis per longum uentris usq[ue]
 ad os pectinis: et ideo dicuntur longissimi sunt sibi contigui: occu-
 pantes partem anteriorem uentris per latum in quantitate latitu-
 dinis in totum octo digitorum uel circa. Illi musculi non habent
 proprium p[er]niculum sicut alii habent tamen cordas breues ter-
 minatas in pectine: et nō habent alias cordas. Sua substantia car-
 nea est: et diuisa in latum magis uersus cutem q[uam] uersus siphac p[er]
 duo intermedia neruea seu ligamentalia: quorū unum est supra
 regionem umbilicalem aliud infra taliter quod quilibet muscu-
 lus uidetur diuisus in tres partes carneas notabiliter distinctas:
 ut potes uidere in figura sequente. & illa intermedia supra dicta
 a natura sunt ordinata: quia quāto uilli musculorū sunt breuior-
 es: tanto facilius et melius seruiunt uoluntatis motibus.

Nota.



In hac fi-
 gura vides
 duos muscu-
 los longos de
 nudos a cor-
 dia musculis
 obliquos qui
 musculi longi
 sunt supra cor-
 dia musculi
 rē laetudina-
 tem e quali-
 ber musculis
 habet duo bi
 uniones nar-
 tice seu liga-
 mentales in se
 per latum ten-
 dentes. s. vnus
 supra umbili-
 cum e aliam
 infra ve vides e
 ita quilibet
 musculis ten-
 guis videt de
 usus in tres
 partes seu in
 tres musculi
 e hoc sunt na-
 turae quāto
 vili musculi
 rē sunt tanto
 resistentio me-
 lius e facilius
 comburentur.

De Musculis latis

His predictis: musculos tam obliquos quam rectos abscondas ut melius uideas latos: qui sunt sub longis cum suis cordis mediante una ex tunica cordarum musculorum obliquorum ascendendum: quam uidecum diligentia postquam remouerunt musculi longique tunica est subtilis ualde alligata notabitur cordis musculorum latitudinalis: qui musculi lati habent suam partem carneam sub parte carnea obliquorum: et illi dicuntur latique quia positio suorum uisus est per latum uentris: et illi sunt magis supra regionem umbilicalem quam infra: quia a superioribus ad inferiora est sua principalis operatio: quae est expulsiva intestinorum iuuare: eorum pars carnea est dorsum uentris: Terminatur in cordas in illa regione ubi est situs longitudinalis: et dexter obuiat sinistro mediante sua corda: ipsorum pars carnea est sub carne obliquorum: et corde suae sunt immediate sub cordis obliquorum ascendenti predictorum: illae cordae sunt etiam multae latae: et etiam bitunicatae: duntaxat in uicem compactae: pñiculo peritonio seu siphac alligatae: et suae cordae intercruciant se cum musculis longis ad angulos rectos.

Ex predictis apparuit situs musculorum uentris inferioris. Sua substantia: sua quantitas: sua figura est conspicibilis: Numero sunt octo: quatuor obliqui: duo longi: duo lati: colligantia est ossis lumbi. Firmissime in uicem sunt concatenati: et taliter sunt uniti quod iudicantur unus pñiculus qui dicitur carnosus: Complexio eorum in utroque patet ex sua substantia.

Iuuamenta eorum sunt calfacere intestina: et manutenere unita omnia membra nutritiis: et iuuare retentionem: expulsivam tamen principaliter iuuant et interdum membra anhelitus: maxime in flamine cum ictus et in uolenta expiratione: passionibus omnium modorum possunt pati.

Predictos musculos uidebis in prima figura subsequente: et in secunda figura uidebis situm locum et etiam figuram octo musculorum abdominis: seu epigastrici: latrachii: qui tamen melius hos musculos et multa alia perscrutari intendit: ad nostra super Mundino commentaria Recursum habeat: de quorum labore post mortem me Amabit inuidia.

Pñiculus
carnosus.

Situs can-
coru.
Circumscriptio
tuo.



Uterque in
hac figura
duo muscu-
los laterales
per quos erit
musculus longi-
s et obliquus qui
nunc sunt eleva-
ti ab alio et vi-
deo et alio mus-
culorum later-
alium scilicet po-
steriorum et la-
teribus / par-
vero cum ner-
vis J. cordis
conferunt in me-
dia ventris et
sunt ex duobus
pelliculis com-
positae J. secun-
dum J. et in
per et sine al-
ligatur et per
alio sicut et
et isti musculi
sunt magis in
superiori parte
buius ventris
et in inferiori
ut videatur
melius expre-
ssant inferius
quod in hac
figura est.

B

¶ In hac fig/
 ura sunt tres
 species muscu-
 lorum. Scilicet/
 qui longi & la-
 ti: & habes in
 dextra parte
 duos muscu-
 los / qui non
 sunt tegentes
 totam partem
 dextram / sicut
 faciunt nati /
 ratur / & ut
 monstrans est
 in prima & se-
 cunda figura:
 & sic in hoc lo-
 co facti sunt:
 ut melius vi-
 deatur totum
 in cruribus
 sinistra vero
 parte habes
 unum muscu-
 lum longum:
 & eum latu:
 cuius latus tam
 apparet
 puro carnea:
 corda duo ipsi
 no muscoli la-
 ti est sub mu-
 sculo longo
 pectoreo.



¶ De Peritoneo seu Siphac.

¶ **I**is predictis eleua cū cautela cordas musculorū laterū ab una mēbrana sibi āncrea uersus īfēstina: quę est subtilis et dura: Peritoneon et Siphac nōtata ista ambit totā uacuitatē uentris inferioris circūquaq;: Rotūda est: nō perfecte tamen. Sua substantia est Neruea durasua figura dicta est.

Peritoneon
Siphac.

¶ Ab isto pāniculo oriūtur duę burse uel facci didimi uocati: in quibus sunt duo testes: intra scortū locatisquę sunt partes ipsius scortis: sua quātitas est quanta est uacuitas uentris inferioris: situs patet: numero est unus pāniculus solus: colligantia sua est cum musculis latis et cum omnibus membris cōtēntis in isto uentre: et omnia membra huius uentris habent pāniculum ptoprium ea inuoluentem: ortum ab isto peritoneo.

¶ Colligatur etiā secūdu Autē. cū pleura: colligat etiā septotrā fuerfo et testibus: sua cōplexio est illa: quę est aliorū pāniculorū.

¶ Inuamēta sua sunt ligare dorso mēbra nutritionis & generatio: nis: & calefacere īfēstina: & ea seruare a Ruptura: & ea habet manutene ab exitu extra uentrē: Inuat ēt simul cū septotrā fuerfo expulsiōē cōtēntorū in uentriculo: & in īntēstīnis: & in matrice.

¶ Passiones omniū modorū patitur: sua propria passio est Creparura & Mollificatio. Cū omniū uide alibis: quia in demonstratiōe anatomicē nō cōuenit ponere curā ascitis: neq; curā uulnē rī abdominis: nec īntēstīnorū: nec modū castrādi: nec extrahēdi lapidē: sicut fecit Mūdinus: nec etiā alterius egritudinis. Nos tñ dicemus aliqd de flebotomia uenarū Guidez: & forte aliqua alia singularia. Medici necessaria de qb? tato scribūt authores.

Creparura
Mollificatio.

¶ De Omento siue Zirbo.

¶ Redicta mēbra abicienda sunt: ut melius uideatur residū mēbrorū: & primo occurrit Zirbus seu Omētum: Rete a uulgaribus dictū: qd ē mēbrū cōpositū duabus pelliculis nerueis subtilissimis: cū multa pinguedine sibi annera.

Zirbus.
Omētū.
Rete.

¶ Habet hoc mēbrum plures uenas pullantes & quētas: manifestiores tamen in macro corpore q̄ in pingui: Sui pāniculi seu pāniculus sunt discontinui per totum: nisi circa circūferentiā eius: habet formā marsupii seu facci. Est enim inter ipsas pelliculas maxima concantitas.

¶ Sua substantia est dicta: Colligantia est cū Siphac: cū Colon &

eum Splene. Suus situs est ante uersus: supra intestina extensus a uentriculo usque ad inguina. Sua magnitudo est cōspicabilis: Numero est unum mēbrū solum. Sua figura est tacta: Sua cōplexio est cōplexio partū cum cōponentiū: Sua iuuamēta sunt iuuare digestiuam et remollire feces. Passiones omniū modorum potest pati: Causat ramicein in seroto: In umbilico et in inguinibus: et alibi in fame: si rumpatur uel mollicetur peritonion.

¶ De Intestinis.

*Lea resolutio/
nio intestina.*

C Leua Zirbū et uidebis intestina quę sunt cōtinua a uētriculo ad Antrum: uoluta et reuoluta: ut lōgo tempore retineant cibū gratia boni finis, et numero sunt sex.

*Venti. intes/
tum.
Colon.*

¶ P^o ab inferiori ascēdēdo ē Rectū: lōgitudine palmi uel circa.

¶ Sēcūdo est Colon: quod ascendit per partem sinistram usque ad regionem Renis et Ilenis: deinde transit a sinistro in dextrum: super equitādo stomachum: & in dextro unitur intestino sacco: circa supremā partem ossis Anchę locato.

*Sacus.
Cecus.*

¶ Hoc intestini saccus et Cecus dictus: est tertius in ordine numerandus: Et ista tria dicuntur grossę substantię. Carnosa enim sunt: et possunt consolidari si soluantur.

Ileon.

¶ Quarto est intestini longum: Ileon et Reuolutum seu inuolutum dictum: quia reuoluitur unde quę per uentrem. Quinto est Ieiunū: Sexto Duodenū: Et ista tria sunt subtiliā ab aliqubus lactes dicta: quorū solutio non consolidatur: si est notabilis: Subtilia sunt superiora per colligantiam: et Grossa sunt inferiora: omnia habent duas tunicas et pāticulum cōmunem octum a peritonio: supertegentem et aligantem ipsā dorso.

*Ieiunum.
Duodenū.
Lactes.*

¶ Interiori eorū parti Pituita alias Phlegma adhęret: ut resistat corrosioni & lubricket feces: in eis secūdū aliquos sunt uilli omniū modorū: plures tamen lati: Sua complexio est frigida et sicca: et Gracilia sunt frigidiōra Grossis: quia substantia sua est Neruea: in Grossis est aliqua caro: Sua figura apparet: Suus situs partiu: latis apparuit et apparebit ex dicēdis: Iuuamenta sunt nota: Passiones omnium modorum patiuntur.

*Ad dēscribē la
coe.
Sūgnificatio
incipit in mēte
raro.*

¶ Ad particularem anatomīā intestinorū uidendā. Primo uide cū diligētia: Sicut cōiunctanteq; ea separes a mesenterio: cōsidera eorū Venas meseraice et lactes ab aliquibus dicteq; pot' sit chilū ad portā uenā: in quę ramis minimis incipit sanguificatio duce

Iecinote. Nota etiā Situm Venę Postęque est extra concauam Iecinotis tendens: uerius intestinales: uerius stomachum: Omentum & Lienem cum octo ramis: quos omnes uide cum diligentia: si potes autēq; intestina abdicantur.

Circa postę

Octo rami
vire postę.

¶ De intestino Recto.

Sis expediris. primo uidēdū est Rectum seu Irganon: quod est fece mundandū ipsam manibus exprimēdo in Colon: & suum extremū uerius Colon est in duobus locis ligandum: & inter ligaturas secandum. Sua enim positio est ab Ano ad superiora per Ventrem ascēdes circa palmi: paucas habēs Venas meseraicas: quia suum cōuenti partī nutrit: tenui natus circa Ilium sinistrum ubi incipit Colon Recto unitum.

Rectum
Lenganon.

¶ De Colo intestino.

Quāvis Colon esse situm in sinistro: & dīctā Renem si-
nistrum ascendit: & ibi est strictus: ut cedat locū Spleni quem cooperit & cui alligatur: tendit ab hinc ad dextrū Iarus & superequitur Ventriculū & ei alligatur hinc sit syncoxis fecesius tempore: hinc suus dolor creescit sumpto cibo: sed dolor Renalis creescit in secūda digestione: alligatur Omentosa quo & etiā a uētriculo humectatur: tegitur penula Iecinotis, in qua est Cystis bilis: Ideo subnigrū est & amarū: est cameratū seu cellulati: pituita abundat. Cucurbitini et etiā alii uermes in isto generantur: In ipso etiā sterco acquirit figurā inaequalem: in isto sit rugitus parū ante ascēdendi horā: Taliter est situatū: ut a superiori ad inferius melius graue descēdat: & ut cooperiat leiuū & quodēum ipsa ab extrinsecis tuendo: & ut sue feces remoliantur ab Omento ipsi continuato: & ut etiā a cysti felis ad ipsum refudet fel: seu bilis: suarū feci expulsiōem stimulans. Ex suo situ habetur situs clisteri zā di: & locus applicatiōis medicaminū in colicat. Sua quātitas est cōspicabilis: Sub substantia est carnea parum: & neruea ac pinguis & Solida: ut resiliat duris & acutis. Notabiles etiā habet Venas Meseraicas: per quas meat chilos & sanguis.

Colon.

Cucurbitini
generāt in
colo intestino.

¶ Sua proptia passio est dolor uentosus: in hoc generantur lapides & cotia a pituita excoctā: illis uilis: potes excarnate Colon a Mesentereo: cui alligatur: & dimitte Rectum in loco suo usq; ad Anatomiā. Antiquę non potest perfecte uideri: nisi quādo facies anatomiā uirge & uellicę.

Clisteri
zā di
Vermes
generāt



¶ De Sacco Intestino.

h Vic intestino circa os anchē infra Renē in latere dextro
locatur intestinū unū Cæcus: Saccus & Monoculus di-
ctus/ quia pendet ut Saccus / & unicus habet officium
per quod trahit & expellit feces/ In diuersis tamen horis trahit
ab ileo & expellit ad Colon/ in isto fit maior digestio q̄ in alio in-
testino: Est enim alter uentriculus primo attrahit/ deinde dige-
rit/ postea ad Colon expellit.

¶ Sua quantitas est circa palmum per longum/ latum est ut Co-
lū & etiam plus/ non est Mesenterio alligatum: sed pendet in
uentre. In isto generantur Vermes/ Serpentes dicti.

¶ Hoc intestinū sepe reperitur frustratū in natura: quia nihil
operatur de solidis/ & sic reperitur etiā alligatū Colo intestino
& ileo/ & est tanq̄ additamentum quoddam/ & sua figura apparet
compacta stricta/ intus tamen est uacua/ & est minor digiti omni-
mo manus per latū/ & est longitudinis triū unciarū uel circa.

¶ De ileo Intestino.

h Vic intestino Sacco ascendendo imediate alligatur per
mum de gracilibus dictum ileon/ & longum/ & reuolu-
tum seu inuolutum/ cuius substantia est gracilis/ sua fi-
gura oblonga est & rotunda/ quantitate est longior q̄ omnia alia
intestina simul/ In isto intestino sunt plures mesenteria q̄ in aliquo
alio propter suam longitudinē/ Situs suus est magis circa ilia/ est
tamen alibi per uentrem/ Alligatur Mesenterioa quo debet ex-
camari/ ut alia intestina superiora bene uideas/ Sua propria pos-
itio est illa dispositio/ & passio dicta miserere metui qua sterco-
ra transiunt ad os ut uomitu patientis comprehenditur.

¶ De Ieluno Intestino.

h Vic ileo continuatur Secundū de gracilibus/ Ieluntinu
hira/ & hilla/ & sterile dictū/ siue uacuu/ & est uacuu quia
est propinquū Iecinotia quo euacuatur attrahendo ab
eo chylū et expellendo in eo contenta/ mediantē hī a Cylī dicta
Duodeni/ in ipso ingrediēte/ plures Mesentericas habet aliquo alio
Intestino sibi pari in longitudine/ cito succurrant Iecinoti/ Est
tamen magis uacuu in sua superiori parte iuxta Duo denū/ & nō
est totaliter tectum/ sed incipit reuolui ubi alligatur ileo/ et Ideo
pro parte est rectū & pro parte inuolutū/ color eius est chylus

Sacco.
Cæcus.
Monoculus.

Ileon.
Longum
Reuolutum.
Inuolutum.

Ielunum.
Hira, hilla
Sterile, va-
cuum.

quia sediori uicinus est similis ileo i substantia et figura: Sua quā-
titas est cōspicabilis: non magna tamen: sicut sicut est circa re-
gionem Hepatis et patum infra in medio tamen uentris.

¶ Illis uisus potes et carnare etiam hoc intestinū sicut alia a Me-
senterico, ut melius uideas duodenū quod cognosces in sua lon-
gitudine a stomacho ista esse in quantitate quātum sunt duo/
decim digiti per latum a stomacho uersus inferior.

¶ De Intestino Duodeno.

Ultimo loco est ut sciamus supremū de gracilibus dictum

¶ Duodenum et Dodedactylon cuius quantitas per lon-
gum apparuit superius sua latitudo est minor omni alio

intestino: et est raptā quanta est porta inferior uentriculi dicta
græce Pyleron: latine Janitor.

¶ Sua substantia est gracilis: Non est reuolutū sed rectum alliga-
tum uentriculo uetus suum superius: et alligatur Mesenterico:
circa Icturū: alligatur etiā Cystibilis per canale quod portat bi-
lem ad intestina mūdicāda: a p̄nita principaliter: et a fecibus.

¶ Ille canalis ingreditur diagonaliter in isto intestino: iuxta tunicā
et tunicāne reascendat bilis et forte Chylus ad Cystin.

¶ Istud canale est cautela considera: et conserua pro Anatomia
p̄dicte Cystis: sua iuuamēta sunt suscipere a uentriculo digesta:
et trāsmittēte ea ad alia intestina: paritū omne genus morbi.

¶ De Mesenterico.

Is uisus incide Duodenū infra portū ad ipsū ueniētem
a Cystibilis: primo ligando eū: ne in uentriculo cōtenta
ad alia intestina eiciat: et alia intestina eiciat: si ea prius ex carnassia can-
te ut p̄dictū est a Mesenterico seu Eucato: quod ab aliqbus etiā
dicunt lares. Hoc mēbru est inter ipsa intestina locatū: in eorū
ceruicē ea ligans dorso: et cōpositū est pro parte ex pelliculis du-
plicatis: ex Pinguedine et Glādulā quo sunt Venę multę ab
Hepate mediāte Vena porte ueniētes: q̄ cōter uocātur Mesetai
cē: et a Gal. dicunt manus Hepatis: q̄a rapiūt ab intestinis matē
et sanguinis et illā dāt hepati. Et istę Venę sūt ex aliq̄ Ramis
Venę portę: q̄ sunt extra heparā isto mēbro sunt et aliq̄ Arterię.

¶ Hoc mēbru est bipartitū: Prima pars est in superiore parte ad
icium et Duodenū alligata: q̄ est ualde glādosa: et hęc pars ha-
bet suas pelliculas simplices: et per istam partem trāseunt Venę

Duodenum,
Dodedactylon

Pyleron.
Janitor.

Ingressus bilis
non alia cystis
in duodeno.



Mesentericū
Eucato.
Lares.

Mesentericū,
Mesentericū
partis.

Mesentericū
duplex.

**Dolce modo
Bisaro.
Boca sapor
ita.**

potest ad Ventrículum/ad Splenē/ & ad Omentum/ hęc pars in porco est saporosi gustus/ & vulgariter vocatur Dolce modo & etiam Bisaro/ & Boca saporita. in illis magnis glandulis continetur interdum materia causans egritudinemque vocatur meli colia mītrachia.

**Secūda pars
Medenterij.**

¶ Alia pars huius mēbri est alligata aliis intestinis. Cuius pelli/ culę sunt duplicatę quia magna alligant mēbra dorso: hęc secunda pars ab omnibus habetur pro uero Mesenterico/ ista duo membra nutriuntur a uenis portę.

¶ Sua quantitas et figura apparent/ prima est minor secūda/ sua complexio est frigida: Colligantur dorso mediante Siphac.

¶ In uamēra eorū sunt ligatę intestina dorso: et subilitate Venas mēsericas et alias Venas portę/ et humectate feces intestinorū.

¶ Numero sunt duo mēbra etiam apud uulgates. possunt pati omne genus morbi: istud mēbrū seu mēbra debēt dināti in suo loco usq; quo ulla sit Anatomia Venarum portę.

¶ De Ventrículo/ qui cōmoniter dicitur Stomachus.

**Stomachus.
Stomachus.**

¶ Xpedito mesenterico per duodeniū supra relictū infra

¶ Ventriculū quātum potes: propter eius magnitudinem ultimam uidendam/ deinde reducas ipsum ad inflatio/ nem medio cremut melius uideantur in eo requisita.

¶ Ex primo notabis eius locū: qui est in medio torsus remotis extremis est immediate sub septotrāuerso/ a dextris habet Hepatē a sinistris Splenē/ Antra se intestinū Colon et alia intestina/ ante Omentum et Abdomen/ posterius Dorsum et cōtēta in eo/ suus situs est obliquus sub diaphragmate dorso alligatus/ pars eius superior est i sinistro ut cedat hepati in dextro et i alto locato: ut ad os eius facilius uadat meli colia a splēne/ pars eius inferior est in dextro ut cedat colo: quē in sinistro magnū occupans locū est tñ sua pars inferior i dextro uersus portanantiū minor q̄ in sinistro uersus Colona: q̄ i dextro locat occupat maiore locū q̄ Colon in sinistro locat: pars enā eius inferior est i dextro aliquantē ne offensa sint directasē ut cibus retineatur melius: et ut colera a Cysti facilius initer Duodeniū cōtinuū partē ipsius inferiori/

**Stomachus
curbatus.**

¶ Sua substantia est nerua a p̄dominio/ suus color patet i sua figura est rotunda arcuata ad modum manū cūcurbitulę: sua quantitas patet.

C Colligantur cordi per Arterias hepatis et Spleni per uenas cerebri per nervos descendentes, alligatur Ano per intestina, et Ori mediante gula alligatur Zirbo ante uersus, habet duas tunicas uetas. Intrinsecā magis neruicā propter appetitū: et magis grossam rugosam & durā: quia obulat cibariis duris, q̄ durior est in parte superiore & etiā magis sensibilis, habet extrinsecā subtiliorē declinatē ad naturā paucę carnis, intrinsecā aliquomō nutriti seu nutriti a chilo, extrinsecā nutriti a Vena portę, intrinsecā habet uersus interius uillos lōgos attractioni seruātes, uersus exterius habet obliquos retinētes, extrinsecā hēt Villos lares expellētes.

C Sui fundum seruit digestiōi mediante exteriori tunica et mediante calore mēbtorū circūstantiū. Est tamen et uirtus propria occulta digerendū sicut Mater generādbet hepatis sanguificādi: sui supius seruit appetitui adiuuante melācholia a Splene ad os eius emulgentē et propter hoc Repetitur sepe nigrum.

C Habet etiā Ventriculus tunicā cōmunē inuoluentē ipsum & alligantem dorso oriā a peritoneo, grossiorē quocūq; alio membro in uentre inferiori cōtētere recepto Mesentereo i quo est duplicata, et est talis in Ventriculo propter extensionem cibariōq;.

C Corpus eius est alligatū dorso cum officio suo superiore. I. in ter. xii. & xiii. Sphondyliū dorso quod officiiū proprie dicitur Sto machus et ibi ponitur medicinę pro confortatione appetitus: & hoc officium est in extremo inferiori Gule seu Meri: quę perforādo diaphragma ascendendō cōtinuatur Oris extremo, maxime sua interna tunica: et hoc officiiū clauditur a diaphragmate ne corporis inclinatione cibus facile redundet: Alligatur etiā dorso cū sua preterforatā cū pyloro alias pylorū seu portanatio, in loco ubi Duo denū a Mesenterio alligatur dorso, reliquum uero ipsius est solutū et mouetur de facili unde quaq; Ex portanatiō est altius fundo cōtēnente cibariāne cibus descendat indigestus.

C Numero est unum mēbtorū sua complexio, ex parte componentium est frigida et siccā.

C Sui instrumenta sunt appetere, Retinere: et cōcoquere cibū: et dare partem grossam intestinis, benignā autem et digestam alis mēbtoribus mediante Hepate.

C Passiones omnium modorū patitur: et propter eius magnam sensum ei comparitur cor et cerebrum.



Proprie stomachi.

Prima, Pylosus, Portanatio.

non
negl

De Splene.

Elleto Ventrículo in suo loco pro uenis portę uidenda

Splenis seu Lienis anatomie est uacā dūret p̄mo uide-
bis ipsum in hypochondrio sinistro situm adherentem se-

cundum suum paratū cōcauū. Ventrículo et secū dū gibbū cōti-
guū costis dorsum uersus et uersus latera et eorum peritoneo.

¶ Eleuabis tamen cadauerē si sederetur melius uideas eius si-
tum / qui est infra diaphragma / imediate i hypochondrio maxime
in uiuodn mortuo uerō iacente / uidetur esse sub costis : quia sua
grauitas impellit diaphragma de facili ad superiora quia pulmo
est uacuuus et Ratus / de facili cedēs potes etiā aliquas costas mē-
dosas eleuare ut melius uideas Splenis sitū : sic etiā facies in apa-
tonia hepatis propter p̄dictā causam / Cōueniet etiā aliqua-
liter hīc modus in demonstrādo stomachi sitū : qui etiam iacendo
cadauere propter inanitionē pulmonis / uidetur esse cū aliqua-
līa sup̄iori p̄e sub ossibus pectoris magisq̄ naturaliter sit i uiuo.

¶ Figura sua ē quadrata aequaliter lunata / Ratę substatie costis /
gatur cordi per magnas arterias (quas uidere debes) subtilitates
sanguinē grossum / qui subtilitatus Splenē nutrit / hepati ligatur p̄
tamū portę. Cerebro p̄ nervos : Mesenterē & Omēto p̄ Venas
& Siphac per p̄nīculū regentem / Stomacho per plures Venas
aliquę quarū nutrit finistrum uentriculi : & una emulget ad os
eiusdē mesēchoiā : quātitas sua est nota / sua cōplexio ponit cal-
da & humida : & propter contentū ponit opposita. Numero est
unum mēbrū / auuat totum corpus expurgando massam sangui-
nariā a fecer & ideo Risum prouocat / interdū sanguificat / in-
tar appetitum / iuuat digestionē Stomachi / omne genus morbi
patitur : & in eo est aliquādo peculiare curius & fortis motus in /
pedimentum : & traditur eo exempto per uulnus aialia interdū
uiere : & sunt qui putāt sui magnitudine risum adimē & interdū
mutant locum cum lectore : sed prodigiose.

De Hepate siue lectore.

¶ Iis p̄dictis cadauer ut supra paruit est eleuandum ut
hepat monstret suū situm / qui est imediate infra dia-
phragma in hypochondrio dextro. In hominē magnum
quia est animal calidū & humidū / lunaris est figure. eius cōcaui
est uersus uentriculū / gibbū uero est cōtiguū costis uersus dia /

Splen.
Lien.



Adi. Sanguis
A. 1000



Hepat.
Epat.

phragma/superius tamen: & uersus latera et dorsum uersus.

¶ Sua substantia est caro ipsius et Rete ex uenis contextum in ipso dispersis: sua caro est sanguis coagulatus. habet quinque lobos seu penulas: interdum quatuor et tres: interdum duas.

¶ In concavo / est una Vena dicta porta: quę ipsum ingreditur Una porta. cum quinque Ramis ad minima per totum uersus gibbum dispersis: ut chylus in eis ad minima diuisus / melius transmutetur in sanguinem.

¶ In pcano etiā ē cystis parua misclās sanguinē a bili / siue a cole Cystis parua
ra uel se anteq̃ trāseat ad gibbū. In cōcavo etiā / in Vena portę
ingreditur Vena umbilicalis a nutriendū fetum in utero matris.

¶ In gibbo est una Vena chilis dicta / etiam cū quinque ramis ad minima per totū corpus eius dispersis / Minimi rami chilis eoasso
mantur seu ununtur cū Ramis portę. et ab eis fugunt sangui- Cista emboli
nem deputatum a colera et a Melanchollamixtum tamen a quo Cista chilis.
sitati: qui in gibbo ulteriores acquirit decoctionem.

¶ Hepar euēatur in parte eius gibba a septotransuerso et a uena Cuius nom
chili per ipsum ascēdente ad Cor: per quā alligatur ei / habet etiā
Arterias paruas in cōcavo eius per quas euēatur hęc Arterię ue
niunt ab Aorta ibi propinqua cū difficultate uisibiles / alligatur
Metaphreno per pāniculum suum suspēdentem: & Abdomini
per Venam Umbilicalem / Cerebro per neruum / Mediante ta
men pāniculo octo a pēritoneo a quo circūsoluitur: Alligatur
etiā omnibus membris habentibus Venati / suā complexio est
calida et humida. Numero est unum / partes ipsius sunt propria
caro: Vena portę et Vena chilis / Arterię: Nerus cum pāneu
lo: et Cystis cholery: Sua operatio est sanguificatio: Sua proptia
passio est hydrops: patitur tamen omne genus morbi.

¶ De Vena portę.

Xtra substantiā hepatis ē etiā uena portę teste Gal. sic di Cista portę.

¶ et a uiro uersuto circa naturam: et ab illo testantur no
men usq̃ nunc: quod Hep. & totus cerus Asclepiadis
laudauit. quia porrāt sui rami pteclaboratum in Venite cibum
ad totius animalis digestionis locum: quem uocamus hepar.

¶ Hęc Vena extra hepar habet octo partes: duę sunt parue / sex
maiores / una ex minoribus habet duos ramos / unus nutrit Duo Cista porta
denum: et alter Mesenterium: Duo deno cōiugum. partes.

¶ Alia Vena minor nutrit Ventrículum iuxta portanarium.

¶ Prima ex sex maioribus nutrit partem latā exteriore Ventrículi.

¶ Secunda cum aliquibus ramis vadit versus Splenem; qua primo unus Ramus vadit ad Mesentereon nutriendum; deinde unus alter magnus ramus vadit ad Splenem; qui in ula in plures dividitur ramos; quorum unus magnus nutrit sinistram partem inferiorē Ventrículi.

¶ Hic met Ramus sequitur ingrediens Splenē; & emittit a se duos Ramos; quorum unus ascendit; alter descendit; ascendentis tres sunt partes: una pars nutrit Splenē; alia nutrit superiore partem Ventrículi; altera pars transit ad os eius emulgendo melancholiam ponticam pro appetitu incitando; quæ ut plurius egreditur cum fecibus per Intestina.

¶ Vena predicta descendens bipartitur unus Ramus nutrit Splenē; alter vadit ad Omētum i parte sinistra & ipsum nutrit.

¶ Tertius ramus ex sex predictis vadit a sinistris ad Rectum intestinum suggendum.

¶ Quartus etiam ramus ex sex maioribus in capillates spargit ramos; quorū aliqui ad dextrā partem Ventrículi nutrēdā vadunt; & aliqui vadunt ad nutrēdam partem dextram Omēti.

¶ Quintus ramus vadit ad Mesentereon i loco ubi alligat colo.

¶ Sextus vero vadit ad Mesentereon in partem ubi alligatur ieluno & ileo cū suis ramis; qui dicitur Venę meseraicę; & hæc est satis magna: Substantia harum Venarū est qualis aliarū: Sua qualità; & suus principalis numerus et situs; et figura ac colligātia patentis sua complexio est frigida et sicca; sed ratione contenti est calida et humida; suum iuuamentum est pelaboratū cibi ducere ad hepatis digestionem etiam secundam incheat cū suis ramis; portat etiam nutrimentum Ventrículo; Spleni et Omēto; et Intestina nutrit; passiones omnium modorū pati unet presentim oppilationes et etiam apertionem suarum meseraicarū; et interdū scissuras; et comparitur hepatis in omnibus eius morbis.

¶ De Cysti (continente colemam sive bilem) :
quæ a vulgaribus dicitur Fel.

¶ Cystis bilis uel colemę Fel dicta est folliculus sive saccus i cœcavo hepatis adhærens penulę medianę eius: cōpositus ex substantia paniculari subtili; solida; exente san-



Cystis bilis
folliculus
saccus.

guine: unā solā hīs tunicā: tectā pāniculo tegēte hepar. / ea sunt
uilli omniū modogitertius hēt lōgos et obliquos: exteriū latos:

¶ Sua substantia est subtilis: quia non digerit aliquid: et dura est ut
resistat acuitati colere / habet unū porum intrantem folliculum
immediate (qui dicitur cōmunis) maiorem aliis: qui secundum
aliquos tripānitur: et secundum aliquos alios quadripartitur.

¶ Vnus uadit ad hepar continuatus est Vena portēa qua trahit
colerā per angustas uias: in isto poro sunt uilli longi tantum.

¶ Vnus alter porus uadit uersus hēstina: q̄ duplex in certa di/
stātia: cuius una ps uadit ad Duodenū uersus Ieiunū: ut mōdet
hēstina a phlegmate & fecibus pp acuitatē colere p eū trāsmittit
et ille porus ingredit̄ diagonaliter in duodeno h̄et tunicā et ru/
nicā eiusne colera: et in hēstino cōtēta retrocedāt et oppilēt eū.

¶ Alius secundum aliquos uadit ad pyluron Ventrīculi: ad cōfor/
tandū digestiuam cum sua colera: qui si est magnus: facit homi/
nem infelicem propter continuum colere uomitum: et istum po/
rum aliqui negant: per collum cōmune quod ab aliquibus po/
nitur pro quarto ramo: sit attractio et expulsio.

¶ Sua quantitas et figura paret: Numero est unū mēbruū: colliga/
tur cordi per Arteriam paruam quam habet: et cerebro per ner/
uum paruū: complexio eius Innata est frigida et sicca.

¶ Sua iuuamenta sunt expurgare sanguinem a coletis: et calefa/
cere hepatis digestiuā: & ipsam a putrefactione seruare: confortat
etiam Ventrīculum: & ipsum mundat a pituita: & tonat expulsi/
uam intestīnōrū: & interdum homo caret selle: hic tamē est Va/
litudine infirma & breuioris uitę.

¶ Passiones omniū modorū patit̄: Sua propria passio est oppil/
tio: quā causatur morbus regius seu Ictericus: et si est oppilatio
in poro cōstet corpus nō expurge: a colera: tūc sūt egritudines
colericę diuersorū modorū: feces tamen possunt esse coloratę.

¶ Si uero est oppilatio in collo rēdente ad intestina et ad porta/
nam: tūc feces sūt discoloratę: & et colera nō expurgat̄ a Cysti/
sed regurgitat ad hepar: & cū diuersas egritudines colericas.

¶ Et si in collo uersus hepar fiat oppilatio: feces poterūt esse co/
loratę aliquo tempore: et causabit etiam egritudines colericas di/
uersorum modorum: sed durante oppilatione feces erunt disco/
loratę cētera diximus in cōmento supra Mundinum.



Pyloron.

Oppilatio q̄
fio.

DE ANATOMIA

¶ De magna Vena chilis: Aorta descendens
tribus: & emulgentibus.

His prædictis abicias Mesentereon Splenem: et Hepan
de cuius parte gibbosa reserua illam partem: a qua ime
diate exit cœnalis magnus Venę chilis: ut possis uidere
eius ortum: reliquendo tamen Ventrículum detumefactū in suo
loco: ut deo eo uideantur etiam aliqua alia.

¶ Primo uidebis a gibbo hepatis exire Venā magnā: quę dicat
parigibba: & chilis: & cœcauat uenarū materia qua ad oēs par
tes aialis/mediastibus suis ramis dispēsať sanguis: cuius sunt cœce
ptabula: Hęc Vena est subtilis/porosa & lenis/ non bituncialis si
cut Aorta Arteria/ ne plurimū temporis cōtineat sanguinē: qui
grossius est: sed ut cito mēbra nutriat: est etiā talis quia motu ca
ret: Arteria uero subtilem uehit sanguinē/ qui ab aliquibus spiri
tus uitalis nominatur: hęc p̄tinue fistolat & diastolat/ ideo dura
grossa & cōpacta est ne rūpatur: & est talis/ ut diu cōtineat subti
le in ea cōtentum sanguinē: qui propter mortū resolutioni dispo
nitur: Huius Venę pars superior ascēdit ad cor & ultra perforan
do diaphragma: quę uocat chilis ascēdēs: de qua suo loco dicet.

Parigibba.
Chilis.
Cœcaua.
Uenarū ma
ter.

Chilis e. Aor
ta descendens.

¶ Hęc met Vena descendit dorso herens directas: & uocatur chi
lis descendens: quam concomitatur magna Arteria descendens
Aorta uocata: quā cū diligentia uide simul cū Vena: Vena ta
men est supra Arteriam/ & sunt ambę peritoneo inuolutę.

fascia renū.

¶ In descēsu ab utraq; earū: primo diuidūtur Rami: qui uadunt
ad fascias seu pāniculos Renū: cū uero sunt in directo Renum:
Vena pariter & Arteria emittūt a se unū notabilem Ramum a
dextristaliū a sinistrisq; sunt Renibus cōtinui: hi Rami dicuntur
emulgētes: ut plurimū dexter Ramus est altior sinistro: quia de
bet esse propinquus hepati: ut cito munder ipsum ab aquositate
in chili cōtenta: & sinister est dep̄ssior: ut suus Ren cedat. S; leni
dep̄ssiori hepate: ista orificia nō sunt sibi directas: ut attrahat a pro
pinquis primo: a lōgins secūdo: & ne attractio sit se se ipediens.

Uenę emul
gentes.

¶ Ab ista Vena similiter & ab Arteria magna sub Renibus alię
multę sepantur Venę et Arterię: quę Rectū/ Vesicā/ Matricem
et partes sibi uicinas nutriūt. s. q; in directo cuiuslibet sphōdyli ab
utraq; earū/ unus Ramus ipsum ingredit: & spargit in musculis
sibi uicinis/ ex p̄dictis etiā Ramis ita quēlibet sphondyliū ingre



definitur Ramis subtilissimis: qui Nucā spāniculos: & ligamēta sphon-
dylos ipsam Nucam inuoluentes et ligantes cibantur. In ipsorū
sectione uidebis: ex p̄dictis etiā Ramis: aliqui uadunt ad muscu-
los et ad membranā Abdominis.

¶ Hęc Vena pariter & Arteria: circa os sacrū infra sphon-
dylos bifurcat i duas partes equales ad formā littere gręce: quę
Lambda dicitur: istas Arterias bifurcatas aliqui uocāt sempiternā. Lambda. 10
Arteriar sempiternar.
nas: in quibus ingreditur duę Arterię Vmbilicales: una quantū
est a dextris: alia a sinistris: q̄ ad latera uesicę in ipsas descendūt.

¶ Istę Arterię et uenę bifurcatę: una a dextris: alia a sinistris uer-
sus coras descendendo: secundum aliquos in quolibet latere in
decem diuidūtur partes: quarū una nutrit inferius dorū per lū-
bos uersus Renes dispersa: intra et extra.

¶ Et una alia pars in capillares Ramos diuisa nutrit peritoneoni

¶ Et una nutrit musculos profundos corę.

¶ Et una nutrit musculos ani. & ab ista oriūtur uenę hemoroidales

¶ Et una nutrit collū et os: matrix. a qua etiā duo Rami uadūt
ad Vesicā: unus ad fundū: alter ad collū ipsius: et qui ad collū in
seminis parus est: in utris uero magnus propter uirgam.

¶ Et una alia de decem uadit ad partes pectinis.

¶ Et una alia tēdit ad musculos lōgos Abdominis: cuius Rami
ascēdēdo cōtinuātur cū uenis pectoris descēdētibus uersus ipso: Vene ad ma-
millas.
et isti simul uniti tēdunt ad Mamillas: & ab isto Ramo i fœmina
notabiles partes ēt uadūt ad matriçē: a quo duę Venę Arteris
nō associatę per abdomen usq; ad Mamillas ascēdunt: per quas
ipse alligātur matriçē. Et ideo in p̄gnātib; et in tēpore retentio-
nis p̄ternaturalis menstruorū: ut plurimum tument Māma.

¶ Et una alia ex decem uadit etiā ad matriçem in fœmina: in
Mare uero uadit ad uirgam et ad scrotum.

¶ Alia uero uadit ad uniuersos musculos corę.

¶ Et alia pars: q̄ decima est: etiā ad corā tēdit: et ista ē n̄tabilliss-
et descēdit per iterius corę: et cū est prope genu sub poplite diui-
ditur i tres Ramos: quorū unus obliquat uersus exterius cruris:
et tēdit usq; ad parū pedē: et hic Ramus uocāt scatica: quia in
ipsius dolore incisus cōfert: et ortum istius Rami non cognouit
Mūdinus: unus alter ex tribus p̄dictis descēdit per iterius usq;
ad pedē: et hic uocāt Saphena: Tertius uero Ramus tenet me/

Sotia.

Saphena.

diūm inter p̄dictos ramos· qui omnes cibant erus et p̄demus
de istis fiet sem̄p in Anatomia magna pedis.

**Plures vñ
q̄ arterie
et quā.**

¶ Aduerte tamen quod sunt plures uenę q̄ Arterie teste Gal.
xvi. de utilitate partū cap. xxi. & c. xxi. & teste sensu & ratio est q̄
sunt multa mēbra frigida naturaliter euēratione nō indigētiaq̄
bus etiā sufficit paucus spiritus. Ideo nō habēt Arterias multas
& i manibus & i pedibus & i cerebro & in parte superficiali colligē
in cute totius sunt uenę aliq̄ abiq̄ Arteriis: Nulla tñ Arteria
est sine uena sibi coniugata aliq̄ quarū maxime notabiles / sunt
alligatę simul per p̄niculū ortū ab Arteriis & sunt simul unitę
ut firmētur & fortificētur Venę a p̄niculo p̄dicto: et ut Arte-
ria uiuificet uenā: & q̄ uena det sanguinē arteriē i necessitatibus
de quo fit spiritus uitalis & nutrit ip̄a arteria: Arterię uero p̄mę
nō sunt ligatę cū uenis p̄ p̄niculū p̄dictū quāuis sint iuicē socię
sed sunt socię ut uiuificēt & nutriāt mēbra: teste Gal. ubi supra.

¶ Et uenę & arterię aptopingtonibus locis uadunt ad sua mēbra
cibāda / exceptis uenis et arteriis Testis et Mamillarū: quę a re-
motis uadūt ad ipsas sanguis diu in eis moram trahit per quā
melius digeritur et facilius in bonū conuertitur sperma & in hoc
et sunt multę arterię et uenę sensu impceptibiles / ut quę ad ossa
et ad cutem / et quę ad extrema mēbrorum tendunt.

¶ Situs harū Venarū et arteriarū: & ē substantia & q̄ritas & figu-
ra patēt. Sępē tñ uenę mutāt sitū numerū et q̄ritatē & iō autho-
res de ip̄is sunt discordes: Numerus Ramorū ipsarū i p̄ceptibilib
est: sua colligātia apparet ex dictis et dicēdis: sua iuuamēta sūt nu-
trire et uiuificare totū corpus / passibiles omnibz modis patiuntur.

¶ Accidunt tñ eis morbi cōpositionales de sūma oppilationis / q̄
sūt deteriores oppilationibz nariū: & intestinorū: & similibz locoq̄
tñ q̄a sua oppilatio prohibet mēbra nutritiā p̄mitēs sanguinē
ad ea fluere: tñ q̄a Regurgitare facit sanguinē ad hepat. q̄ facit
in ip̄o oppilationē / uel puritē / uel aliquas malas iduct egrediēti-
nes: Sua etiā oppilatio ē mala / q̄a sępē est i cognita: & quia male
eis applicātur medicinę / tam intra corpus q̄ extra: suę solutiones
possunt esse a causa intrinseca et extrinseca / cuius tres sunt spēs
una cōiter dicitur dyabrosis / q̄ est uene corrosio / a dya quod est
de seu compositio & brosis seu rosis quod est comestio / alia spēs
dicit Raxis / q̄ icisio interpretatur. Tertia dicit Anasomosis / quod



Dyabrosis.

Tertia.
Anasomosis

¶ De Didymis.

Aec uasa simul cū Testiculis a fundo scroti usq; ad imū

h Illoꝝ in quolibet latere inuoluūtur uno pāniculo / cuius maior pars orta est a pithoneo / i fine Abdominis in scroto descēdente / qui cōllet didī Didymus et suspēnsorū Testiculū pāncis dicī Cremasteras / substātiā cuius cōsideraūq; est ex tribus & forte secūdis aliquos ex quatuor pāniculorū reuolutionibus.

Didymus sū
sponsorū test
culi.

Cremastera.

¶ Prima est exterior orta a pāniculis spondylorū : alia est orta a Siphacis / seu peritoneo iuxta semut intra Abdomen cōtento : quę Darion a Celso dicitur .



Darion.

¶ Ex istis duabus pp suā fortē colligātā sit q̄si una pellicula sola.

¶ Alia est ex pāniculo imediate inuolente uasa p̄dicta a pithoneo circa dorsum orta / quę dicitur Aegitroides .

Aegitroides.

¶ Alia est ex cordis musculorū testiculorū : quę exigua est.

¶ Considera etiam quantitatem & colligātā : complexionem & numerum . Figuram habent Cylindricā superiori stricte / in fundo latam quantum est grossities Testium .

¶ Iuamēta sunt suspendere testes & manutenere uasa p̄dicta :

¶ De Scrotis : quod aliqui scrotū uocāt.

X istis pāniculis & cute cōponitur oscheum seu scrotū . i.

Oscheum.
Scrotum.
Bursa testis.

c bursa testium . In qua sunt aliqui nerui sensum et dātes :

& aliquę arterię & uenę illud nutriētes : et scrotum a Celso scrotum dictum est unum mēbrū duobus Didymis cōmune : et est sinus seu camera Didymis Testibus : et seminaris uasis .

¶ Hoc mēbrum est per medium diuisum a leui mēbrana / quę ab aliquibus dicitur suturæ taurinæ corda : quę etiā aliquāter apparet in cute exteriori i medio scroti faciēs quā dā rugā secūdis lōgū corporis : huius mēbri quāritas : figura : situs : numerus : & colligētia patēt . Sua cōplexiō ē frigida & sicca . Iuamēta eius patēt .

¶ Hoc mēbrū cum didymis omne genus morbi patit . Sua propria passio est dilatatio eorū : qua mediūte multę sunt Ramices hernię dicte . i . Zirballis : Omentalis dicta : alia intestinalis : i scroto etiā sit hernia siue hymea aquosa : uentrosa : humoralis : et carnes : et etiā uaricosa / quę fit per repletionem uasorum seminalium factam a sanguine grosso / seu multo et aquoso .

Ramē.
Denua.
Hymea.

¶ De Testiculis.

I Nita p̄dicta suspēnsoria ab utroq; latere sunt duo mē

*Teficuli.
Oua.*



bra glandosa alba similia carni mamillari: quę uocatur Teficuli liquorū figura est Oualis: et ideo etiam Oua dicuntur: carter sua substantia sanguine et omni sensu: Sentit tamen per suos pāniculos: eorū quilibet habet duos musculos pāniculis suis hęrentes: ut ipsos custodiant et eos eleuent ne laxentur.

¶ Sua quātitas, suus numerus: et situs parent: sua cōplexio inata est: repata i actiuis passiuis humida. Influxus trī ē calida, qua mediate teste Arist. trahūt a toto ad se materia spermatis sicut uēno facit a medicis ponūtur iter mēbra p̄cip̄alia: colligātur aliis mēbris principalibus, p̄ uenas, p̄ arterias et p̄ pāniculos: sua iuuamēta sunt cōseruare spēm, Passiōes omniū modorū patitur.

¶ De Vesica.

Stis expeditis eleua Renes cū poris umidibus a uesica ortis: itra tunicā eius magis uersus collū q̄ fundū Igredētibz dyagonaliter ne urina regurgitet ad eos, per istos poros interdū trāsit ad uesicā lapillus i Renibus geniturus: in eis extensionē faciens cū inrēso dolore, quia sunt nerui ut uesica.

¶ Scinde primo corpus uesicę circa fundū eius, quod est unica tunica cōpositū: in parte cuius exteriori uadūt duo nerui p̄ se: uel ipsi sunt: Primo notādo eius sitū, qui est in inferiori parte uētris in cōcauitate Aqualiculi: in qua est etiā Rectū intestinū dorsum uersus et matrix in eorum medio: in femina.

¶ Notabis etiā suā colligantā: et quātitatē: et figurā: et numerū: substantia cuius est neruea ex neruis ligamenti, in cōsolidabilis si soluatut. in collo carnea est: et ideo ibi cōsolidatur: suū collū ē uirgē unīcū per totū ulq̄ ad extremū glandis: unde exit urina.

¶ Sua cōplexio ē frigida & sicca: est circūuoluta uno pāniculo a peritoneo orto. sua iuuamēta sunt diu retinere urīnā ne cōtinuē homo surgat ad eā emittendā: sed quasi cōtinuē fluxit a Renibus ad ipsam, suā retentionē iuuāt certę carnes glāndosę p̄cipiū sui colli extra inuoluētes & comprimētes: cauantes in ipso collo an fractus aliquos, propter quos uesica nō mūdatur ab aquositate integre, & suā retentionē uolūtariā & ēr expulsionē iuuat unus solus uesicę musculus os eius inuoluens.

¶ Passiōes omniū modorū pōt pati uesica, q̄ sunt interdū icterabiles, sicut est p̄e grandis lapidis: & excoartio in cotęe coletico & in sene. Sua etiam notabilis Solutio est lętalis

Aqualiculus.

De Virga .

Ost fidei membra occurrunt Virga; q̄ est de substantia ligamentali: nervosa etiam & cavemosa est ut spongia cum aliquibus tamē musculis, hēt Virga pariter & Lingua plures & maiores Venas & Arterias q̄ aliud membrum sibi simile in magnitudine: per predictas porositates duce imaginatiua. Virga sola sepe a spiritu magnificatur & erigitur. In ea n. est virtus naturalis: per quam cū animal mouetur ad coitū instatur et dilatatur: sicut fit naturaliter motus in corde et in Arteriis. In his autem fit semper propter necessitatē in hoc uero aliquādo: & sepe inutilis ē: sua origo & situs ē ex pte pectinis i medio oibus nota.

¶ Sua figura est oblonga rotunda, habēs in se cānale: per quod exit Vrina & sperma: summa pars eius Glans & caput Virgē dicta esse: ibi est cōpacta, dura, & obtusi sensus ne i coitibus lēdatur. Istam glandem circūdat certa pellis mollis: quę dicitur Pręputium obediens reuersioni in omni confractione.

¶ Hoc pręputiū in parte inferiori i medio tantū per longū alligatur maiori parti glādis per certū p̄liculare membrum a vulgari dictum el fellelo. Numerus & etiā quātitas eius patēt. Sua cōplexio inata per influētē est calida & humida: colligatur est osse pectinis: cū A denosis parastatis: cū uesica mediante cānali extra fluante urina: com Cerebro mediātibz henis ad musculos & ad cutim eius uenientibus: cū corde & hepate mediātibz Arteriis & Venis descendētibz p̄dictis.

¶ Virga hēt i se tria foramina: unū latū quod ē cōe sp̄mati & urina: & duo parua q̄ in isto cōi igredit̄ sp̄ma a uasis seminarys ite dictis uenēs: ista duo orificia seu uasā igredit̄ hoc cānale i loco dicto p̄ned: q̄ i mare ē locus iter Anū & radicē uirgē: & i semina est iter Anū & fissurā colli matricis ab istis foraminibus ad uesicā secūdu ueritatē istud cānale dicit̄ collū uesicę ab hinc usq̄ ad extremū glādis: dicit̄ foramen cōe & cānale uirgē: & ab aliqbz dī

¶ Habet et Virga quatuor musculos: duos uersus sinū (Vettra. i. fterus) ab utraq̄ pte unū iuxta cānale urinę: qui secūdu lōgitudinem extēsi sunt & dilatant Virgā & illam eleuant ut sperma p̄ ipsam cū facilitate penetret. Duo sunt alii eius Musculi a radice ipsius uersus os pectinis orti: ueniētes trāuersi uersus glandem in parte eius sup̄ioris q̄ cū tēdūtur: Virga eleuatur: & cū cessant a



Glans.
Caput virgę
Pręputium.

Fellelo.

Perineon.

Sinū cōe.
Cānale virgę
Vettra.

tenfione deprimitur / q̄ si uni accidit tenfio & alteri non / uirga
declinabit ad partem Musculi tenfi .

Figurae

¶ Vilitas Virgæ est facta principaliter pro conseruatione sp̄s.
Ipsa n. mediare micti sperma in Agro naturę . Sin. Matriceque
si est moderatę quantitatis, sicut & lingua laudatur & utilis est
Ipsius. n. breuitas nō ducit sp̄ma ad locū debitū: & sua nimia len
ginitudo est causa resolutionis spiritui in spermare .

¶ Virga etiam per colligantiam suam euectat uescicam ab urina
culus signum est q̄ pediculus officio eius externo applicitus
mordicando prouocat eam.

¶ Iunamenta preputi & pelliule prædicte alligantis eum glan
di sunt prebere aliq̄ delectationem in coitu : & tueri glandem a
nocumētis extrinsecis. Istud preputium eliciūt hebrei in circumci
sionibus : operantes contra intentum naturę. Passiones oronū
modorum patitur uirga. sua propria passio est priapismus.

¶ Ad istā anatomīā bene uidendā prius notatis annectitis & no
tato situ Recti intestini: scilicet pro / salce, / uel ferra, / uel alio ingenio se
para os pectinis a sua pte lateralis: & simul cū ossē separa notabilē
partē clunī s. l. illā in qua sunt musculi Ani: & eleua Rectū: uesi
cā: & uirgā cū uasis seminariis & poris uritidibus prædictis: & pone
p̄dicta mēbra prius lota & mūda a stercore & sanguineitate in eis
cōtenta supra aliquā tabulā : ut p̄dicta melius uideas a p̄dictis
mēbris cum diligentia solum os pectinis abiscendo .

¶ Ex primo notabis locum pororū uritidorū prædictorū uescicam
ingredientiū: in eis ponēdo specillum seu radium uel aliquod ra
le: & uidebis penetrare eum diagonaliter per substantiam corpo
ris uesicę in suam concauitatem : ut p̄dictum est.

¶ Istis uilis uidebis etiā uasa seminaria prædicta inter rectum &
uesicam ingredī: & cum incisōdo aliquo cum cautela separa te
rē a uesica / quia in loco isto hæc membra sunt simillime alliga
ta: & uidebis prædicta parastata cauernosa & lata: & ea incidendo
uidebis sperma ibidē contentum pro duobus uel pluribus costi
bus: & hæc uasa terminantur in cānali uirgę .

¶ Et circa istum locum uidebis carnem glandosam notabilem
ad latera colli uesicę / quę aliquasiter digerit & dealbar sperma
ibidem contentum / uel saltem conseruat ne exsiccetur: conseruā
do etiam in eo spiritum genitium.

¶ Tenent etiam istę carnes sic colluta uesicę exsiccetur & etiam uirga : quę prę sua longitudine extra pendens exsiccare & claudii apta est : & propter hoc ista carne careat foemina. Iste etiam carnes cum sua aliqua uictuositate resistent acuitati urinę.

¶ Istis notatis pores scindere uirgam p lōgum : & uidebis cā nāle predictum cum ostiis : p que ingreditur sperma : que sunt duo unum a dextris / aliud a sinistris nō multum distantes a concauitate uesicę : uidebis etiam corpus uirgę cauernosum uel porosum ad instar spongię nō multum cauernosę sed cōpacte aequaliter :

¶ De Recto .

¶ Otatis p̄dictis debes remissa de loco Intestini Recti su-
n pra dimissi p anatomia Antiquod considerabis esse i cō-
cauitate Aſculi & terminatur iuta Nates i loco dicto
Anus. a quo exiūt excrementa p̄imę digestionis ordine naturali.

Eius pars sup̄ma tendit ad sinistrum ubi i testino colo alligatur.

¶ Cōsiderabis et suā ſituarē q̄ patet : suā figurā : firmitatē & num̄q̄ uiduū supra colligatū h̄er cū cordes cū hepate & cerebroscū uel ca in matre / cum Matrice in foemina.

¶ Cōsidera etiam eius cōplexionē / quę est frigida . Ideo est intra nates ne ledatur a frigore .

¶ Deinde seca ipsum per lōgum : & optime lauādo : notabis eius inuersionem / quę est ab exteriori interior : ascēdens per quatuor digiros uel circa . Videbis . n̄ . sepe terminū suę iuerſiōis : & interdū nō uidebis hęc iuerſio mīdat ipsum a sece / q̄a egetendo rectum aequaliter descēdit : & hoc optime uidetur i equis egerētibz .

¶ Extremitas eius inferior dicitur Anus & podex & Sphincter : & alia multa habet nomina a me recitata in cōmentariis super Anatomia Mundini .

¶ Sua substantia est carnea et p̄nculosa / quę cum musculis red- ditur magis carnosa . In eo est aliqua pinguedo extra uersus / i eo sunt uilli multi lati & longi / pauci obliqui longi sunt extra & in- tra / iuuantes expulsionem inferior trahendo .

¶ In eo sunt quatuor musculi : unus est in ostiis eius extremos cuius mixto cū ipso p rotū dispersus : qui cōstringit Anum unde / quaq̄ quo fit ut stercorea integre ab eo mūdētur : est alter muscu- lus magis intra uersus caput hominis eleuatus . qui habet duo ca- pita et hic cōtinuatur cū radice uirgę : huius uilitas est extremū

Rectum.

Intus.

Recti iuerſio.

Recti iuerſio.

Intus.

Podex.

Sphincter.

Cervix populi
timoris recti.

Ani aetate: post istos ē unū musculorū par supra alios trāscētia/
liter rē dēscūtus iuamētiū est rectū sūsum eleuare: quo mollis/
cato sit Recti precipitatio extra Inter Nates: ad certā distātiā.

¶ In extremitate huius intestini appatent plures uenę: in aliqui/
bus notabiles: in alijs occultę: quę dicūtur marisq; & Aemor/
roidales: paroxysmali ter fluentes: quas considera.

¶ Iste Venę oriuntur a Ramis Venę chilis descēdentis qui mu/
sculos Ani nutriunt: multi eorum profluunt: ulce purgationis
uruntur: nec ualde debiles ob id fiunt.

¶ Iuamēta Ani sunt educere stercore hora debita: sui musculi
iuuāt parastata ī emissiōe spmatis ī coitumulus Egnū ē q; sūt aliq;
coēctes simul & egerētes: iuuant etiā uesicā in emissiōe Viniq;.

¶ Passiones omniū modorū patit Anus: q; oēs sunt difficilis: sana/
tōis: & iter alias: Recti extremitas sicut & matris ptochit: quā
stipticis retro ducimus. Cōdylomata etiā seu Tubercula qđam:
heus & etiā fungi inascūt: Marisca itē & Ragadas seu Ragadę
q; ex inflammatiōe oriū solēt. Hos tñ morbos siendū laetitia lux uis/
pccitatis: & extuās libido ī utroq; sexu diuerticula qđrando: ne/
glecta natura: nō sine ipsius & maiestatis diuinę iniuria facit.

¶ De Matrice nō p̄gante.

¶ His mēbris in mate in uētre isēnoti cōtentis: ad feminā
anatomizādā trāscōm qua uidēda est anatomia matris/
cis. Suorū Testiū cū uasis seminatilis et sua uesica.

¶ Matris q; ēr Vulua dicitur duas habet ptes. s. Receptaculū: seu
sinū: uel cōcavitatē: & ceruicē seu collū: & ē mebrū ad propaga/
tionem a natura genitū: substantia sui Receptaculi est neruea: ex
neruis ligamenti & carne cōfusa mixta: ideo parū sentit: et unica
tunica est cōposita: citius uoluta peritoneo: et est Neruea: ut ex/
tendatur in coitibus: & ut aggreget apud quantitāē paruam in
partu. Tota etiā sua cōcavitas mouetur ad centrū in acceptione
spermatis: & illud amplectitur et tangit cum suis lateribus.

¶ Substantia uero suę ceruicis seu colli est lacertose carnis: qua/
si cartilaginea cū aliquali pinguedine hñs Rugā supra Rugā:
q; dāt delectationē ī cōfictiōe ī coitibus. Hęc ps ē satis sensibilis.

¶ Sua cōcavitas dicitur Vterus: Venter: Receptaculū fœtus
fissura quę est in orificio ceruicis dicitur pudendum muliebre &
uulua: & natura: & os genitale.

Cōdylomata
Tubercula.
fima.
fungi.
resaricet.
ragadas.
ragadę.

Cervix.
cervicis.

Cervix.
Collum.
Cervix.
Cervix.
Receptaculū.
fissura.
Pudēdū mu/
liebre vulua.
Os genitale.

In hac ceruice locatur uirga in coitibus.

Inter ceruicem et receptaculū intrinsecus est certa substantia pellicularis carnea satis sensibilis: in medio perforata: dilatabilis et cōstringibilis: os matricis dicta, formā habens capitis mugili-
*Os matricis
e ipsius for-
ma.*

Ceruicis figura est Oblonga: Rotundior concava: Intusolata tanta est quāta est uirga secum coeuntis: in uirgine uero est minor.

Circa eius mediū est pāniculus uirginalis dictus: ut Rete cōtextus ligamētis subtilibus et pluribus Venis: quo uolata ca-
*Virginitas
virginalis.
Eugon.
Cento.
Imen.*

Externo ceruicis Additē sūt a laterib⁹ pelliculęq^{ue} spūtia dñr.

Intra ceruicem parum uersus os pectinis ingreditur collum ue-
*Abingdo sic
strepit in
muliere.*

Figura receptaculi est quadrangularis cum aliquali rotundi-
Conua.

Receptaculo uersus ceruicem est ab utroq^{ue} latere unū addita-
Conua.

Circa hęc conua uerigi est unus Testiculus durior et minor
*Testiculi
mulierum.*

Isti Testes nō habent unicum pāniculum in quo ambo con-
Conua.

Isti Testibus implantantur Vasa seminaria p̄dicta: quę a Testi sp̄atis-
*Testi sp̄atis
na e deponē
na.*

*fossile.
Cotilidones.*

C Horū Vālorū plurima officia fossile & cotilidones dicuntur / per ea fluit mēstrua / ab eis fetus haurit nutrimentū per Venas & Arterias Vmbilicales fossulis predictis alligatas.

In foemina non sunt parastata uasa / nec epydidymū uas / quā in foemina uasa mollia sunt nō ledentia Testes sicut in mare propter eorum duritiem.

Matrix tota cum suis Testiculis et uasis seminariis est similitudo mēbris generationis utrotum: sed membra utrotum sunt completa extra propter suū calorem expulsa: seminariū uero sunt dimi-
nuta intra retenta propter suū diminutum calorem.

*Scortū ē mē-
bris cōuersus.*

Et matrix est quasi cōuersum instrumentum. Collum. n. ma-
tridis est quasi uirgula eius receptaculū cum testiculis et uasis ē
sicut scortum. Scorto. n. in uero intra ipsum est cōcavitas: et ex-
tra ipso etiā in uerso latent testes et uasa seminaria: sicut recepta-
culo matricis: Virorū tamen testes et uasa sunt maiora.

Periton.

Situs fissurę matricis est inter Antū et os pectinis: et locus qui
est inter utraq; officia peritonon dicitur.

Cerui a fissura per uentrem supra ascendit usq; ad receptacu-
lum: cuius locus est inter Rectum et Vesicam. Hęc omnia sunt
in concavitate Aqualiculi per longum sita.

Receptaculū quātitas in puellis exigua est: et minor sua uesica:
nec completur sua concavitas nisi cum cōplemento augmenti
corporis: cuius est. In adultis uero (nisi grauida sit) est nō multo
maior q̄ manu comprehendatur. Crescit tamen propter mēstrua
parietes quasi carnosos / dēlos et grossos habēs: in signante uero
est maxime dilatata et subtilis magis neruea apparēs: et tūc alē-
dit uersus Vmbilicū plus & minus secundū sortis quātitatem.

*Tantum due
cellulas.*

Unica concavitate seu cellula habet: quę tamen aliqua-
liter circa eius fundum in binas partitur: ac si essent duę matricēs
ad unum collum terminatę.

In pte eius dextra ut plurimū alligat mares: i sinistra foemina.

Colligatur cerebro per nervos / cordi per Arterias: hepati et
mamillis per Venas / Recto Intestino per pāniculos / Vesicę per
collū eius: quod est breue nō penetrans extra sicut in mare: an-
chis p eorum: sed a cornibus supra: Receptaculū est undequaq;
solutum: & ideo precipitat ad latera: et interdū suū receptaculū
exit totaliter extra corpus per collum seu ceruicem ipsius.



C Subiſta immediate eſt pars media / noſcē proprie Pectus / ſic di-
cta / quia pectus eſt inter eminētes mamillae partes: & hęc pars eſt a
prima p̄dicta pte infra uſq; prope ſeptūtrā ſuerſum p longiſſā la-
tū uero eſt tāta / quāta eſt latitudo oſſiū pectoris / coſtis exceptis.

Pectus uide-
bitur.

I Inferior uero pars / eſt locus ubi p̄dicta oſſa pectoris terminan-
tur circa regionem ſeptitrā ſuerſā: & quia talia oſſa lateraliter ten-
dunt ſurculū etiā faciētes: ideo hic locus dicitur ſurcula inferior:
in medio culus eſt carthilago ſcutalis: dicta pomū granatū: quia
aſſimilatur parti balauſti. I. floris mali granati.

ſurcula infer-
or.

Pomū gra-
natum.

Coſtamo.

Latus.

Partes uero laterales dicuntur coſtae: & latera: & mamilla /
Partes uero poſteriores: Alię ſunt medię: & alię la- (rū regio.
terales / Medię dicuntur Interſcapiliū & metaphrenon: & noton:
laterales dicuntur ſcapulę / ſpatulę / & ſcapiliū: Aliqui tamen uo-
cant laterales cum mediis / metaphrenon / & noton.

Interſcapiliū.

Metaphrenon.

Noton.

ſcapulae.

ſpatulae.

ſcapilium.

Partes uero magis proprię: Alię etiam ſunt anteriores: alię la-
terales: & alię poſteriores.

Quę ſunt āte / ſunt primo cutis / pinguedo / aliqui muſculi: oſſa
& carthilagines: & p̄niculus pleura.

Partes uero laterales / ſunt cutis / pinguedo / mamillari ſubſtan-
tia / muſculi multi: Coſtę & etiam p̄niculus pleura.

Vltimo ſunt ptes poſteriores. ſcutis / aliqua pinguedo / muſcu-
loſa caro: & nō muſculola ſimplex replens oſſiū uacuitates alięſe
duodecim ſphondyli coſtarū ſiue pectoris: & p̄niculus pleura.

Partes cōtēte / ſunt muſculus diaphragma ſeptūtrā ſuerſum di-
crus qui ſecūdū aliquos eſt iter cōtenta pectoris numerāndus. In
quātū ſua principalis opatio eſt ſeruire cordi / mediāte ſuo motui
per quē pulmonē mouet. Eſt deinde p̄niculus mediſtiniſca /
plula cordis: Cor cū ſua Aorta Arteria: & Pulmo cum ſuis uariſi:
Vena chilis aſcēdens / Nerui deſcēdentes: & aſcēdentes Reuer
ſui dicti / glandula dicta Timi & Morum / Gula. I. cibi ab ore ad
uentriculū uia / cū p̄niculis p̄dicta membra tegentibus.

Subſtantia huius uentris eſt pelliculoſa / pinguis / oſſoſa / carthi-
laginoſa / muſculoloſa: & p̄nicularis:

Oſſa enim eius nō ſunt unita ſicut in capite / ſed diuiſa / ut pe-
ctus ſit obediēs motui anhelitus: & ideo propter motū in eo ſunt
muſculi. Dixit Gal. 7. de utilitate: ſi pectus eſſet factum ex ſolis
muſculis / illi caderēt ſupra Cor & Pulmonem: ut igitur ſp̄atium

fiat aliquod intussum autem & moueatur totum organū: Musculi oñibus alternatim positi sunt.

Hic Venter Pectus dictus / quantitate est insignis quia ferit multis & magnis mēbris: habet tñ maiorē cōcavitatē posterius q̄ ante: Initū cuius uersus posterius est a primis spondylis infra collū atq; ad septentrāsuertum / q̄tū cōtinēt duodecim collig: sed antarius occupat tñ pte p̄tēra iter furculā supiorē & inferiorē idusue.

In homine Pectus est latum / nō carinātū sicut ī maiori parte brutonū: latius tñ est in Mare q̄ in foemina / ad portādos autē scutū uerter inferior est in Foemina maior q̄ in Mare: & p̄ hoc tegio Reatū: Ossis fieri / & Ancharū / in foemina est ualde lata.

Figura / & numerus / & situs pectoris patent / sed eius cōcavitas interior est similis cōcavitati semini Oui oblique per latū icli: cuius pars magis acuta est uersus collum: est etiam similis ungulę Bubalinę / sicut est pulmonis figura.

Colligat cum toto corpore / complexio eius est secundum suas partes: Sua complexio innata actuata p̄ influentem est calida: in uamenta eius sunt custodire cor & pulmonem principaliter. p̄asiones omnium modorum patitur.

De Mamillis

In parte anteriori pectoris uersus latera / sunt duo membra rotūda Mamille a sua figura nomen sumētes ab antiquis Rungē dicta: in medio cuiuslibet corū est unum tuberculū parū quod Papilla dicitur per quę isans papat / circa quas est circulus / qui est rubricerus seu rosatus & interdū nigris / canis / Fos gręce dictus / subsistia quartū / est ex Venis / Arteriis & nervis. Inter quas est uacuitas / quā replet caro glandosa / alba sensu carēns: & propter suā albedinē / quādo morat in eis sanguis albiscait & fit lac: & Mamilla cōuertit sanguinē ad albedinem & facit lac sicut hepat puerit chilū ad rubedinē & facit sanguinē. Vnū quodq; a corde / cōuertit humiditatē in eo cōtentā ad similitudinem suā / in natura & colore: huius sanguinis albificatio: una pars nutrit Mamillas / alia est laciet hęc est superfluitas utilis.

Ad mamillas uenit descendendo a regione ascēssatū circa costas / suę Venę et Arterię / et etiā a regione pectinis uenit Venę per abdomen / quas sensatū superius / istę Venę et Arterię optime apparēt in corpore demacrato / in plingui uero occultę sunt

Mamille.
Venter.
Papilla.

son.

Quis Lac.

sed optime videntur in foetu/trium uel quatuor mensium.

C Numerus Mamillarū & quātitas patet: sunt tñ maiores i foemina q̄ in mare/ propter lac generādū/ sunt litus/ est in pectoris quia est latū/ nō curuātū/ in quo possunt locari cōmode: & etiā quia superfluitas mēbroꝝ supiorū nō trāsir in crines/ nec in denubus/ nec comibus aut i brutis. Colligātur cerebro per nervos cordi per artērias/ hepati & matrici per Venas: à matrice tamen suscipiūt maiore partē sanguinis/ ex quo fit lac/ ideo lactātes nō hūnt mēstrua/ nisi raro & pauca: & nō mēstruatibus tēpore debito/ tumēt Māme/ tument etiā & dolēt Māme/ parū ante tēpus mēstruorū/ quia matrix & Venę secū alligatę sunt plene.

C Iuamēta eaz/ An mare sunt ad decotem: & ad tutelā mēbroꝝ pectoris: & reuerberāt calorē ad cot: & itēdū in mare fit lac propter abundantiam nutrimenti/ maxime i habēte magnas & fortes Mamillas. In femina etiā habēt p̄dicta iuamēta: sed principāliter sūt pro lacte generādo: ut nutrit eo nouiter natus/ usq̄ quo possit deglutire cibū solidū: & lac est proportionatū nutrimentū nouiter nato/ quia fit ex sanguine a quo prius nutrebat in Ventre. Passiones omniū modorū patitur.

C De Musculis Pectoris :

Iis & notatis p̄dictis/ potes excoriarē cutem totius pectoris/ relinquēdo Musculos in loco suo/ & scindere Mamillas ut videas eius substantiā/ maxime carnem/ in qua sunt Venę & Artēię per totum disperse: & videbis Papillas habere plura foramina exigua ualde/ a quibus exit lac/ ad quę foramina secundum aliquos terminātur extremitates Venarū p̄dictarū/ per quę exit lac: & secundum alios/ lac ex ita spongiositatibus carnis Mamillę terminatis ad foramina papillę & non a uenis immediate/ utriq̄ est possibile.

Unde exat
lac.

C His uilis/ notabis in pectore multos Musculos/ qui mouēt pectus/ voluntates quibz etiā pectus naturaliter moueatur. Lad motu cordis & pulsationis/ ut in nostris cōmentariis diximus/ quorū aliqui sunt exteriores/ alii inter costas/ & alii intra pectus.

C Exteriorū/ duo sunt sub furculis superioribus/ cōtinuāt cū costa prima/ qui ad caput spatulę tendūt: & cum illis unitur unū aliud pariculus unūquodq̄ ipar/ est duplans primū paricē/ faciens ipm in duas partes/ pars colus superior cōtinuatur collo/ & ipm mo/

uet inferior uero pectus mouet: & hoc par/cōtinuatur cum uno pari / quod est cōtinuum cum quinta & sexta, costa.

¶ Postea est Aliud par in cōcauo spatulaz cōtinuati cum uno pari ueniēte a sphōdyli usq; ad spatulas: & isti oēs sunt sicut unū par: qui p̄tinuatur cum costis posterioribus.

¶ Postea est aliud par/ortū/a/ sexta sphondylo colli: & a primo & a secundo superiori sphondylo pectoris, p̄tinuatum eisdem costis: & isti Musculi sunt oēs dilatātes pectus.

¶ Postea est unū aliud par/sub radicibus costarum supiorū exten-
sumq; descēdendo unū cū suis extremitatibus uni pati,qd ē cir-
ca furculā inferiōre/p̄tinuati cū musculis lōgis abdominis, super
qd par/sūt duo paria,q ipm cooperit:& isti oēs p̄stringūt pectus

¶ Musculi uero itra costas/sunt dilatantes & p̄stringētes/inter se
differētes in ope: & hi qui sunt inter costas/inter costam & costā
sunt quatuor: scilicet Musculi duo uersus exterius, & duo uersus
interius, quos leuiter sepando cognosces per incessum suorū nil
lorum/primi duo superiores/habent illos transuersales:& dila-
tāt pectus. Secūdi uero inferiores hnt illos latos:& sūt p̄stringētes.

¶ Musculi uero intra pectus/est solus unus. I. Diaphragma seu se-
p̄transuersum/qui cum quiescit/p̄stringit pectus/per accidens
tamē:& cum mouet, dilatat illud/motus tamē diaphragmatis
est compositus ex uolūtario & naturali.

Quot sūt mu-
scoli pectoris.

¶ Numerus quoq; in totū est/centū & quinq; musculi/exceptis
Musculis p̄dictis dorsi & colli. Duo primi sub furculis superiorib;
bus:& duo alii p̄tinuati cum quinta & sexta costa. Postea Muscu-
li duo a p̄cauo spatulaz ueniētes p̄tinuati costis posterioribus / po-
stea duo a sexta sphōdyli colli:& a prima & a secūda pectoris eis-
dem costis p̄tinuati.& isti sunt octo in totū/omnes dilatantes.
Sūt etiā toridē p̄stringētes/excepto diaphragmate/qd ē dilatans.

¶ Ex de p̄stringētib; primo sunt duo sub costis superioribus:&
duo circa furculam inferiorem/supra quos/sunt quatuor alii eos
cooperiētes/qui oēs simul cum diaphragmate/sunt decē & septē.
Postea sunt inter. xxiii. costas.xviii. spata:& pro quolibet spatio
sunt quatuor Musculi/qui sunt in totū inter costas.lxxviii. & si
mul cū.xvii.p̄dictis/faciūt numerū centū & quinq; musculorū.

¶ Sed ut ista omnia bene uideātur/exortidē sunt etiā spatulaz &
dorsū:& primo uidebis Musculos extēiores/secūdo musculos

Inter costas. Diaphragma videbitur inferius loco suo: hæc tamen
latius a me sunt dicta in cōmentariis super Mundinum.

¶ Aduerte lector q̄ motus pectoris sunt quatuor. Expiratio uolē-
lenta: & inuolenta: & inspiratio inuolenta: & etiam uolenta: qui-
bus obediunt Musculi prædicti.

¶ In motu inuolento inspirationis: seruiūt Musculi inter costas di-
latantes pectus: seruiūt etiā ei motus cordis & pulmonis. Dum in
diaphragma mouet: trahit pulmonē: qui ut cūbanti aere teplet:
adiuuante motu cordis dilatat: uo: & pectus dilatat. Istū motū ad-
iuuāt etiā duo primi Musculi: q̄ sūt iuxta furculas superiores: & iste
motus ē mixtus ex uolūtatio & naturali: naturali rē uincente.

¶ Ad uolentiam autem inspirationē concurrūt eī prædictis oēs
alii Musculi pectus dilatantes / simul cum diaphragmate: & iste
motus est etiam compositus ex naturali & uolūtatio / uolūtatio
superante: stante ualitudine cordis.

¶ Ad motum autem inuolentum expirationis: cōcurrūt (leui-
ter tamen) Musculi interiores costarum: & omnes alii Musculi
constringentes: sed principaliter hic motus est naturalis: quia fit
a corde & a pulmone: ad expirationis uero uolentium motum:
hauant: cor & pulmo: sed principaliter iuuant omnes musculi cō-
stringentes pectus: & etiam Musculi Abdominis.

¶ Ex prædictis patet colligantia Musculorū pectoris: & figura:
situs & quātitas & eorum substantia. Numerus est dictus. Com-
plexio sua est calida & humida: iuuamenta dicta sunt. Passiones
omnium modorum patiuntur.

¶ De Ossibus Pectoris.

Ssa pectoris nō sunt unum continuū sicut in capite: sed
o. plura cōtigua: ut possit dilatarī: quę sunt ante & a lateri-
bus: proprie sunt ossa pectoris: sed quę sunt posterius:
sunt magis appropriata dorso: ossa pectoris lateralia: a latinis di-
cuntur costę: dicte gręce ab aliquibus pleura & chondros: Nu-
mero sunt .xxiii. duodecim in quolibet latere: de quibus decem
inferiores ab utroq; latere quinq; gręce Rhoas dicte: aliis sunt
breuiores & secundum aliquos parum ossiosę: sed cartilagineę:
quę a latinis mendosę & incompletę dicte sunt: superiores uero
completę & integre sunt: & uocantur uerę Costę / quę in quoli-
bet latere sunt septem: quibus continuatur utriusq; os pectoris



Costa.
Pleura.
Chondron.
Rhoas.

predictum quod os in medio est durū: & uersus costas cartilagi-
neum. Quia inter os pectoris & costas est cartilago.

Hoc os secundū aliquos, est ex septē ossibus cōpositū, quibus
utrinque uniuntur septē costę uerę: & secundū aliquos alios, est ex
quindecim. Septē in quolibet latere: unū in medio: & secundū
alios est ex. xxi. Sex septē in medio: & utrinque ex septē cartilagi-
nibus, quibus uniuntur costę uerę. Anno m. d. c. lxx. i. anatomia publica:
una costa uera apparuit duplex, ubi ossibus pectoris iungebat.

Sua figura ē lunata. Sua substantia: & q̄ritas & situs patēt. Co-
lligātur duodecim primis sphōdylis infra collū: & ossibus pe-
ctoris predictis: & pāniculis eas tegētibz. Sua cōplexio frigida est
& siccā. Sua tuamēta patēt. Passiōes omniū modorū patiuntur.

Suā Anatomia optime uideres: si in uno indiduo es solis
uacares, nō habendo respectum mēbris spiritualibus.

De Pleura Pāniculo.

Pleura.

Inter mēbra cōtinētia / ponit pāniculus immediate costis
& ossibus pectoris hētens, q̄ dicit Pleura, cuius substan-
tia est nerua, dura & subtilis a qua oriūtur pāniculi mē-
bra in isto uētre immediate tegentes. Sua figura est plana, extēsa
per totū in circūferētis pectoris: & etiā circa diaphragma uersus
suū superius extēditur per totū ipsū firmissime hētens. Sua q̄ritas
ex predictis patet, occupat totam cōcauitatē pectoris: excepta
certa parte anteriori eius, quę occupata est a mediastino.

Numerus, & etiā situs: & colligātio: & sua cōplexio patēt. Ima-
mēta sunt uestite & tueri mēbra pectoris: & ligare sua ossa iuncta
& mediate inter ossa & mēbra pētia i pectore, ne molle leda a du-
ro ualde. Passiōes omniū modorū pati. Isti pāniculū nō uidebis
pfecte, nisi incidēdo costas a piaspectus eo mō quo ista dicet.

De septo trāuerso seu Diaphragmate.

Iis partibus cōtinētibz cōtenta occurrūt: & primo est
uiderendus Musculus pānicularis diaphragma dictus. Se-
cūdo pāniculus Mediastinus. Tercio pāniculus Capfula
& receptaculum cordis dictus. post ista mēbra, uidebitur Cor
& residuum contentorum in pectore.

Dico ergo quod iuxta corpus, inter uētre mēbra, est
certa substantia pānicularis & carne dorsa circa duodecimū sphō-
dylam alligata, quę dorso ante uersus alligat semp̄ extremitati.

bus costarū quēdofarū usquequo terminetur & alligetur extremo furculę inferioris pectoris: & sic diuidit mēbra naturalia a vitalibus: hoc mēbrū nominat Septū transversum: & Parietē & Phrenē: & Diaphragma: quod est musculus & non pāniculus: fungitur tamen officio pāniculi in tuendo Cor & membra superiora a uaporibus calidis eleuatis a mēbris nutritiuent / sua pars carnea est ad extrema eius: & sua corda est in eius centro pulmōi uni-
Septū transversum.
Pariet.
Phren.
Diaphragma.

¶ Hinc uersus superius per totū alligatur Pleura: & eodē modo inferius Sphac est et alligatus / perforatur uersus dorsum / a chīli Vena ascendēte / a qua in ipso / una a dextris / alia a sinistris / tenent duę Venę ipsū nutriendes / perforant etiā ipsū uersus dorsum Aorta Arteria descendens: & Gula seu Meri / quę uersus uē-
 trem inferiorem alligatur Ventrículo immediate.

¶ Sua figura / & quāritas patet / sua substantia / & colligantia / & si-
 tus dicta sunt. Alligatur tamen per paruas Arterias cordis & ce-
 rebro per tria paria neruorū / quorū duo ueniunt a Nucā: & unū a cerebro / & illi appatent interdum notabiles.

¶ Sua cōplexio ē calida & humida. Iuamēta sua sunt pro pte di-
 cta Galē dixit i ipso esse originē respiratiōis & omniū uisū cor-
 poris: & hęc iuamēta ipse inuenit primo. Iuat etiā in expellēdo
 a Vētriculo / & ab intestinis / & a Manice aliq̃ sua pētra: puocat ē
 rīlū / secūdu aliquos mouēdo mētē pter uolūtātē i titillatiōibus.

¶ Passiones omniū modorū paritur: sua solutio est letalis.

¶ De Mediastino.

Ost Anatomia diaphragmatis occurrūt pāniculus me-
 p diastinus: sic dictus / quia diuidit cauum pectoris secūdu
 lōgū p mediū: Gal. uocat ē ipsū ceoptoria descendē-
 tia & Aut. pāniculū mediū: ad quē uicēdu: primo a dextris & si-
 nistris separa ossa pectoris a costis: taliter ne leda cōtenta in pe-
 ctore: sepa etiā diaphragma ante uersus ab ossibus pectoris: & nū-
 debis illū pāniculū / ab imo ad summū: & ab ante retro diuidere
 pectus. Sua substantia ē pānicularis: sua figura / & quāritas patēt:
 situs est dictus: nōmēro sunt duo pāniculi / uersus antērius nota-
 biliter distantes / habētes in se notabilem uacuitatē / sed uersus
 dorsum appatet unus solus: colligat pleure / a quo secūdu aliquos
 oritur: colligatur etiā diaphragmati: & dorso / & pulmōi mē-

ist. diastinus
 Ceoptoria de-
 scendens.
 Pāniculus
 mediū.

diāre pānculo a pleura orro colligat etiā meri teste Aulē & etiā
 ossibus pectoris colligatur ēr cerebro p neruos cordi p arterias
 hepati per Venas. Sua cōplexio est frigida & sicca. sua iuuamēta
 sunt diuidere pectus & pulmonē per mediū. ut si contingat uni
 parti nocuētū. ne ptingat alterius. etiā furcas superiores ab eo
 etiā sit cōseruatio caloris cordis. Passiones omniū modorū patit.

¶ De Capsula Cordis.

His p̄dictis. debes eleuare ossa anteriora pectoris sepa
 u rādo ea a parte āteriori pānculi mediālini. quē dimitte
 in loco suo usq̄quo uidisti Anatomia pulmonis. Eleua
 etiā utrinq̄ costarū similitates. ut loci amplū habeas pro aliis ul
 dentis. & in ista sectione bene considerabis ossa pectoris. & etiam
 pleura. totū tamen diaphragma in loco suo ubi potes p̄mitte alli
 gatū. maxime doctos ut uideātur nerui ad eū ueniētes a superiori
 bus. & ut uideatur gulē siue meri. cum ipso colligantia.

¶ Isth eleuatis. uidebis pulmonē in medio cuius est unus pāncu
 lus mediastino alligat⁹. q̄ ē durus & grossius. ut melius tueat Cor
 ab extrinsecis. figura cuius ē sicut est cōtētū ab eo uiscus. cor no
 minari. qui cōcauus est. & similis marsupio. & dicitur capsula. &
 pericardia i quo ē cor ipsum. & aqua i notabili quāritate. ipsum
 imorans & prohibens ne exsicceat a forti calore. quē si exausta sit
 cardiacus morbus efficit. quo alia ad tabē pducit. aut cōtingit Si
 miꝝ Gal. hęc capsula est ualde sensibilis. & forte cōpletius primo
 genita corde. Substātia. situs. figura. & iuuamēta sua dicta sunt.
 Numero est unus. quāritas parua. colligatur radicibus pānculari
 bus cordis. & pleurē. & mediastino. & diaphragmati. per pellicu
 las suas. hepati per Venas. Cordi per Arterias. Cerebro per ner
 uos. Sua cōplexio innata est frigida & sicca. influens uero calida
 quia cordi proximus. Passiones omniū modorum patitur.

¶ P̄dictā capsulā. & mediastinū. & diaphragma dimitte i loco
 suo usq̄quo uidisti Ana. omiā neruorū descēdētū. qui descēdēdo
 ad uētrē inferiorē. mittūt ramos ad p̄dicta mēbra. ut dicebat infra.

¶ De Corde.

Ost capsulam occurrat Cor. in cuius Anatomia & pul
 p monis. & etiam aliquarum capitis & colli partium pro
 pter ipsorum artificiosam compositionem & operatio
 nem ubertius procedam.

Capsula per
 cordis.

Similis Gal.



Cordis enim dignitas aliis particulis prævalet. Omnium enim mēbroꝝ est principalissimū: & dicitur sol microcosmi. Alia enim membra suo spīritu illuminat. Hæc enim est præcipuus calor: palpitat certe: & quasi animal motum habet. Ideo nascentibus pī-
mum in utero formati ferunt: Deinde cerebrum & hepar: tardissi-
me uero (ut aliquibus placet) oculos: sed hos primo motū: cor
uero ultīmo: solū hoc mēbrum vitæ nō maceratur nec supplicia
vitæ sustinet: sed lesum notabiliter illico mortem affert: & ceteris
corruptis vitæ itas ī co durat: & propter hoc nō decolat animal
in cuius corde replet nocumenrum sicut est in aliis particulis.

*Sol motor
cosmi.*

*Cor primo
formatur.*

*Cor vltimo
mouetur.*

Animalia. n. quibus cor paruum est: audacia sunt: pauca uero
sunt quibus est pergrāde: ut proportiōe Muribus/Lepon/Asino/
Cervis: & oībus timidis: aut propter metum maleficis: magnum
tamen cor multo spīritu pollens: audaciores ceteris reddit.

Hirro corde nasci quodā homines ferunt: & hi sunt alii auda-
tiores fortioresque: ut exēplo est Aristomenes Melanius qui occ.
occidit lacedemonios: & ipse cū uulneratus caputq; tandem per
uulpiū cauernā fugiens euasit: iteq; captus: audax aufugit: terro
laqueis apprehensus: lacedemoni pectus dissecuere cauita uinli-
tatem eius uidendi: hirsutūq; cor eius repertum est teste Plinio.
Cor item est omnibus animalibus septū trāuersum & languinē
habentibus teste Aristoteli. de hist. cap. xv. in aliquibus tamen pre
sua exiguitate certū nequit.

*Corde bēta
aliq.*

Situs cordis in medio pectoris est intra pulmonem: homini rā-
tum cū sua ima parte ad leuam papillam declinat: ne obuier osū
bus pectoris: nō carinatis ut ī brutis: sed in latū cōptellis.

Figuram habet pyramidalem: gibbam tamen: non talem prin-
cipaliter: quia sit calidum ignis sequēs formam: sed quia est mix-
tum perfectū animarū possidet formā operi suo cōperentem.

*Corde for-
ma.*

Sua summa pars qua supiora perit & dorso alligatur lam est: &
hæc pars est nobilior altis partibus cordis: quia medianibus duo-
bus ostiis arteriarū sinistri laretis ab illa parte ueniētibz cōser-
uatur uita animalis: ima uero in acutum se colligit: exitq; pene in
mucronem: & in anteriora est eminens.

Sua pars etiā gibba supiora pectoris spectat: & est talis forme:
ut sua fabricatio supior & inferior sit bona: & non sit in ea supflui-
tas apta impedire suū pīmū motū: & ut in eius cuspide sit agre

gatum ad pfectum unum/ut illud quod leditur tactu ossum fa-
minus partium eius/ut minorem suscipiat lesionem.

C Sua substantia est ex carne simplici ubiq; solida / habet autē su-
mctionis & partē eius sinistra spissioris carnis/ut spiritus ibidē lo-
catū pseruet: & ut sua gravitate expellet pōderostari sanguis
i dextro vētriculo pten/ cuius ptes sūt leuiores sinistri vētriculi.

C In suis cavis sūt ligamēta plurima alba carticulis multis ibidē
existētib; & pelliculis siue ossiolis uenę chilis & arteriole uenę ali

C Cor etiam subtilissimāq; inuoluit mēbrana cum pin- (gata
guedine quadā / quę ipsius substantiam & calorem conseruant
Corroborantq; & exsiccant ipsum prohibent :

C In summo eius ubi dorso hēret/ sunt duę pelliculę rugosę & cōca-
uę dicte auriculares/ q; sūt domicilias seu vētriculis eius/ dextro/ &
sinistro unite/ eius spiritū & sanguinē supfluētē tāq; bonus oco
nomus accipientes & pseruantes/ & postea i necessitatibus reddē-
tes/ in quartū dextra sanguis in sinistra uero spiritus & aer seruat.

C Illas auriculas ordinauit natura/ ut sanguinē ac aerē extrinse-
cus uenientem/ spiritūq; uitalem interdum in corde superfluen-
tes suscipiant/ supplentes uices magnitudinis cordis/ per quam
occupasset aliorum membrorum sibi uicinosū loca.

C Sua etiā magnitudine fuisse graue motui ineptū : & sepe etiā
si esset magnū ualde : propter spiritus & sanguinis penuriā esset
uacuu; & cōsequēter debile/ ut est in timidis animalibus magnū ha-
beribus cor. I. proportionē sanguine & spiritu uacuum.

C Eius radices summo ipsius sunt alligatę/ quę solidę sunt ac durę
& quasi cartilagineę/ ut sup his sit agilis suus cōtinuus motus.

C In corde etiā sunt inuli multiformes & diuersimode locati/ ut
continuos & fortes sustineat motus : qui sunt naturales : & non
uoluntarij : & ideo in eo non est lacertus aliquis :

C In summa pte eius p exteriori / est una uena a chili orta oblique
uersus muctionē unde q; ad minima se ramificās/ q; ipm nutrit.

C Ibidem etiam sunt duę pulsantes uenę/ ortę ab aorta per exte-
rius discurrentes/ una est eodem situ quo est non pulsans pēdi-
cta/ quę ipsum uiuificat/ Alia in sinu dextro spargitur & ei uitru/
tem uitalem affert/ sanguinem etiam ibidem cōtinue intrantem
concoquit et uiuificat/ et illa mediāter per chylum hepā in suo gib-
bo euentatur et uitacitatem propriam conseruat.

auricular.

*Uena aorta
Cor.*

C Sinu triplicem seu causi alias domiciliū uel uētriculū possidet: dexter est sinistro maior: & sinister usq; ad extremitatē suę cuspi- dis peruenit. Dexter autē sub illo modicū finitur loco.

C Inter istos ē partes densius & spissius: a Gal. diaphragma dictus: i quo sunt foramina plura parua: a dextro sinu in sinistrū tendē- tia: latiora a quo: q̄ ad quē ista foramina dilatātur dū abbreviat & apertē Cor: & p̄stringitur dū elōgatur & cōstringit: hinc san- guis subtilatus & p̄paratus a dextro in sinistrum meat / ubi in spiritum uitālē complete mutatur.

Paries i cor/
de dextro sinu
diaphragma.

C Hęc officia: a medicis habetur pro sinu medio: isti sinū teste Ant. Gal. uocat fouē & meatū: & nō uētrē / ut sit receptacu- lum nutrimentū quo nutrit cor: quod nutrimentum est spissum for- tissimē substantiē ipsius: & ē minera spiritus generati in ipso a san- guine subtili: & subdit q̄ tēperatior sanguis est in medio uentris.

C Dexter uero sinus: i eius summo duas habet uenas / una quę cuius tunica simplex ē / est ceteris uenis maior: a iecnore ueniēs chilis: & cōcaua: & audax ascendens dicta. & hęc per grādis est. quia cibus aliis uenis intra cor & extra sanguinē tribuitur eis ni- hil suscipiens: & ideo plus de sanguine in cor ducit q̄ reducat. Est etiā pergrādis: ut pluries multum fluentem & refluentem con- g- neat sanguinem: & ut eum breui spatio cordi afferat: at concoquit possit commodius ab eo.

Chilis.
Concaua.
Audax: asen-
dens.

C Hic sanguis sic coctus tripartit: una pars ex subtili bilioso mi- nor ceteris ad pulmonē nutriendum uadit.

C Altera p̄dicto maior & subtilior per diaphragmatis p̄dicti so- ramina ad sinistrū ubi spiritus: sinum tendit.

C Reliquū uero eius: nō sic subtilis: & quod etiam longe plus cē- teris est: pluries in dextro sinu ingressum & egressum aut integre coquatur & uitalitatem suscipiat: per eādē chiliam ad omnes ani- malis particulas transire: & eas nutrit.



C Autēna tñ ponit quartā partē in uentre medio: quā dicit esse temperatā: sed hęc est oculis meis incognita: forte q̄ in pariete medio cordis p̄netrat sanguis cū nutriendus: sed breui spatio tran- sit in substantiam nutriti: quia ibi nō est sanguis extra uenas iudi- cio meo: nisi in uentre dextro & sinistro.

C Hulus uenę certum officium: cordi terminatur: dum cor di- latat & trahit sanguinē ap̄tur: & dū cōstringitur eū expellēdo



clauditur: sed nō integre: quia pro parte remanet apertum. Ideo semper in eo tanq̃ thesaurū & caloris minerā natura tenet aliq̃ feruentis sanguinis portionem: qui denuo aduenientem sanguinem in sui naturam mutat ei se uniendo.

¶ Et hoc ostiū apertur & clauditur a tribus pelliculis nervis seu ligamētalibus: quarū color est albus ad parietes p̃dicti sinus p̃ ligamēta alba & solida: suis extremitatibus sup̃iorib⁹ alligata.

*Ostiola vena
dextra & sinistra
non vena sūt
solida: sed in
cōpacta carne
duntaxat.*

¶ Istę pelliculę ostiola notata: aperturur ad intra sinum integre cedentes sanguini intranti: & claudūtur ad extra: nō integre tñ. Et istę pelliculę solidę & durę sūt: pariter & pelliculę arteriole: neque in magnis & cōtinuis cordis moribus eis adueniat disrupsio: quia alligatur i suo summo ligamētis eas cōtinuē extēdētib⁹.

¶ Pelliculę vero aorte arterię & venę arterialis: sūt istis min⁹ durę: q̃a p̃ ligamēta aliq̃ nō extēdūt: & id disrupsiois timore carēt.

*Cava dextra
venalis.*

¶ Alia vena ad pulmonē vadit: huius nomē ē vena nō pulsans siue quiesca. Dicit̃ etiā vena arterialis: & dicta ē vena: quia portat sanguinē ad pulmonē nutriēdū: & dicta est Arterialis quia duas possidet tunicas: ut sit fortis & cōpacta: propter sanguinem biliosum & subtilē in ea manātem: & ne rumpatur propter eius cōtinuū motū: in cuius ostio sunt tres pelliculę: siue ostiola: intra sinū & integre claudentes: & extra se apertiores: cū sanguini cedere in dilatactione cordis claudūtur integre: ne sanguis ad pulmonem regurgitet: in cōstrictione vero aperturur: & hēt̃ parietibus venę: nec alibi ut primę per ligamenta sunt unię.

*Ostiola .C.
formia.*

¶ Harū substantia est p̃icularis: Sua figura est simlis uacuitati quę est in littera. C. ideo vocantur ostiola. C. formia. Habent etiā illam formā circularem quam habet unguis humanus: quę pelliculę cum sua parte circulari alligantur corpori venę.

*Aorta est
scripta ad
venam.*

¶ Sinister vero sinus alius nobilior: quia ei primo simulatur dexter & medius: & etiā pp̃ cōtēntū spiritū alius p̃ualer) i eius summo duas habet uenas: unā magnā chili p̃dicta nō multo minotē: q̃ ē uelut stipes ad totū corpus distributa: & hęc est pulsans: & bitunicalis: cuius spissitudo teste Erophilo: ē sexcupla ad uenā: & hęc dicit̃ arteria aorta: & magna: cuius tunica: interior durior est exterior: q̃a obuiat percussioi & substantię spiritus: cuius sēdē custodiā.

¶ Ista ad totū animalis corpus vitalem spiritum ducit: & illud in uita conseruat. Per istam. n. arteriam dicebat Gale. omnia mēbra

pulmone excepto. inspirant & expirant. ne cordi vitalitas suffocetur. nec autē. uelut repositoria cibi sunt / diastolari neq. systolari indigentes: & ideo eorum corpus. est subtile. potosum & lenē. Pulmo autē inspirat & expirat propter motū cordis & pectoris.

Hec Arteria seu Rami sui rati sunt sine chili sibi socias: & Aorta ascendēdo parū supra cor bipartit. una pars obliquatur inferior & descendit. quę in pectore & in imo ventre usq. ad pedes a semultas emittit fibras: & eorū mēbra uiuificat. Sub isto Ramo inferior obliquo. ascēdūt a sinistris nervi uocis. qui dicuntur reuerſini: & hic locus dicitur flexor & ginglyus / de quo alibi dicetur.

Arteria descendens & aliam dicitur

Alia ps ascēdēdo circa pulmōis pte & glādulā timū. sūmū pectoris. brachia. collū & caput. ac eorū ptes uiuificat & spū replet.

Arteria. B. ginglyus.

Ex semp illę Arterię. q̄ sunt alligatę uenis. p multos poros sine fibras paruas inuicem unisunt seu coarctantur: & uena imbibit arteria: & eorū arteria imbibit uenam: & a Vena in arteria trāsfit sanguis. qui ibidē spirituosus ē necessitati bus: & ab arteria in uenā trāsfit spiritus uitalis cōcoquēs sanguinem eius: & ipsū cōseruat in sua uirtute: Tunicę etiā earū nutriuntur & uiuificantur ab earū cōtēto: & hec arteria supra cor ē minor q̄ ista teste Galeni. de uil. c. xi. & facta ē talis q̄ a corde ista sunt plures alia parti. culę q̄ supra ipsum: & tāto ē maior hec arteria descēdens ascēdens rep. dorsū. quāto & multitudo illorū particularū excedit supiores. & in hoc cognoscit nō parua nature iustitia. uena chilis descēdens debet etiā esse maior ascēdente propter eandē causam.



Arteria Ascendens ē maior supra cor q̄ infra.



Arteria. Venosa. C. formula.



In huius pulsantis uenę orificio quod auriculā dicitur: sunt etiā tria ostiola. C. formula. eo tempore & eodē modo seaperientia & claudenda. quo aperitur & clauditur uena arterialis.

Alia est in isto uentriculo uena nō pulsans. sed q̄ta. arteria uenalis dicta: & dicta est arteria. quia portat & reportat spiritū siue aerem ad cor: & a corde ad pulmōē. a quo extra pectus mittit: & dicitur uena. quia simplicem tunicā possidet / in huius orificio sunt tantū duę pelliculę. seu ostiola: eisdē modis alligatę & inco. pletę. ac seaperientes & claudentes in cordis dilata. tione & cōstri. ctione quibus facit ostiola in orificio uenę chilis existētes. Hęc etiā arterialis uena / plus ad cor portat de aere q̄ extra ducat. quia ex sanguine & aere ab ipso introducto / spiritus generatur uitalis. qui per Aortam ad omnes alia particulas transit.

Arteria uenalis.

Et vnde melius intelligas habes hic tres cordis figurae in quibus potes cognoscere Cordis dexteram & Sinistram Internam & externam & cordis venas & alios aliquos partes.

Cordes in hac figura tuas cordis foras mater quibus vides vtrumque dextram in vna quae videtur vena dextera cordis vnta i cordis ostio cu in greditur cor sunt tria ostia la pellicularia albae aliguae subtilitate cordis p certis fibris ut vides & hec ostia non possunt aperiri nec clauderi ut supra potuit. In alia figura habes tria ostia C. foras q cu sit in ventriculo dextro cordis in ostio vnta ne dextram q potius sit greditur pro ratione pulmonis.





Et Clides in
hac figura
partem ven-
triculi finitima
in quo vides
duo ostiola
arteriae vera-
lis / q̄ integre
nō claudunt
ut supra par-
te. e. cūta de-
cta est in fecū
da habes cor-
dēnunt ag-
tus / in quo vi-
des. Arteriolā
dextrā ipsi co-
mūnem / e. vi-
des qualiter
vena chōis
cordi mittit /
vides e. r. /
monē aliquos
notabiles ve-
ne tractatus
eos q̄ per cū-
rās substanti-
as ipsius ingredi-
tur.

Claves in
hac pagina con-
dis figurat in
qua vides i si-
militudo vnam /
culo mas effe-
la Cefcula e
claudunt mor-
gre tempore
debite ostia
Hoc est Zine-
nae / e eodem
aperiuntur in
cordis confu-
mone / vides
etiam Hout
ascendens / e
videt qualiter
ter bifurcat / e
vnde ramus
ipsum defen-
dit / sub cuo
refleciont rer-
tus reversus
finis lacio
super flexur
est q corda su-
per rotare hic
locus appella-
tur Singulor
Claves etiam
in hac figura
Buncula fin-
fram ipse
cordis.

NERVVS
REVERSVS



Ex p̄dictis cordis figura colligātia & cōplexio ac eius iunamē/
ra patent. Sua quātitas est cōspicibilis: Numero est unū: licet iā
sit p̄ceptum cor simīl habere duos capita prodigiose trāsfertur etiā
in paphlagonia lina p̄dicibus corda esse. Et potest accidere
omne genus morbiālios tamen non patitur si diu durant.

De Pulmone.

Iso corde occurrit pulmo / stabbellū / & ventilabrū / latine Pulmo.
dictus / & gr̄ce pneumon. Hic .n. est spirandi artifex / & *stabbellū.*
aeris officina: unde alicui anima sicuti cibus corpus / hic *ventilabrū.*
circa cor / pectoris cōcauū replet quinq; suis p̄enulis / siue lobis / *pneumon.*
quarū duę sunt a sinistris: & tres a dextris magis: ex istis tribus *lobus.*
una est alius minor / dorso h̄tens quasi i medio / q̄ paruas habet si *penulae.*
stulas / sed nullum fere motum: & h̄c est culeitra a scendenti chilia
& iuxta istam penulam uersus superius est etiam certa adnosa
caro: quę est simul cū p̄dicto lobo culeitra seu stragulū p̄edi/
ctę uenę: & h̄c caro est notabilis magnitudinis & ab auctoribus
necatur Morum & Timūet a uulgaribus nominatur Animel/
la et lacticinū: est in cibariis usitatis saporosi gūlus, maxime
illa quę reperitur in Vitulis et hedis lactantibus.

Pulmonis substantia / mixta est ex carne rara / leui / leni et ru/
bea ad albedinem declinans / similis sanguinis coagularē spumę
et ex tribus uasis seu fistulis p̄ oēs eius partes irretitis: eo dē modo
quo in hepate sunt rami uenę chilis & portę h̄c cōpositio / est fa
no mellis et etiā spōgę similis: ideo est sanguinis et aeris capax.
Est .n. pulmo ceu quoddā p̄optuariū aeris ad cor / ambobus mo
nibus / dilatandi uidelicet et cōstricendi famulari aptus.

Sua quidē caro rara estur in eo cōtinue multus sit sanguis et
aer. Multitudinē sanguinis indicāt duo uasa / in ipso / illū cōtinen
tia / q̄ in pulmone sunt maiora q̄ in alio mēbro sibi pari / corde ac
hepate exceptis / in quibus uasa sanguinem continentia / maiora
sunt / nō pp se qd̄esed quia oībus mēbris sp̄m et sang. tribuit.

Hic sanguis in pulmone est multus / qa pp motū cōtinuū re/
soluit ex eo ab h̄dās copia / cui multitudo resistit cōtinueret ē sub
tilis ut cito ad oēs pulmonis penetreret p̄tes ad eū nutriendū. Et
etiā subtilis / ut levis sit / ne grauitate ipediat pulmonis motū.

Multitudinem etiam aeris in ipso semper esse indicat animalis
longa in aqua absq; suffocatione submersio: et longę ac continuę

uocis et flammis emissio/ ab acceptioe noui aeris impediens/ aut cum quis eū abhorret propter foetore uel alias causas. Hic tamē aer in submersiōibus et in foetoribus p̄dictis cōseruatur in ore et in faucibus/ adiuuātibz. Tonsillis cum suis pelliculis.

¶ Huius aeris cōtinue attracti iuuamentum est ut ab eo pelus al terato cor refrigeretur et cōtemperetur in necessitatibus: et etiā ut eueniret cor ne suffocetur/ eius etiā utilitas est ut ex ipso nō modica parte generētur spiritus pro esse et bene esse necessa riet iuuamentum expulsiōis aeris attracti superfluentis calidi et fumosi/ est ad introitū aeris minus calidi/ in pulmone prius et in mēbris per quē meat alterari.

¶ Hic fumosus aer tāq̄ superfluitas spiritus adusta per pulsantem uenam in tracheā ramis pellitur in cordis constrictione: et hinc postea adiuuante pulmonis systolatiuo motu/ per tracheam et per nares et os exit ab animali.

¶ Aer uero ingrediens ad cor alterationis habet initium/ in na ribus/ in ore in faucibus/ in trachea & i Ramis ipsius/ dispersis in pulmone pari ordine quo nutriendus ex cibo & potu habet in ore in gula & uentriculo/ ac hepate.



¶ Pulmonis .n. in aere alteratio cōpatatur hepatis alterationi/ in chilo/ ab hepate. n. ex chilo fit sanguis/ qui integrā in corde cōco ctionem suscipit/ a pulmone uero p̄paratur ex aere spiritus/ qui uere in corde uitalis fit/ hic supiora petens/ in mirabili rete seu in minimis arteriarū ramusculis iuxta cerebrum iterum alteratur/ inde cerebrū intrans uentres integre uere animalis spiritus efflu/ tur/ qui lucidus/ leuis & purus/ est spiritus.

¶ Cato etiā pulmonis leuis est/ ne ipso motū impediatur/ est etiā lenis/ ut eius uasa a ruptura tueatur/ & est robea clara/ ad album declinans/ propter aeris dominatū super illud/ quo nutritur/ & etiā propter eius singilitatem.

¶ Hanc pulmonis substantiam uelat pāniculus/ tatus ex pluri bus mēbranis a suis fistulis/ & a pāniculis pectoris enascentibus quo mediate sentit.

¶ Pulmonis fistulę sunt tres/ una ipsarū/ sicut & alię/ semper mi nuendo/ ad oēs eius partes usq̄ ad inuoluētem pāniculū inclusi ue/ a farynge seu epiglottide p̄ partē anteriore colligulę unita de scendit/ hęc est duratē semper aperta/ ac etiā aliis maiorē/ & est et

pluribus cartilaginibus cōposita/quaꝝ q̄libet una est iuxta aliā
per pāncularia ligamēta unita: & hęc uocatur trachea: & aspera
arteria: & laringa: & brōchiū/ suę cartilagines in pulmone inte/
grę sunt: & etiā ānulares: in collo uero sunt incompletę. C. for/
mes. A sua magnitudine & figura, indicat i carū creatu an ulce/
ra sint in pulmonis partibus extremis, uel medijs, uel in collo.

Trachea.
Alia arteria.
Laringa.
B. d. d. d.

¶ Inter has cartilagine: i tota trachea intra & extra ē pānculus
medię substantię p̄fecte circularis: faucib⁹ & om̄i alligat⁹: i quo sūt
nulli, tracheā elōgātes & abbreviātes, i pulmōis & ipsius tracheę

¶ Huius pānculi iouamētū ē etiā has cartilagine: (morbis
tueni ab extraneorū ingressū: & egressū: est etiā uocis lenitiuus.

¶ Hęc fistula nō sanguinē: ut alię: sed solū aetem ducit, per hanc
etiā solam extranea in pectore contenta expurgātur: Ingressa
ipsam tempore dilatationis pulmonis per pānculū Ratiū ip̄sum
involuentem. Ideo fit ad os, & extra saniet ac alietum extraneo/
rum: non molestato corde expulsiō.

¶ Hęc fistula etiā inter alias situm medium possidet: A dextris
eius est uena quiescens, a sinistris uero uena pulsans. Pulsans tamen
in anteriora extra Cor immediate pulmonis s. bñtiam ingredi/
tur, ne propter eius motum (quia subtilis est) soluat̄ur: Non pul/
sans uero uena, quia bitunicalis est & ualida, nō immediate pul/
monem ingreditur, sed circūdans prius tracheam in posteriora
tendens pulmonem etiā intrat.

¶ In hoc solo uiscere non sine causa pulsans uena cum non pul/
sante substantiā & cōtentū cōmutauit. Nō pulsans. n. uena arteria/
lis dicta: in alijs mēbris simplex: i pulmone bitunicalis est. p̄timo
ne r̄patur: p̄p eius cōtinuū motum. sc̄c̄do ut etiā sanguinem
subtilem cōtineat, pulmonis carnem & etiā tracheā dbantem.

¶ Pulsans uero uena arteria uenalis dicta simplex est tunice: in
motu agilis: ut breui spacio dilatationi & cōstrictioni seruat. hęc
aerē ad cor ducit & educit, in illa ē etiā spirituosus sanguis: ut ali/
quibus placet. etiā pulmōē nutriēs. magis tñ cū uitalitā: sui ra/
mi unūcūq; seu cōstomāt̄ur cū ramis tracheę: p̄ quos pulmo cor
di aerē dat/ cor uero nō ingratiū uitā ei & nutritionē donat.

¶ Huius uenę rami adeo angustī sunt: ut per eos nō penetter ad
tracheā sanguis: Et ideo acri sunt perulī. & sanguini inulī: qui si
notabiliter apertūtur, ab eis ad tracheam fluit sanguis: & fortetur

aliquibus placet / a ramis nō pulsantibus uenę etiam in tracheā flux sanguis / quo fit sanguinis spiritum / absq; pectoris uenarum solutione: Vena tamen pulsans ad hoc magis apta est .

¶ Vnūquodq; p̄dictorū uasorū / in primo pulmonis ingressu in quinq; diuiditur ramos per omnes eius partes semper minuēdos & ramos multiplicādo duo sunt i sinistris & tres a dextris / quorū minor cxtens / ad paruū lobum / in dextro magis dorso h̄erētē madit / qui ut supra diximus / straguli est ascendēti chili .

¶ Pulmōis figura ē bubalinę ungui similis: Numero aliq; putant q; sint duo membra i unum unita: taliter q; apparet unus pulmo cum quinq; lobis: similes i duas diuisus partessur lesa una: altera firma maneat: posteriori longior est q̄ ante / septi trāuersi sequē situm: Numero est unus / ipsius quātitas / situs: & colligantia patet: Sua complexio ē calida / ex parte sui contenti & loci: accidē taliter tamen p̄pter flegmata in eo existentia potit frigida: sua inuamenta sunt preparatorie & latorie seruire cordi: seruit etiam anhelitui & uoci / pariter & loquelę: & suus paruus lobus famula / tur ascendenti chili. Passiones omnium modorum patitur.

¶ De Anatomia aliquarū partū colli & uenarū pullā ntis & quietatis ab hepate et a corde ascendētis usq; ad caput & manus inclusiue.

¶ Iis p̄dictis in partiali sectione primo occurreret trachea & epiglottis & etiā gula. Hęc tamē de p̄senti nō possunt bene uideri nisi p̄ponat aliquarū colli et faciei partium anatomia: quibus uisus de p̄dictis fiet sermo. Expedito igit pulmoni ipsius aliquā supremā partē carneam pro uidēdo troncho trachę attēq; reliquū deponendo serua / excepto quinto ipsius lobo / qui dorso h̄eret. Serua etiā cetrā glādulā sibi propinquam q̄ mox et tim q̄ uocat: ut super his uideatur situs chilis et arterię ascendētis: q̄bus hęc duo mēbra sunt straguli. Cor etiā et ipsius capsulā / ac p̄niculū mediastini: et uentriculū simul ac septū trāuersum seruabis in locis suis p̄pter alia de eis inuestiganda .

¶ Illis seruatis melioris ordinis grada primo de collo sermonem aggredior: et dico collam esse mēbrū organici nobile et ualde necessariū homini p̄ mēbra in eo ptēta / quod teste Aulio . 3. de

Colla quid ē
p̄pter quā.

partibus cap. 3. est factū pp tracheā pulmōni seruiētē & pp gulā.
¶ Sed Gal. de iunam cap. 1. tenet q̄ est principaliter pp pulmo-
 nē: quoniam carēna collo catent pulmōnē ut p̄sces: si bdit tamen
 q̄ collū est ita illoꝝ mēbroꝝ q̄ descēdunt ex sup̄iori ad inferius:
 & illoꝝ quē ascendunt ex inferiori ad sup̄ioremq̄ descēdūt sunt
 nerui: gula: aliqui muscoli & nuca: Ascēdētia uero sunt uenę pul-
 santes et quierę: & nuca cōtinetur a sphondylis: ut sit ruita a no-
 cumētis ex trāsectis: & illud uacūū quod est inter partes uenarū &
 arteriarū implet p̄ glandulas ibidē exsistētes: & oīa ista custodiuntur
 a cooptoris et ligamētis: cōinde oīa reguntur eorū: & illud quod
 cōponitur ex oībus istis est collū: quod ē positiū propter cānam
 pulmōnis: per quā fit rox & anhelitus: collū etiā ī aliquibus ani-
 malibus est loco manus: quia capiunt cibum ex terra adiūuāte
 collo propter longitudinē suā: p̄dū. Huiusmodi uero collum
 principaliter nō est nisi propter cānam pulmōnis: & ipso mediū-
 te ad brachia & ad palmas & ad diaphragma & ad alia membra
 duce nuca tendunt nerui: & ideo propter originem neruorū fue-
 rūt positi sphondyli inter pectus & caput: ex quibz cōponit collū:
 hęc Gal. quā tamen nō dicit an trachea ascēdat uel descēdat: &
 quāuis dicat gulā descēdere forte quod etiā ip̄sa ascēdit: nec suus
 descēsus pōt probari magis quā ascēsus: neq̄ trachea: quia mani-
 festū nō habēt ortū: sicut uenę: & arterię: sicut nerui.

¶ Dicamus igitur collū de p̄senti summi pro illa parte / super
 qua sublinetur & uertitur caput: q̄ seruit uētri sup̄mo: medio: &
 etiā inferiori mediātibus neruis a cerebro & a nuca descēdenti-
 bus: cutis sicut a nec a sunt uis sup̄ioribus pectoris: & / ostēdit
 a sup̄mo sphondyli costarū: & a lateribus ab humeris: p̄ta usq̄
 ad os capitis: basilare dictum: & cōmuniter pars ipsius posterior
 ceruix dicitur: de qua alibi fiet sermo. Anterior uero uocatur col-
 lum: & ab aliquibus Guttur: & quia hoc mēbrū est principaliter
 propter tracheā: ip̄sa erit nobilior harū partū: propter cuius no-
 bilitatē anatomia colli est sectū ponēda: & quia trachea ē pars pul-
 monisq̄ est de principallioribus partibus uētris mediī antedicti:
 ideo anatomia colli de p̄senti uenit cū anatomia uētris mediī.

¶ Hęc pars trachea notata a multis dicit Guttur: & faryngal: licet
 faryngē: scēdū aliquos sint uenę quę irumescit in magnis uoci-
 bus: & istę uenę a Cello granges & fragitides dicuntur: & ab aliqui



Trachea.
 Guttur.
 Faryngal.
 Granges.
 Fragitides.

Stragides.
Sales.
Apoplex.
Somni.
Peritice.
Spiritu.
Juveniles.
Jugulares.
Dignitas.
Suspende.
Carotides.

Jugulum.
Bata.
Clavis.
Clidas.
Clida.



bas stragides esset ille uenę apud arabes uocatur guidez: et apoplexie: et somniet ab aliquibus pēiles: et speimadog: et iuueniles: et jugulares: et organologie a Gal. in libris de utilitate panis uocatur iagotides: q̃a sunt iusta uia cibiter: ab aliquibus carotides siue somni. Celsus tñ solas arterias ibidē existētes uocat carotidas a caros dicit: q̃ ē somnus: q̃a ut plurimū secūdi aliquos i ramis illarū arteriarū sit oppilatio cauans somnū et etiā apoplexiā.

¶ Er illarū uenarū / utring est una imediate sub cute. quę cōmuniter dicitur guidez manifestas utring etiā infra aliquos musculos notabiles collit: est una uena quę dicitur guidez occulta et profundas: quę arterię carotidę est socia.

¶ Istis arteriis et uenis profundis utring associatur unus neruus notabilis magnitudinis: qui dicitur descēdens / a quibus utring oriūtur reuersus: de quibus omnibus parum infra fiet sermo.

¶ Pars etiā anterior colli ab aliquibus dicitur iugulū: et ab aliquibus gula: licet male: quia gula est uia cibiter et potus: et iugulū est ea pars: quę est imediate supra furculas superiores pectoris: Alii tñ uocāt furculas p̃dictas iugulū: et clauē: et clidas: et clidiu harū furcularum extremitas uersus spatulas dicitur Epomis: altera uero pars uersus medium pectoris uocatur patassagis.

¶ Notatis p̃dictis: occurreret post cutem anatomia musculorū mouentū colli & caput: sed nō possumus ipsos habere inuestigationē integrā: nisi destruas illos: neruorū uenarū ac p̃dictarū arteriarū anatomia. Ideo super his ponā silentiū: remittēdo legētes ad Gal. ad Auic. & ad alios auctores. Hinc musculi sūt multo numero & diuersimode locati: & ideo essent cum diligētia uideri: sed inuestigationē quo: a ipsis solis esset uacandū: quia cū distulcitate anatomizārum & pp hoc Gal. x. de uis. part. c. viii. ubi loquit de istis musculis: dicebat. P̃ter exercitū cōgruit diligētē eū: qui studet centridinaliter assequi ea quę hic dicuntur. Dicit et ibidē: q̃ solus sermo nō sufficit i anatomia: sed requirit tactus & uisus. Er ideo ad p̃dictos auctores sit refugiu: quia soli collo & capiti esset uacandū: in quibus sunt musculi multi: tam circa sphondylos quā alibi: qui in cōmuni anatomia uideri nō possunt.

¶ Capiti. n. mediante collo cū suis ossibus & musculis sunt multo motus: quorū aliqui teste Auic. primi primi sunt proprii capiti: & aliqui cōes i p̃ti & quinq; sphondylis colli: per quos est motus

cōpositus ex declinatione capitis & colli simul / & isti motus aut curuāt antērius-aut pōstērius-aut a dextris, aut a sinistris : & iter ip̄os est motus cōuersionis seu circūductionis : & isti musculi sunt multi / quoniam multiformis est eorum positio : & magni quia magnos & sere continuos habent motus : & ideo Gal. ubi supra dicebat ip̄os undiq; circūdate caput- quod mouent ad quācūq; partem uolueris illud declinare : De numero ip̄orum est discor- dia inter Auic. & aliquos sibi socios contrariantes.

¶ Relicta igitur ip̄otū pat̄ia li inuestigatione- eutem a lateribus colli scinde- & nudando laterales & anteriores musculōs, supra quos imediātē sub cute notabis penā guidez manifestā : quā ser uasti illeſam- ſeca deinde illos musculōs magnos ab auribus de- ſcendentes oblique uſq; ad ſurculas superiores uerſus mediū pe- ctoris- ſub quibus utrinq; eſt una glādula intēdū maior uni q̄ al- teri ad formā quaſi amigdalę quę eſt replens loca uacua ibidem inter uenas & artarias iuxta inferiorē partem epi-glottidis exiſtē- tia. Et ideo equantur paritē colli dicitur- quas etiā humectat in ne- ceſſitatibus. Notabis etiā ſub iſtis glādulis utrinq; unam uenam guidez notabilē : & pariter unā artariā ſibi ſociā- quę dicitur oc- cultę & apoplecticę- quarū noīa multa ſuperius dicta ſunt.

¶ Iuxta prædictas artarias & uenas notabis etiā utrinq; unū ner- uū- pluribus uillis cōpoſitū : hi nerui uocant̄ deſcēdētes : & ab his oriūtur nerui reuerſiui- de quibus infra fiet inueſtigatio pulchra.

Nervi deſcen- dentes.

¶ Iſtos ueroſ- & ramos artarię prædictę & utraq; uenā : occultā ſc. & manifeſtam / ſetua uſq; quo uidisti uenas & artarias a corde & ab hepate aſcēdentes uſq; ad iſtū locū- ad quas uidendas op̄ator circa regionē gibbi hepatis iterum reuertatur : & ibidem notabit magnum truncum uenę cholis aſcendentis- quę in ſuo aſcēſu pri- mo perforat ſeptū tranſuerſum : & ibidem utrinq; plures emittit ſenulas- quarū duę ſeptū tranſuerſum cibant- alię uero- coſtas in- feriores : & membra ſibi uicina nutriunt.

De uenis & artarijs aſcen- dentibus.

¶ Eius uero pergrandis ramus aſcendens uſq; ad cor unde quaq; ſolutus- ſine artaria ſibi ſocia tendit : & per iſtum rami hepatis gibba pars euentatur : & ſorte uiolſcitur.

¶ Hic ramus tripartit̄- unus quorū alius ſatis minor / circa cordis radices ingredit̄- & p̄ ſubſtantiā ip̄ius diſſeminat̄ : & ip̄um nutrit.

Utraq; ueniſſa I. ca.

Chilio vena
Cot.

C Alter alius maior domicilio cordis dextro unitur & ei copiosius sine sanguinem affert.

Clen. Zim/
natia.

C Ab isto ramo secundum aliquos illa uena quae pulmonem nutrit dicta arterialis trahit ortum: de his tamen uenis aliqua dicitur in cordis sectione.

Ab omni.
Linnam.

C Tertius ramus ex praedictis qui etiam insignis est: a cordis regione etiam supra ascendit / sub quo est cetera caro glândosa dicta mori & timidi: haec simul est quinto pulmonis lobo: qui dorso haeret ut supra diximus est culcitra praedicto ramo ascendenti usque ad lapinam pectoris furculam / ubi in duos haec uena pariter ramosa dextris & a sinistris transierit uersus spatulas tendentes. Iste etiam modo magna arteria dicta Aorta ascendens / tendit transversaliter uersus spatulas: & ut melius uideas istas uenas & arterias deponere furculas superiores: Cautè tamen ne membra sibi uicina soluas.

C Istis expeditis praedictas uenas & arterias uidete debemus: notando primo: quod haec quilibet in duos potest ramos / unus quorum tamen uenae qui arteriae utriusque per collum uersus caput ascendit / a quibus oriuntur omnes uenae colli quidam dicitur: quas sensibiles postea melius uidentur.

C Alter Ramus etiam utriusque in quinque diuiditur partes / unus eorum nutrit superiores costas: & unus spatulae locum: & unus musculis sub metris colli: & unus penetrat in sphondylis colli superioribus: & inde ad caput transit: istos praecomita tunc rami pullantis uenae.

C Alter ramus oibis praedictis quinque minor ad aescellam redit: & hic in quatuor pariter ramos: eorum unus in musculis supra pectus locatus qui spatulas mouent spargit / & unus ingreditur in carne laxa: & in ceteris paniculis aescellae: & unus transit a summo pectoris circa mamillas descendendo uersus abdomen: & hic secundum aliquos nutrit ipsas: & pro parte porrigit materiam lactis: & hic in abdomine copulatur (ut a nobis diximus) cum uena descendente ab inguinibus & a matrice ad mamillas & de isto ramo Gal. xiii. de uul. c. viii. loquitur: dicens quod a thorace redit uenae ad hypochondria & ad totum epigastrium & copulatur uenis quae ab intestinis sentitur ad matricem colligantur habentes ut quae in matricibus augeat alia: illi irrigent nutrimentum quo nato rursus mamillas perficiunt / qua propter non pingit menstrua fieri bene & lactare simul.

C Alter uero ramus praedictis maior in tres utriusque pariter ramos / unus tendit ad musculos qui sunt in spatulis: & unus ad musculos



ascellarū: alter uero p̄dictis maior tēdit p̄ partē domesticā uersus
a diatorū: hinc ad paruā manu uadit/ hic ramus uocat̄ ascella-
ris/ & basilica/ q̄ phlebotomatus ī pectoris morbis cōfert pp̄ sua
colligantiā propinq̄ ad ueras costas & ad totū pectus/ hęc etiā ue-
na dicta a uulgarib⁹ uena hepatis/ q̄a ē ipsi p̄pingot q̄ cephalica.

¶ Ex primis uero ramis quos dixi te seruare/ a quibus sūt guidez
utrinq; unus ascēdit: & anteq̄ multū ascēdāt/ in duas utrinq; di-
uidūtur p̄tes una eaq; uocat̄ guidez manifesta: q̄a est p̄tope eu-
rim uideri apta de facili/ q̄ ī utro itumescit ī forti uoce/ altera ue-
ro q̄a ē ilia aliquos mūsculos/ uocat̄ guidez p̄funda & submersa.

¶ Et guidez quidem manifesta illico etiā supra furculā ascēdit:
utrinq; diuidit̄ in duas partes/ quare una ascēdit/ alia uero circa
furculā inuoluūt/ a qua plurimi rami enascuntur/ p̄tes sibi uicinas
nutrientes/ & illosq; ramoq; aliqui iterū ascēdūt: cū p̄dicto p̄ti-
mo ramo guidez manifeste iterū unīrūt/ sed anteq̄ unīf. amus
ramus notabilis ab spatulā tendit: & per extērius sub cute adiuto
ili/ usq; ad paruā manu terminat̄: & hęc spatularis/ humeralis: &
cephalica uocatur/ quia a capite ducit propter colligantiā proxi-
mam/ quam habet cū sua guidez/ quę caput nutrit/ de illa tamē
uena cephalica: & etiā de basilica: & de arteria sibi sociā dicitur
lātus in anatomia particulari magnę & parue manus.

¶ Et guidez manifesta p̄dicta utrinq; notabilis est immediate sub
cute/ supra mūsculos colli/ q̄ cū suis ramis nutrit mādibulū supio-
rē: & ieriotē: & liguā/ & caput p̄ extērius circa aures ascēdēdo.

¶ Et aliqui uolūt q̄ illi rami guidez manifestę q̄ sunt circa aures
nominentur uenę spermaticę/ quia dicūt ab ipsis uenire sperma
a cerebro/ & illi sunt moti a dictis Hipp. ī libello de aere & aqua:
qui dicebat/ quibuscūq; uenę post auriculas scīdūt/ ipsi uera pror-
sus ab omni generatiōe orbātur/ sunt tamen aliqui/ qui putāt ta-
les uenas ēē ex ramis guidez p̄fundę/ q̄ nutriūt mūsculos inter
primū & secundū sphondylū colli existentes/ & aliqui/ qui dicūt
Hipp. intelligere p̄ uenas/ ipsas arterias/ quia sunt magis aptę ad
bonū sp̄ma q̄ uenę/ ibidē tñ Hipp. dicit sp̄ma etiā uenire a toto: &
Auc. xx. aenū cap. iii. dicit quod Gal. uelcūlt an incisiō harū ue-
narū faciat īcurrere sterilitatē an nō: dicit tñ in ali uero uideretur q̄
nō oportet ut sit sp̄ma ex cerebro solo/ quāuis eius somētū sit
ex cerebro/ p̄ bonā tñ anatomiā ualōq; spermaticę/ dicit q̄ harū

Tridaria.
Basilica.
Uena hepatis.

Guidez ma-
nifesta & oca-
li.

Spatularis.
Humeralis.

Cephalica.

Instrumenta
guidez mani-
festę.

Nota de re-
nō spermaticę
ab Hippo.

omni generatiōe
orbātur.



uenarū post aures incisio nō facit stiles pp spma per ipsas deſcē
dens poſſunt tñ iſte uenę iſte debilitate cerebrū taliter q̄ debne
nō trāſmittat ſpīritū animalē pro cōceptione: & hoc magis p̄ſ
ſunt facere guidez profundę q̄ maniſeſtę: & Arterię magis hoc
poſſunt q̄ uenę/qa ſunt ſpīritus aſſerētes: nō q̄ tñ eſt poſſibile.

*Immenſa
vīdez pro
fundat.*

¶ Guidez uero profunda utrinq; iuxta menti ſine gulā aſcēdit
infra muſculos p̄dictos, quos locaſti: & in ſuo alcēlu emittit ta
mos Gulam & muſculos ſaryngę nutrētes. Nutrit etia muſcu
los exiſtētes inter primū & ſecūdum ſphōdylū colla qbus oriū
tur ſecundū aliquos uenę ſp̄maticę ab Hippocritate: q̄ ſunt poſt
aures/de qbus adhuc ſub iudice līs eſt. Nutrit etia p̄ctaneū
ipm aſcēdēdo ab imo uſq; ad ſummū capitis: & ibi p̄forādo cra
neū/ deſcēdūt i durā & p̄tā matē. eis porādo aliqđ nutrimentū.

¶ Ex p̄dicta etia uena profunda oriſ ramus unus utrinq; os baſi
lare p̄forans in directo cōmiſſurę lambdę: & ſubſtentatus a dura
matte aſcēdit uſq; ad capitis ſummū: & ab iſto ibidē muli exeunt
rami per poros cranei: qui etia nutrit p̄ctaneū/ ex p̄dictis tamē
ramis aſcēdenſibus intra craneū cum dura matte maior pars nā
ſit in p̄tā matē: Cū quibus etia trāſeſt aliqui rami guidez mani
feſtę p̄dictę a ſumitate capitis ab extra ad intra craneū peneuan
tes: & ab hinc trāſeunt in ſubſtantia cerebrī & ipſam nutriunt.

¶ Ex p̄dictis etiam ramis aliqui in directo cōmiſſurę ſagittalis &
lambdę ſgrediuntur durā matē ibidē duplicatā: hūc locus ē tāq
torculat/a quo ex p̄dictis uenis exprimit ſanguis in certū locum
amplū ibi prope uerſus exteriū exiſtētē: qui platea: ſonea: palmē
tum & lacuna dicit/ circa quā platea: ſunt certę uenę ſanguinem
in ipſam expreſſum ſugentes: q̄ cerebrī centrū ex eodē nutritū
& iſte uenę oēs intra craneū ſimul cum arteriis ſunt illę ex quibus
fit rete dictum ſecūdum aliqđ aliter uocatur p̄tā mater.

*Torculat.
Platea.
ſonea.
Palmēty.
Lacuna.*

¶ Arterię uero p̄dictę carōdes nūcupatę in collo exiſtētes pro
pe uenas guidez p̄fundas & neruos deſcēdētes: utrinq; a lateri
bus colli aſcēdendo: cō aliqbus ramis ante & etia retro diſperſę
tendūt: & ad linguā: & ad mādibulas ſupiores & iſeriores: et in
tota ſecieret in occipitio: et aliqę notabiles circa aures in ſēpon
bus: cū ſuis ramis ad cacumen capitis tēdūt: et aliqę etia ad mu
ſculos tendētes circa iuncturā cōmunē collo et capiti diſſeminan
tur: ubi eſt magnū foramen/a quo exit ſp̄nalis medulla/ ab illis

*Arterię uero
nō e ſuis
aſcēſus.*

forte ramis Hipp. dicebat sp̄ma descēdere a cerebro/ q̄a antiqui
uocabāt etiam arterias uenasset ideo dicebat Aunc. et terribilias
uenas cōtinuari nuchę ut nō elōgētur a cerebro in q̄bus est san/
guis leuis lacteus/ q̄ primo uadit ad renes/ deinde postea ad uenas
ad testiculos tendētes/ et harū arteriarum unus notabilis ramus
utrinq̄ p̄forat os basilare uersus anterius/ et unitur q̄q̄ matri ul/
ralirando cerebrum/ et portando spiritum ad uentriculos ipsius.



¶ Ex isto ramo utrinq̄ ascēdo immediate supra hoc os basilare
secūdū medicinę cardines sit rete mirabile/ quod est secūdū ipsos
notabilis magnitudinis. Quod est ante/ retro/ et a lateribus.

De Rete mi/
rabili.

¶ Et p̄dictę uenę Cerebrū nutrientes in suo ascēsu debent su/
sistēti ab aliquo corpore solido/ sicut est p̄craneū/ et dura ma/
ter/ quia per se nō possent ascēdere/ pp̄ ipsas simplici et mollem
tunicā et sanguis in eis est magis aptus descēdere q̄ ascēdere/ q̄a
grauis est. Arterię uero nō appodiant alicui corpori solido/ sed p̄
sestātes ascēdūt ad intra craneū/ q̄a bitunicales sunt et durę.

¶ Et nō fuit necesse eas ascēdere/ et postea uertere sua capita se/
rius sicut uenę/ q̄a suus sanguis leuis est/ et ascēsu aptus magis q̄

¶ Istę tñ uenę et etiā arterię aliquas ramos me/
sius uidebis in Anatomia mēbrorum subsequētiū.

¶ Venarū substantia & arteriarū alibi dicta est. Sua cōplexio ex
earū cōpositione iudicatur/ figura sua ē nota/ colligātur toti cor/
poris/ sua magnitudo ē etiā nota/ sunt maiores i uno corpore q̄ in
alio. Situs tñ multę earū sēpe uariā/ et ideo ut alibi diximus au/
thores de ipsis uidēt discordes/ Numero sūt i p̄ceptibiles/ q̄a mul/
tę earū occultę sunt/ Sui iuuamēta sunt cibare oīa mēbra. passiōes
ēt omniū modorū patiūt. Sēpe tñ ipsis accidit coartatio oppila/
tio a plectoria rectius plethora sang. cāra/ q̄ si fiat i ramis uenarū
guidet/ sēp̄ seq̄ somni p̄fūditas/ apoplexia/ et suffocatio exte/
ra.



¶ Ista uena guidet iterdū phlebotomā/ Raro tñ i regio/ (ma/
ne et etate nostra/ sua incisio cōfert septe nō cōfirmat/ et in fort/
squintia/ in acuto asmate/ in cōstrictiōe anhelitus/ in rauedine
uocis ex supabūditi sang. i pulmonis a possemate euacuatōis/ et
diuersiōis gratia pro antecēdēte cā in p̄cipio et augumētō/ hęc
tñ incisio uenę guidet/ est siēda a docta manu/ cū phlebotomo
habēte aliq̄ obstaculū p̄pe cuspidē/ ne p̄fundēs oīa latera uenę
q̄a hęc uenę sūt labētes i tactu earū/ q̄a nō sunt i uenę carū sicut

In iuuamēto
phlebotomę
Guidet.

*phlebotomia
phlebotomia
phlebotomia*

alię multatū ēt pp glāndulas molles & lubricas sub eis existentes
tū ēt ne phlebotomus p̄gat neruū uel alia mēbra ibidē locata:
¶ Modus autē phlebotomiādi has uenas talis est. / patientis primo
stringat uēter inferior iter ilia & hypochondria cū zona decēter
stringēt teneat etiā os suū clausum in expellēdo aerē a pectore
deinde patientē declinet caput ad partē cōtrariā ptis phlebotomiā
de quia sic faciēdo sumēscit uenarū corda extēsus cū iūmē
to apto tenēdo uenā sumā cū manu ei alio ingenio debet p̄o
rari uena in loco emittēdionis: Audientes laudāt sectionē talē fieri
debere secūdū latitū ego tū facerē secūdū obliquū & quia san
guinis non sit supflua neq; fiat secūdatior: Et opator habeat secū
puluere sanguinis cōsistētiuos / sicut bestū armentū sanguinē dra
conis pilos leporis / mumiā / alias passasphalchos: nō carnē huma
nā sicut qua utūtur moderni / cortices thuris / aloes & similia
& intet omnia habeat uitreolū seu collocat / sulgo etiam laudat
tur & sabę cōbustę & charta / et coria cōbusta & his similia / super
posito semper oui albumine bene cōtuso / & sup oīa decēti liga
tura: & patiente iacente capite eleuato / per octo dies cum leui
somno & decēti diēta / pro ut uidebit Medico legimus.



¶ De Anatomia Neruorū descendētū & reuertuorū.

Xpedita anatomia uenarū ascendētū ab hepate supra

e In qua etiā multa dicta sunt de arteriis ascendētibz ad
neruos descendētes a quibus oriūtur reuertui redeo: &
dico / q; in partibus lateralibus colli parū sub auribus / inter seu
sub aliquibus musculis sunt uenę & arterię notabiles: ut supra pa
tuit / quibus utting h̄eret unus notabilis neruus descendens uo
catus. Hos neruos antiqui uocabāt apoplecticos & male / q; nō
cognoscebāt ip̄os opatioues uelle Gal. in libro de uoce & anhe
lito: & hi nerui a sexto pari neruorū cerebri principaliter & etiam
a tertio oriūtur: & descendunt p̄pēdicularitē / quia taliter de
bent mouere membra.

*Nerui apople
ctici sunt male.*

*Nerui dēscen
dentes.*

*Nerui dēscen
dentes.*

¶ Hi nerui sunt cōpositi ex multis ramis / quorū aliqui teste Gal.
descēdendo dissēminantur ad cot / ad eius capsulā / ad mediastinū
& etiā ad pectus in radicibus costarū: & quidā satis notabiles ad
os uētriculi: & ad diaphragma. & aliqui minores ad hepatē / ad sple
nē / ad tenes: & ad alia mēbra sensibilia uentriū inferiorū / ad quę
etiā uadunt aliqui nerui oblique descēdētes a iugula & ab illis

neruis descendētib; aliqui notabiles rami superius iterū refle-
ctūtur/ qui Reuersiui & Retro redeātes uocātur/ qui cōiter dīr
nerui uocist & tendunt uerſus epiglottim se alligādo certis mu-
sculis ipsius/ quorū capita sunt ad inferiora corporis sita.

Nerui reuerſi
u sunt uocati.

De p̄dictis etiā neruis descēdentibus: exceptis illis reuerſiuis:
aliqui rami descendēdo uadūt etiā ad aliquos epiglottis muscu-
los/ quoꝝ capita sunt uerſus ſupius uerſa: & reuerſiui ut aliquibus
placet cū suis musculis claudūt cartilaginē cymbalarē & Glotti
dīſſed musculi neruorū descendētis mouēt alias cartilagineſ
& etiā cymbalarē aptunt. A septimo etiā pari & a noca ueniunt
nerui ad musculos epiglottis: teſte Gal. qui oblique eā mouent.

Cymbalaris.
Glottida.

Si septimo
pari reuerſi
nerui ad epi-
glottim.

Iſti nerui sunt duo/ unus dexter/ al ter ſiniſter/ sunt tamē i plu-
res tiſſos seu ramos diuiſiunt pater pp mēbra multa/ ad q̄ uadūt.
Sua quātitas & color pater/ ſua complexio & ſubſtātia eſt qualis
alioꝝ neruoꝝ. Reuerſiui tamē sunt ſicciores & durioreſ/ q̄a hñt
ſuſſerre notabiles & quaſi cōtinuos motus/ maxime qñ claudūt
epiglottim/ ad quā clauſurā requirīt ſortior motus q̄ ad aptionē
eius/ quia plures sunt musculi aptētes q̄ claudētes iplam: motus
etiā cordis/ pulmōis & pectoris aperit iplam: & ideo ut tales ner-
ui ſint ſortes/ natura elōgauit eos a cerebro humido/ a quo quā-
to plus diſtāt/ tāto ſunt ſtiores: & tranſeūt prope cor circa arte-
riā/ ubi forte pp ipſius calorē acquirūt ſiccitatē & durtiē: & ſunt
teſtē: xi ad ſupius/ ut trahendo inferiora claudāt epyglottim/ q̄ qñ
relaxātur a diuāribus aliis multis musculis aperit epyglottis.



Sicut ipſoꝝ eſt a lateribus colli descēdēdo ad p̄dicta mēbra:
Sed nerui qui uocātur Reuerſiui/ in parte ſiniſtra ſcīpſūt reuerſi
ad ſuperius/ cū obuiant magnę arterię Aortę in loco parū ſupra
cor/ ubi primo talis Arteria biſurcaſ: & incipit refleat per pectus
ad mēbra inferiora/ circa quē magnū ramū descendētē ſit mo-
tus attractiōis & relaxationis talū neruorū: & iſta biſurcatio arte-
rię ē iſtis neruis ſicut Rota/ ſuper qua cū corda haurit aqua a pu-
teorē/ hic locus tam a ſiniſtris q̄ a dextris/ circa quē mouētur seu
cū inherēt in ſuo motu tales nerui reuerſiui/ a Gale. uocatur
Dyablu/ & Flexor. Vocat etiā ab aliquibus Gergilus & Bochūs
& Gal. unde iuuen. caput aſſimilat iſtis neruorū reuerſionē iſtis
qui cū equis in cāpo reuertūtur ad uiam a qua uenerūt ptius: &
didit q̄ eſt quaſi reuerſio rei ſupra Rotā parui: & unde uſitate

Rota.



Dyablu.
Flexor.
Gergilus.
Bochus.

cap. xiii. dicitur: q. ipse primus omnium inuenit istos nervos taliter
 toti: & suos musculos capita eorum ad inferiora habentes.

Nota cetera
 Ansto.



C Inquit etiam q. reuersio istorum nervorum monstrat nervos orti a ce-
 rebro & non a corde: ut putabat Aristoteles, quia si nervi ortirentur a cor-
 de: ipsi reuersiui tenerentur ab ipso & non a cerebro: ut sensui patet.

E Ex istis nervis reuersiuis partis dextere / natura fecit etiam Glos-
 sam seu Rotam illam quam fecit in parte sinistra, de uno satis notabili
 ramo arterie ascendente oblique versus atriellam dextram: circa su-
 culum pectoris superiotem dextere partis, quae Arteria vadit ad tu-
 chium dextrum: cui ramo adiunxit alias pelliculas ibidem existen-
 tes: ut sit fortis: quia hic Ramus non est &que magnus: sicut est
 le: circa quem reflectuntur nervi reuersiui sinistri lateris antedicti.

E Et sub isto ramo dextere partis a pelliculis predictis fortissime
 ascendit per collum nervi Reuersiui dextri: & tam dextri quam sin-
 istri: ascendendo implantantur cum pluribus ramis ad musculos
 epiglottidis: ut sensui patet: quibus mediatis uoluntarie mouet
 Epiglottidem seu Laryngem: sicut equitans mediante freno & la-
 benis: quando uult mouere equum.

Nervi uocis.



I Inuenerunt nervorum predictorum descendentiū / sunt dare sensum:
 & secundum aliquos aliquem motum membris, ad quos uadunt in suo
 descensu: de quibus supradictum est. & Inuenerunt Reuersiuorum sunt
 pro danda uoce: ideo uocantur nervi uocis. Passiones omnium
 modorum patiuntur tam descendentes quam Reuersiui: & si ipsorum
 plexio notabiliter mutetur: interdum contingit in eorum descensu
 gratia uicis: maxime descendentiū: & forte Reuersiuorum amitti-
 tur uox & alie sue operationes: si non ab latere saltem diminuantur: & si
 soli Reuersiui incidantur integre utrinque amittitur uox & loque-
 latio: uero in uno latere solo: medietas harum operationum seditur: sed
 si incidantur descendentes: quorum Reuersiui sunt partes secundum
 aliquos sedentur illae quinque operationes: de quibus meminit Gal-
 4. Interiorum cap. xvi. Exitus aeris a pectore cum anhelitu: & flammæ
 sine ictu seu strepitu: & flammæ cum strepitu: & uox: & loquela. Vo-
 lunt tamen aliqui: q. ad incisionem descendentiū amittitur sola
 uox & flammæ cum ictu. De istis tamen nervis uide commentaria nostra.
His uisis, dimitte nervos Reuersiuos in loco suo in collo: ut
 ipsos melius uideas musculos epiglottidis: quibus alligantur. Dantur
 etiam Vetriculi parti superiori: & tota gula sine menti: & parti illi

posterioris suplotē / quā seruasti pro trachea uidēda. Dimittē etiā
talē partē uenarū & arteriarū ad brachia & ad caput tendentiū:
ut ipsā possis loco suo uidere anatomia. Cor uero & alia mēbra
inferioris & mediū uentris / q̄ prius fuere uisa & seruata pro uentri
arteriis & neruis antedictis uidēdis abiciās: & anteq̄ ulterius pro
cedas in p̄senti ordine anatomie sunt aliqua dicēda de facie: & de
aliquibus partibus eius: deinde ad epiglottim & ad gulā deueniēdū.

¶ De Facie.

Ades a Romanis a Græcis Προσπον dicta: quę est soli
f hominē: est pars anterior capitis oībus uota. Hęc pars ue
niter magis anatomizāda cū uētre supmo quā cū me
dio: sed per accidens de ipsa in p̄sentiarū sit sermo: quia in cōi
anatomia gula & Gutur nō possunt inuestigari nisi prius de par
tibus aliquibus faciei fiat mētio: & dicā facias quāsi faciens homi
nē. Per ipsam. n. sit uniuscuiusq̄ p̄sonę cognitio: & distinctio.

facies.
Προσπον.

facies uide.

¶ Hęc pars facies dicta uocatur etiā Vultus a uoluēdo: & a uolen
do dictus: quia per ipsam cognoscūtur animi affectus: in quibus
ipsius mutatur color: uel p̄pter uetecūdiā / uel p̄pter aliquod
crimen cōmissum: uel p̄pter timorē / uel egritudinē. Sunt tamen ali
quis quibus Vultus raro mutatur: & hi appellātur uultuosi.

Uultus uide
decurt.

Uultuosi.

¶ Mutatur etiā Vultus de etate in etatē: & differt facies a Vultu
in hoc q̄ facies stat semper eadem: & uultus mutatur: licet pro
etate facies mutet colorē: & quātitatem: & notitia faciei multum
cōsideratur a physionomo. Cōsideratur etiā a medicis: ut primo
prognosticorū: in primis egritū faciei cōsiderabis. Inuat. n. in cogno
scendis multis morbis: sicut leptam / peripleumoniam / icteritiam / ca
cessā alias cachectiam / & tempus menstruorū in fœmina. In ipsa
etiā cognoscūtur simulatēs egritudinem / sed nō semper.

facies inuat
in prognostici
cundo.

¶ Eius situs ē anteriori parte capitis capillatę subiectus. Sua sub
stantia est ex cute rariore & leniore quācūq̄ alia cute corporis: ua
porū a toto ad ipsam ascendērium & decoris gratia: sub ipsa cute
sunt multi musculi: & uenę pulsantes: & quicq̄ nerui p̄nīculi: illi
gamēta: cartilaginee & ossa: Numero ē unū mēbrū organicū.

¶ Numerus partū ipsius ē Frons / Tēpora / Aures / Supercilia / In
tercilia: Nasus / Oculi / Palpebrę / Cilia / Malę / Maxille: siue Mā
dibulę: q̄ in p̄senti sunt synonyma / Os: & Bucca / Labia / Gelas
ni / Mylar / Lacuna sub naso: & Mētrū cū sua Lacuna. Sua quāti

tas/sua figura/ & colligãtia patent: sua cõplexio est qualis cõplexio partũ ipsius: inuamenta sua sunt etiã ab ipsius partibus inuenda. Passiones omnium modorum patitur.

¶ De Frõte: & aliis faciei partibus/ exceptis Naso/ Oculis/ Palpebris/ Cilis/ & Ore cõ suis partibus.

Frõs e ualde
bècatur.

Rons est tota ea pars media suprema faciei p̃stis: nuda quẽ est supra oculos: ab aliquibus t̃m dicit̃ oculos esse in frõte: & ideo teste Varrone dicit̃ frons a foratu oculorũ.

Frige i frõte.

¶ Sub cute frõtis est unus musculus dilatatus uillos suos habet secundũ lõgũ corporis/ quibus mouet supercilia: in frõte etiã sunt rugę secundũ ipsius latũ tẽdentes: secundũ quartũ situm errabund medici secãt exituras/ sed male/ quia tunc cadunt supercilia. De bent igitur fieri sectiones in fronte secundũ longũ corporis.

Cutit i frõte.

¶ In fronte sunt uenę aliquę/ quę in diuersis morbis secantur: & Sanguisugę etiã ipsis applicantur. sub musculo p̃dicto & p̃niculo p̃dictaneo est os frontis coronale dictum.

¶ De Temporibus.

Cunde dicunt
tempora.

¶ Ad latera frontis sunt tẽpora sic dicta: quia in ipsis cõgregãtur anni multorũ aialũ. Primo. n. canescit in homine: sed nõ lĩpet. Canãtur etiã diuturnitate tẽporis: in tẽporibus sunt ossa parua oblõga per trãuersum capitis tendẽtia/ quę intra se & cranei custodiũt musculos tẽporales: hęc ossa ab Aue. ossa partis dicit̃: & ultra: p̃dictos musculos in tẽporibus sunt etiã aliquę artetę et uenę insignes/ quę in aliquibus morbis secantur.

Ossa partis.
Uenę in tẽpo
ribus.

¶ De Supercillis.

¶ Supercilia sunt omnibus nota/ quorum situs est in fine frontis congenita sunt cum homine ornatu causa / intenta a natura ut tueantur oculos a puluere descẽdente : & a pluua & a similibus nõ crescunt sui p̃li/ sicut hi/ qui capitis gratia boni finis.

¶ De Interfiliis.

Iunãtia.

¶ In confinibus frontis est certũ interfiliũ diuidens supercilia in ipsorum medio. Diuidit etiã frontem a naso: & huic parti rãq̃ ad centrum cõterminatur nasus & infima ac media pars frontis: hic locus uocatur Glabella sue Glabra. Glaber. n. dicitur sine pilis: hic locus etiã dicitur lepor nasi. In isto loco incipit s̃pe herispilla uel herispella sed rectius herispellas: alio nomine a iunãtibz uocata Gura rosea.

Glabella.
Glabra.
Glaber.
Lepor nasi.
Herispella.
Gura rosea.

¶ De Malis.

¶ Malæ sunt illæ partes torundæ in facie: quæ etiâ poma dicuntur: & sunt infra oculos a lateribus nasi: & sunt soli homini: & genæ propriè uocantur. licet maior pars faciei nominetur gena: huius partis cutis est rarior omni alia faciei parte: quæ defacili rubet & mutat colorem suum naturalem in animi affectibus: qui cõiter in bene complexionatis est roseus: itæ Malæ ornant faciem & sunt tutela ad oculos & ad nasum: & quilibet ipsarum habet unum muscolum latum firmissime suæ cuti unitum: qui seruiunt ipsi & labiis: ut inferius in sectione labiorum dicetur.

*Malæ.
Poma.
Genæ.*

¶ De Barba Gena dicta:

¶ In facie est etiam pars barbata: quæ proprium habet nomen & uocatur gena a gennao uel genere: quia ibi pili generantur. Hæc pars etiam ab aliquibus dicitur Mustax siue Mustax.

*Genæ.
Mustax.
Mustax.*

¶ De Mento.

¶ In inferiori parte faciei est mentum ab eminendo dictum. Dicitur etiâ anthereon. A gula. n. eminetia quo dicit morbus metagra: Sua pars suprema incipit a radice superioris labii: & finem habet in infima faciei parte: & propter talem locum potest dici mentum. quia infimum in cunctis rebus: si non sondebant esse mites.

*Anthereon.
Anthereon.*

¶ In medio menti: est certa cauitas ab aliquibus buccula & buccella dicta: dicitur etiam typos.

*Buccula.
Buccella.
Typos.*

¶ De Gelassinis.

¶ A lateribus oris uerius in cute in aliquibus indiuiduis: & maxime in pueris & in feminis est certa fossula: quæ apparet in risu: quæ indicat decorem & uenustatem: & ideo uocatur talis fossula Umbilicus ueneris & Gelassinus: uocatur autem umbilicus ueneris: quia assimilatur concauitati repertæ in foliis illius herbes: quæ uocatur umbilicus ueneris & cotyledon.

*Umbilicus
ueneris. Sed
fuit.
Cotyledon.*

¶ De Lacuna sub Naso.

¶ Sub naso in medio labii inferioris: est certa uallecula: quæ Lactaria Firmianus propter similitudinem suæ cauitatis: uocat lacunam: ab aliquibus dicta phyltron: et sphenon: et hyssia: De naso: oculis: ciliis: palpebris: ore et suis partibus loco suo dicetur: ad anatomiam oris initium summe.

*Lactaria.
Lacuna.
Phyltron.
Sphenon.
Hyssia.*

¶ De Anatomia Oris & partium eius.

(do.

Tigit trachea: epiglottis: et Gula possint investigari cõmodè: sicut promissimus: ad oris et partium ipsius sectionem.

*Quid oris
et dicitur.*

deuenio: & dico: quod os est illa pars cœcaua in facie immediate intra labia existens: quā primo dibuset potuisset pro pre Aet intra corpus ingrediatur: et quā exeat spiramina: et uoces: et in qua sit loquelat: dicitur os quasi ositū ad p̄dicta intra et extra mittere.

Bucca.
Buccæ.

¶ Bucca uero seu buccæ sunt illæ partes in facie seu ore: quæ naturaliter a spiritu possunt inflari. Et ipsa cœcauitas oris / quæ spiritu a pulmone reuocatur: et oppressis labiis in ore retento inflatur.

¶ Oris partes sunt labia: dēres / gingiuæ / maxillæ / palatū / uuea / lingua: tonsillæ: et fauces.

¶ Ex p̄dictis patet oris substantia: situs & figura: quæ sitas sua obibus nota est: Numero est unū mēbrū: Numerus p̄tū ipsius diuisus est. Sua colligātia sumit a p̄tibus suis: Et etiā sua iuuamēta. Sua p̄plexio est quæ sunt suæ p̄tes: passiōes omnium modorū p̄tū.

De Labiis.

Labia.
Labia.
Prostomia.
Prostomia.
Prostomia.
Prostomia.

Abia quæ etiā labra dicuntur: aliis quibus sunt grossa / aliquibus subtilia: grossa cōmuniter arguuntur ignis rudatē: labiorū pars prominēs procllū noiaf. Eorū dē p̄tū cōgressus: prostomion uel prostomia dicitur: & hi quibus prominent labia simul & dentes: brochi uocantur: in medio labiorum est fissura: quæ proprie os appellatur.

¶ Labioꝝ substantia est cōposita ex carne musculosa: cute & p̄niculo: gōlæ p̄tinuachag p̄tū unio est taliter cōpacta quod difficilime unū seperari potest ab alio: & est talis: ne p̄ grossitū impediatur suus agilis motus: & ad oēm positiōis differētiā: & idē ipsi sunt quatuor p̄tū musculi: & duo cōes ipsi & p̄tū faciei.

¶ Et p̄ptū sunt parui proportionē labioꝝ: qui anteq̄ cuti unītur sunt inuicē cōtēnati: taliter quod suæ partes sunt inseparabiles sine ipsorū laceratiōe: quoꝝ unū par p̄tū sub p̄tū faciei oblique uersus labia: alii etiā duo p̄tū oblique ab inferiori mandibula uersus labia.

¶ Et licet sint tantū quatuor musculi labiis: sunt tamen octo motus teste Gal. xi. de util. c. xvi. l. quatuor recti: & quatuor obliqui: nā quilibz istos: dū mouetur: oblique mouet / quia situs cuiusq̄ ipsorum obliquus est: sed qñ duo ex eis equaliter mouētur recte mouent / sicut est in ipsorū apertione: in qua est unus motus rectus: Alter uero motus rectus in labiis est quando inuicē clauduntur seu comprimuntur.



¶ Sunt etiā duo alii motus recti in labiis: unus est quādo ipsa extra uertuntur: & alter quādo intra plicantur: & illi motus sūt a uillis rectis: quos quidā sunt intrinseci ad ipsos musculos labiorū: & quidā extrinseci: & quando extrinseci tenduntur tunc labia extra uertuntur: & quādo intrinseci tunc sub seu intra plicantur: & quō motus obliqui sūt ab unico musculo: & recti a pluribus: facile est iudicare: si in inspicitur clausura unius buccę: quę quādo simul trahuntur: recte & uniformiter aperiant os buccę: cūq; unicum ipsorum trahitur: os buccę transuersaliter mouetur.

¶ Autē, tamen quāuis dicat predictū situm musculorū ponit nisi quatuor motus: sicut sunt quatuor musculi: dicit ipsi sufficere quatuor motus. Inquit q; unaquq; ipsarū pars: cū mouetur ad suam monet partem: cūq; duo ad duas mouētur: ad duas dilatantur partes: / adest ergo eis complementum motus ad quatuor partes: neq; ullum habent motum nisi istos.

¶ Et tam Gale. § Autē, loquūtur de motu proprio / quā motus cōmunis ponit & labiis sūt a duobus musculis latis / quī sunt in unaquaq; mandibula: & sunt lati maiores predictis: & illi teste Gal. sunt extrosi a malis usq; ad spinam colli: ad quos uadūt nerui a pectore: & a clauibus. La furculis superioribus pectoris / qui impliūtur malis & labio inferiori per uillos rectos: & alii alii uilli a clauibus etiā oblique tendētes: & alii alii magis obliqui predictis a scapulis ascendentes: apud latera labiorū pomis implantantur: & adhuc alii alii a loco retro aures (quas interdū mouent) ad istos musculos tendunt. Illi tamen musculi non cognoscuntur manifeste: quāuis multitudinē neruorū habeant fere ab omnibus colli partibus. Cognoscūtur tamen: si clausis mādibus ad suum ultimū conatū moueātur labia & faciei poma: nō q; partes ossosę pomos moueantur: sed sua pars carnea musculosa predicta mouetur cū curesq; est proprie pro solo motu labiorū: ad quā & etiā ad ipsa labia uadūt musculi predicti lati: q; mouēt labia & mala: & hic uocat cōlis motus. s. labiorū & pomorū.

¶ Aliqui etiā uolūt q; malę in sui supiori parte moueātur aliqua lura musculo lato mouente frontē: & alii dicūt q; illi musculi lati mouentes malas et labia: / luvāt etiā masticationem.

¶ Erisorū musculorū motus optime uidentur in uicis: maxime in extenuatis. Et ideo de ipsis facio mentionē omittēdo multos



musculorū anatomia/ quia nō possunt uideri in ululs: neq; in cō
muni anatomia monstrari / natiabo etiam linguę & mandibula
rum mūsculos propter eandem causam.



¶ Hęc labia intra se & etiā totū os tegitur pānculo tegente gu
li siue medi: & uentriculū : & pp hoc in futuro uomitu tremat la
biū inferius. Hic tñ pānculus durior & grossior est i ore: q̄ alibi: &
grossior in medi: q̄ in uētriculo: & semp descendēdo efficitur lenior &
subtilior/ q̄a i ore primo obuiat cibariis aliquantulū duris/ quē de
scendēdo semper efficitur molliora: teste Gal. 4. de uul. & iuxta
illud Aut. nutritis masticatiōe aliquantū suscipit digestiōē.



¶ Labiorū figura, situs, quāritas, et numerus patent. sua cōplexio
ponit calida/ colligātur cerebro per neruos/ hepati per uenas/ cor
di per arterias: et ideo interdū in ipsorū cōpressionē cognoscū
tur animi affectus. Expomiguntur etiā: et cōpescunt labia uolūta
rie: Colligātur etiā uētriculo & meri / et toto/ mediāte cuti: Sua
laxamēta sunt multa: sūt primo ad rutellā dēstā: et ad bonā fidel
formā/ ad loquelā exprimendā/ ad cibū et potum sumendū: et
sunt ori sicut ostiū domui se apiendo et claudendo in necessaribz
prohibēt etiā aerem frigidū ingredi ad cor per se et p accidētū
nēt etiā aerē a pulmone reuocari in necessitatibus.

¶ Passiones omniū modorū patiūtur: et iter alias patiūtur fissuras
alias ragadias: et sepe cāctosior tremorē in crisi bus et in febribz
per cōmunitatem a cerebro et a uentriculo.

¶ De Dentibus



¶ Illis antedictis p̄mo quātū potes apias os/ secūdo bu
cas i altero laterē: ut melius dentes ac gingiuas uideat
primo notādo substantiā dentium/ quę ossiā esset teste

Celso est durior ossē. Aliqui tamē dicūt ipsos esse de natura car
nis: et ossis: rū quia sentiūt: rū quia renascuntur/ crescit etiā grātia
suis toto tēpore suę pmanētis/ quia si nō crescerent/ nō durārent
et masticatio esset maluer qua uita esset breuis.

¶ Numero sunt. xxxii. sin uno ordine secundū utriq; genā. xli.
sunt locati/ sūt etiā sepe solū. xxviii. quia rūc desinitit quatuor po
stiores/ qui Neguegid dicētibz Aut. et in sunt duo i quolibet
latere: et interdū desinunt i totū sextet Neguegid sunt ultimi in
ortu/ qui uocant etiam dentes intellectus/ sensus et sapiētis: q̄a
i aliquibus nascūt i iunūrate/ uel senio: et teste Arist. secūdo de na

Neguegid.

Intellectus.
Sensus.
Sapiētia.

tura, seu de hibernis animalibus: matibus sunt plures dentes. q̄ sic/
minuat in genere hominis: ostendit: & captari patet.

ostendit
plures dentes
in canino.

Forū nomina: sunt ala a Celfo: ala a Gal. ala ab Arist. alia
ab Aul. ala a Mōdino. Et primo ista sunt nomina Aul. in qua
libet. parte siue supiori, siue inferiori a medio oris ante uersus
inducendo i medio: primo sunt duo satis lati & quales: duales dicti
a lateribus quorū utriq̄ est unus, qui dicitur incisus a Mōdino
nō ab Aul. dicitur quadrupli. Gal. tñ uocat duales incisuos
quos duos duales: & duos incisuos Celfus uocat quaternos: &
illos oēs Arist. uocat acutos. ut secē: & cōuenit cū Gal. a lateri/
bus illorū utriq̄ est unus. qui cōtinet cinodētes seu canini dicunt:
& ab aliq̄bus gelasini dicti sunt: q̄a apparet in risu magis alia.

Duales.
Incisus.
Quadrupli.
Quaterni.
Canini.
Cinodentes.
Canini.
Gelastini.
Gelastini.

Sunt deinde secundū Aul. oēs molares a molēdo dicti / qui in
aliq̄bus secundū ipsum utriq̄ a lateribus caninorū sunt quatuor
& i aliq̄bus sunt quinque: isto mō sunt. uel. xxii. uel. xxviii. nu
merādo sic: duos duales: & duo quadrupli seu incisus: & duo cani
ni: q̄ oēs sunt sex: & molares secundū Aul. sunt. x. uel. octo: si. x. in
qualibet pte. supiori uel inferiori: i totū sunt. xvi. & ut sic sunt. 32.
si uero sint octo. sunt in qualibet parte. xiiii. & sic sunt. xxviii.

Mōdinus tñ in numero. xxiii. ponit duos duales supiores: to/
tidē inferius: & duos incisuos. & duos caninos: & quatuor molares:
& sex maxillares: tñ nec Gal. nec Arist. ponit noia p̄ticularia om
nū dētiū: sed Celfus ponit quatuor caninos: utriq̄ duos iuxta
quaternos superius: & totidē inferius: Celfus etiā ponit octo ma
xillares superius: & octo inferius. Quatuor utriq̄ iuxta caninos.

ostendit.

Sua figura est diuersa: aliq̄. n. habent unū solū caput acutū: &
unā radicem: ut oēs duales: & quadrupli seu incisui: & canini. Mo
lares uero inferiores habēt ad minus duo capita: & duas radices:
& interdū tres: & tot capita: & maxime ultimi / superiores uero ha
bent ad minus tria capita: & totidē radices: et interdū quatuor
et maxime ultimi: qui sunt tāq̄ murus tenētes alios firmos: & dē
tiū supiorū radices sunt curuæ: ut sint similes: ne sua gravitate
cadāt: & foramina i q̄bus figūtur: sunt mirabiliter ipsis adq̄ta.

figura dētiū
diuersa.

Et ab ossē maxillæ ortur pro quolibet dente unū additamen
tū rotundū firmās dentem medianibus ligamentis fortibus: et
ista additamenta Gal. uocat p̄p̄ptas: q̄ nō solum sunt in loco
ginguarum: sed in extremo suarum radicum.

Præp̄ptia.

¶ Et molares habent plures radices albis / quia sua operatio est magis continua albis, & quia masticatio non mouetur secundum superius & inferius solum / sed lateraliter mouetur seu circulariter.

¶ Omnibus dentibus teste Gal. & Auic. est aliquis sensus.

¶ Sua quantitas & situs patent colligantur mandibulis & gingiuis & cerebro per neruis sua complexio est nota / iuuamenta sunt preparare cibum per stomacho; modulatur et loquelam; sunt etiam anima naturae.

¶ Patiuntur omne genus morbi: quod patiuntur alia ossa in eis fit dolor / comotio / corrosio / putrefactio / congelatio / coloris alteratio; & elongatio a suo naturali loco.

¶ De Gingiuis.

Oss dentes uidetur sunt Gingiuae; sic dicte a gignendis dentibus, & sunt carnes simplices, durae, in quibus sunt infixi dentes ipsi sunt tot foramina, quot sunt dentes.

¶ Numero sunt duae, una superior, alia inferior: Sua figura pariterque sequitur figuram suae maxillae. Patet etiam situs, & quantitas, & colligantia. Sua iuuamenta sunt firmare dentes & circumscriptos uellere ossa mandibularia; & suo calore illa confortare, & carentibus dentibus praebent iuuamen masticationis: eis etiam est sensus notabilis per colligantiam cum cerebro medianibus neruis per eas dispersis. Passiones omnium modorum patiuntur.

¶ De Palato.

Oss Gingiuas secundum uerum uniuersalis Anatomiae methodum occurrunt palatum / quod est pars oris teste Aris. primo de hyistoria. c. xi. & est illa pars in ore siue apertio siue clausio, quae est supra linguam.

¶ Haec pars ossa est ex ossibus mandibularum superiorum confitura tamen tamen recta aliquantulum carne cum suo paniculo tegere, in quo sunt nerui aliqui dentes sensum gustus & tactus: et haec pars in ore assimilatur coeui testudinis / seu caelo fornicis: ideo dicitur caelum & altum oris: & dicitur palatum / quia in apertione oris nobis palam ostenditur, uel quia manifeste latum uidetur: & palatum teste Gal. est tanquam campana praefixa Laryngi seu epiglottidi in quo fit uocis insonatio.

¶ Situs, figura, quantitas, & numerus, ac colligantia patent: sua complexio frigida & striata ossa est a praedominio in isto membro non est aliquod foramen colatorio sensu: ut patet aliquo

Gingiuarum
de dicitur.



Eodem.
211. etia.
Campus.

Noti de ca-
latorio.

quod expurgentur superfluitates cerebri sed tale foramen seu foramina sunt in osse basilari supra nares aut alibi dicitur.

¶ Ipsius iuvamenta sunt ut clauso ore & etiam apto ibidem retineat aer / ad hoc ut caleat si frigidus est / ne talis suo ingressu ledat cor. Retinet etiam Aerē a quo refectat cor i necessitatibus / tuat etiam in retinēdo aerē vocallē: & ideo palatū rugosum est / ad hoc ut aer creat undosus. Palatū ē sua p̄cavitāte tuat revolutionē cibi in ore masticationis tempore / mediāte etiam sua cōcavitāte lingua āgilius movetur p̄ suis opatiōibus / cum sua etiam pellicula tuat digestionem / adjuvante et pellicula totius oris & forte spūto in masticatione cibariis misso.

¶ Passiones omnium modorum patitur / & inter alios morbos patitur in febribus colam seu alcolam.

¶ De Vuula seu Vuca.

N sine palati iuxta fauces versus caput in oppositō Radix lingue est orū mēbrum carneum / Rarē substantiē / membrana tectum / culus quantitas & figura est equiparata grano uicē: & ideo uicaria gena: et uicigera dicitur. Dicitur etiam Columella et etiam Columna et ab aliquibus Gargareon: Gargat et Gurgulio / dicitur etiam fundibulū. Crescit tamē hoc membrum p̄ter naturaliter in longū et latum ab humiditate replentē inter dū assimilatur caudē muris aut ego sepe vidi: et interdum in duratur / et interdum strangulat teste Aristo.

¶ Hoc mēbrū est soli hominī. Sua substantia ē dicta in qua sunt aliq̄ uenē et Arterię et ideo si soluaſ notabiliter sanguinē dūdit. Sua complexio calida est et humida / numerus / situs et cōligantia patent / hoc mēbrū cedit locū deplutis nec morū habet voluntariū. Ideo caret musculis sicut in Rēstrāgēdo & in alterando aerē p̄ os pectori semitēret secūdū aliquos in modulādo vocē phibet et sitim phibēdo aerē exsiccatē ingredi fauces uolētet.

¶ Passiones omnī modorū patitur et p̄sentim coruſionem: et masticationem / quibus sepe requiritur cauterium.

¶ De Lingua.

Lingua interdū accipit p̄ uarietate sermonū aut gręca / arabica / Latina et id genus. Multa ē alia significat / de p̄nitiō capis p̄ mēbro i ore cōtēto. Et lingua dicitur a ligā / quia ligata ē ab uno extremo ad aliud intra itenotes mādibulas.

Uua.
Uingua.
Uingem.
Columella.
Columa.
Gargareon.
Gargat.
Gurgulio.
Fundibulum.
Uua est soli hominī.

Lingua un-
de dicitur.



De musculo
lingue.

Huius membri substantia naturaliter Rara/fungosa: ac mollis est. Est etiā accidentāliter mollis: propter humiditates a capite: & a nētriculo ad ipsam descēdētes. Caro etiā glādiola i ipsius radice in qua sunt fontes salinales humectat ipsam mediante saliva: ē etiā ipsi multitudo nervorū: tū pp sensum tactus & gustus: tū pp motū: nervi q dāt gustū: veniūt a tertio pari nervorū cerebri: q vero motū: veniunt a septimo: & hi nervi sunt notabiles: quia lingua indiget excellenti sensu: & etiā motu: plurimo etiā indiget calore & nutrimento. Ideo habet (similiter & uirga) plures et maiores passantes & quietas uenas quocūq; alio membro sibi pari magni: rudius: & nervi dātes ipsi motū: sunt distincti a dātibus sensum: sed qui dant sensum tactus: dant etiā gustū: & gustus facilius corripitur tactu: quia gustus est uirtus subtilior tactus: & situs actus: nū sensus ē superficialis: situs uero nervorū motus est acerratus magis plus & minus secundū locū musculorū: q cōter ponit nouē. s. quatuor parias: & unus solitarius: quibus mouet ad oēm positiōnis discretiōnē: & lingua in sua radice est ampla: grossa & fortis: in anteriori uero est subtilis & acutatur promptior sit ad motus.

De predictis musculis duo sunt a lateribus lingue utriq; unus qui latitu finales uocantur: procedētes ab ossibus acutis capitis post aures positos: a quo loco ē pro parte ueniunt illi illius musculi: qui est cōmunis pro motu labiorū: & pro motu pomorū faciei: & hec ossa uocantur sagittalia: & acularia: sunt etiā duo longitudinales dicimur a supremo ossis lambdę: qui cū medio lingue cōiunguntur: & alii duo musculi sunt: q ex trāuerso mouēt linguā: procedētes a latere: quod ē iherus ex duobus ossis lambdę lateribus: & isti penetrāt inter p dictos longitudinales et latitudinales.

Sunt etiā duo alii ipsam cōuertētes et resupinātes: isti q; uili sunt in latū expāsi sub pēllis: & hi sunt cōiuncti cū ossē mandibulę inferioris: Aste. tñ. x. m. alii dicit istos ultimos ēē supra alios: est deinde musculus unus solitarius dicitur: q pūnuat linguā ossi lambdę: et trahit unū ad aliud: et hic musculus pellit linguam ad exteriora ipsam elongando: ipsam etiam retrahit et abbreviat:

Sūt tñ multi dicētes: q lingua ad exteriora nō mouet uolūtarie: sed mere naturaliter ab imaginatiua: sicut uirga: et aliq dicit ipsam et ēē uirgā moueri a musculis: et ab imaginatiua simul: et aliq ab imaginatiua sola: q mediāre spū cāt. uērositate dilatāte

& erigētem ulgā pariter et linguā cū eductiōe extra os: hęc tñ
sunt tacta a Gal.^p de moribus ligdis et ab Aul. prima p.^l de
musculis linguę: ibidē expōitores solūt dubia quos uidē.

¶ De Osse Lingue.

Inguā i sui radice habet os cui annectit et ligatur et tāq̃
I sup sua basi sita est in multis suis moribus et hoc os i ma
gīs aliaibus ē quadri laterū nō multū durū sed ē quasi
cartilagineū et vocatur os hyoides et lab de quia assimilat ipsi
litterę gręcę: duo ipsius latera minora sunt uersus linguā q̃ sunt
i forma litterę p̃dictę bifurcata et duo etiā taliter formata p̃rimis
maiora sunt uersus cartilaginē peltalē epiglottis quā amplectū
tur et ei alligatur: ne labat hinc inde ut melius hoc os fumer mē
bra alia sibi alligata et nō solū alligatur epiglottis sed etiā ad Me
ri per ligamēta aliqua. Hoc tamen os in homine tato habet qua
tuor latera sed duo tantum uersus epiglottim.

Os hyoides.
Lambdac.

¶ Et hoc os non fuit oblonge sed rectę figurę quia grauitas lin
gue traxisset ipsum ad unū latas tantum: et tunc nō fuisset bona
loquela nec bona masticatio et hoc os uocatur Hyoides a Gal.
et os lambdę et ab Aul. Alfahic.

¶ Iuuamēta huius ossis a Gal. sunt posita multa / quibz sit parū
os optimos ab ipso ad linguā ueniunt plurimi musculi et etiā mu
sculi aliqui epiglottis et ab ipso uadunt aliqui ad spatulaster aliq̃
ad pectus et aliqui ad mandibulas ab ipso etiā seu a suis ligamē
tis oriūtur cordę musculorū sibi p̃opinquorū et est etiā defen
sorū peltalis cartilaginis Epiglottis et hoc os ē principale fun
damentum super quo uenit lingua in suis moribus.

Alfahic.

¶ Huius ossis sunt tres sibi p̃oprię musculorū cōiugationes. Unū
par p̃cedēs ab extremitatibus mādibulę inferioris uersus illā p̃tē
cū qua cōtinuat radice lingue quorū unus ē a dextris alter a fini
stris et istud par dū cōtrahit trahit ipsum uersus mādibulā.

Quot muscu
li ossi hyoi
deo.

¶ Secundū par oriūtur sub mento et trāsit ad illud os sub lingua
et ipsi colligatur uersus partem superiorem et uersus epiglottim
et istud os trahit ad partem mādibulę.

¶ Tertium par oriūtur ab additamentis aculearibus ossis capitis
a duabus extremitatibus ossis acutis quę sunt post aures et
isti musculi cōtinuātur cū extremitate istius ossis quę est uersus
linguā et trahunt ipsum ad superiora uersus posteriūs.

C Alii omnes musculi huius ossi continuati, sunt communes ipsi & membris ad quæ vadunt.

Boat velle
sub lingua.
v. m. r. v. d. c.
v. b. e. c.
v. i. g. n. t.
v. a. n. i. n. a. t.
f. a. c. i. a. s. a. n. g. u. e.

C Sub ipsa lingua sunt duæ notabiles venę utrinque unaquę in multis dispositionibus phlebotomatur, præsertim in synagge, quę sūt ruberę interdū nigre, & interdū virides, & vocantur ab aliquibus Raninę.

C Sub lingua etiam ubi ipsa alligatur ori, sunt certę cavernę notabiles bipartitę, quę vocantur Orifidia, seu ora, vel fontes salivę, quę ab A. m. c. vocantur generativa salivę, in quibus de facili ingreditur filus, hęc orifidia aptiut & claudut ad istar bursa salivę multiplicare & deinde. Hi fontes terminantur ad carnē glândosam prædictā in radice lingę locatā, a qua continue humiditas salivalls in prædictis forib⁹ teludat.

filium.



C Sub lingua est etiam certa pellicula in medio eius per longum tendens, quę vocatur a nostris vulgaribus il Fillelo, quę in aliquibus est magna, & obstetrices ipsam vel Chirurgici secant in grata Infantię, quę si non incidatur, trauolos causat.

C Compositio lingę est calida & humida. Sua figura, & situs ac colligatio ex prædictis patent. Sua quantitas est cõspicabilis. Alia enim teste Aristot., est lata, alia angusta, alia mediocritas, sed illa est laudabilis, quę est secundum potentiam loquendi cõmensurata in sua longitudine & latitudine.



C Numero licet videatur unum membrum. Sunt tamen duo membra, apparet tamen unum ex duobus similibus cõpositum. Cõmuniter enim natura creavit sensus duplices, ut si cõtingat uni parti nocumētum, quod altera pars illesa maneat, & nō fuit diuisa sensibilibiter in duas partes ab invicē distātes, propter masticationē & loquelam, sed est unita mediāte uno pānculo ipsam tegente. Hic tamen pānculus est diuisus per longū in duo latera sub & supra unius tris, & firmissime alligatus lingę. Et hic pānculus est cõtinuus cū pānculo tegēte vētriculū, & Meri, & totti os intus.

C Instrumenta lingę sunt principāliter ad vocis distinctionem, & ad licetis articulandas. Et ideo Galen in libro de voce & anhelitu dicebat vocis & orationi posita sunt tria mēbra. Trachea, Epiglottis, & lingua, et unguisq; hęc glândulas humiditatē ipsis tribuētes.

C Et glândulę trachę sūt scollo ipsam humectātes, et colli partes.

C Et glândulę epiglottidis, sunt illę quę dicuntur sūt atq; acris. (quartes).

C Est etiā certa caro pinguis glândosa circa illud cooptorili epiglottidis, quod dicitur Glottis: quod est vocis principale organum.

lingua tamen habet glândulas quibus uadūt uenę ipsiſ portātes ſubſtantię uero carēt uena / ſed ſuapte natura replent humiditate inſuſ & deorſum ad ipſas fluēte & i epiglottidi general humiditasqua humectat ſra capite etiā ad ipſam fluit humiditas aliqua.

¶ Lingua etiā iuuat ad diſcretionē gultus iuuat etiam ad reuolu- donē cibi in orotaliter ut omnis ipſius pars cōteratur. iuuat etiā deglutionem. Paſſiones omniū modorum patitur.

¶ De Amigdalis.

N ſupiori parte laterali lingue circa ipſius radicem ſunt certę carnes adenoſę ſeu glandoſę utrinq; una a multis amigdale uoiatę q̄ ſimul cū uena aſſicta & Gaſſamac & etiā Alſahic. i. aertii ab Aule. ponūtur inter partes gutturi ad diſtanc p guttur Aule. i. interpretatelligit ſpatii quo ſunt meatus cibi & anhelitus / ſed male q̄a guttur cōter a larinis capitur pro trachea arteria. Caput etiā pro parte anteriori colli q̄ eſt a fauci- bus ad iugulū & ideo Ceſſius dicebat uenas grāges. I. gulder / cē in dextra / ſiniſtraq; circa guttur / & teſte Plinio guttur ē homini tū qd̄ inuencit plerūq; uidoſ & hic tumor botū dicit & ē ſtru- ma. licet ſtruma idicoet etiā ſerophulas & aliquos alios tumores.

¶ Iſtud ergo ſpatii qd̄ eſt poſt uena & p̄dictas amigdalas & gal- ſamac & alſahic dicitur faux / & faux ſeu guttur i uia Aule. i. terti nō eſt mēbrū aliquod / ſed ē illa uacuitas ad quā terminat ſumū Gule & tracheę / i culus cōtermino uerſus āterius ē uena / & ami- gdalę & alſahic / & gaſſamac. in ſuo uero cōtermino ſupiori ē illa uacuitas q̄ terminat p ſupra palatū ad naſum / & ad os baſilate uerſus anſtractus ſub collaratio exiſtētes de qbus iſta fiet ſermo: Faux ē uocaſ collū ab itetp̄te Gal. i. lib. q̄ uoce & anclitu dicēte / Et uoco collū locū illū q̄ ē iter ſupius epiglottidis & ſupius ceſo- phagi uſq; ad radicē lingue dicit tñ q̄ i iſto loco ſūt muſculi brā /

¶ Et p̄dictę glândulę de quibus i plēni intēdimus tō ſil / (choy. lę cōter dicūtur & Ceſſius uocat ipſas glândulas & Mūdinus ſau- ces licet male / & gręci uocant Antidas & pariſthmia.

¶ Harū amigdalarū ſubſtātia ē carnea & nervea. ſeti pellicuſi: quibus alligat lateraliter a radice lingue uenę uerſus palatū & ipſis mediātibz uniūtur p̄dictę amigdalę palatoſ & iſtę pelliculę neruę ſimul cum glândulis ſunt tāq; auriculę cauernoſę & ideo uocantur Arca : & reſpoſitorium aeris. Iſtę. n. areę ſunt notabiles



Amigdalę.
Gaſſamac.
Alſahic.



Struma f. bot
mini tantū.
Botum.
Struma.

Faux.
Bala.
Alſahic.

Tonſillę.

Antidas.
Pariſthmia.

Arca.
Reſpoſitoſi.



In Cynocephalis/infra quas seruat nō solū aerem: sed interdū ut ego uidi cibum ut sunt castaneę, cicera, auelaneę, fabę / uel similes. Iste ramen amigdalę cū suis pelliculis melius uideatur in uno q̃ in alio: sed melius i uino: quia in mortuo animali retrahuntur. Erunt ę Ares seruant aerem magis in egressu / q̃ in ingressu: ut totus nō exeat a uia cordis & pereat animal: & ut in submersiōe in aquis: & inferioribus ex illo aere retento resatur.

Gallamac.
Golzama.
Alfabic.

¶ Ex istę solę pelliculę secundū aliquos sunt illę quas Aule. uocat Gallamac seu Golzama/ sed iudicio meo nō sunt nisi Ares p̃dictę: quia Aule. dicit. q̃ supra Gallamacē Alfabic. hos lambdę: & hoc os est anectū linguę & epiglotti ante sub istis pelliculis: & si istę pelliculę sunt Golzama seu Gallamac: uera Aule. est corrupta. Lillazę dicit: & Alfabic est supra Gallamac. nec ibidē ē aliud mēbrū uersus palatū nisi uuea: & pelliculę glandulas: de quibus p̃terit sententię facit. Arcā pro Aere retinēdo: & ideo ibidē nō est Gallamachi: sed iudicio meo Gallamac est lingua fissulę dicta epiglottida. Lillud coorptoriū pelliculare: qđ claudit epiglottim/ ne cibaria & alia extranea ingrediantur ipsū: inī infra dicemus.

Alfabic.
Gallamac.

¶ Ex p̃dictis patet Amigdalę lunamēta. Apparet etiā sua colligātia. figura. q̃ntitas: & numerus. sit us suus optime uidet de p̃ssa lingua: & apto ore i sui ultimo/ sua cōplexio ē calida & humida.

Albus
Gallicus.
Squinatus.
Synage.
Brachocellus.
Draçocellus.
Draçogoloni.

¶ Passiones omniū modorū patiūtur: & nūc i certo morbo epidī/ mioso/ qui a uulgaribus morbus Gallicus nominat / apostemal: induratur/ ulceratur: & de facili suscipiūt Reumata a capite: & in istis sit squinatia seu synange nō uerasq̃ uocatur Brāconcellus: & ideo dicit ad fauces brācus: ad nares coryza catarrhus / uocat etiam Draçocellus & forte corrupte: & Bononię a uulgaribus uocat strāçoloni: quia strāgulare apri sunt: neciūt etiā Galoni.

¶ Ista Amigdalas: & etiā linguā: uidebis etiam melius ex corda/ tis Mādibulis: eo mō ut infra diceē/ quia ponam Anatomā suā i musculo: & mēbro totius faciei: & etiā totius cāņ pulmōis / ut possint uideri ad libitū opantis/ q̃a Raro mōstrāfi sectiōe cōl.

¶ De Mādibulis seu Maxillis inferioribus.

Cur sit mādibulis.

Iis Amigdalis: mihi placuit de duabus Mādibulis inferioribus determinare ut colli reliquum commodius: & diligētius Anatomizet: de superiorib⁹ loco suo diceē: & mādibulę a me i p̃sū sumū p̃ illis ossib⁹ capitis q̃b⁹ iuxta sūt dētes.

Ex primo est notanda cutis tegens suos musculos, quæ in uir-
ti et communiter pilis plena, post quam sunt sui proprii musculi, ser-
uantes tribus moribus. 1. motui aperiendi os: & motui ipsum clau-
dendi: & motui masticandi & molendi. motus aperiens facit m-
dibulas inferiores descendere: & claudens ipsas elleuat: & molēs
ipsas circuire & ad duas partes declinare facit: est igitur, necessa-
rium ut motus claudendi sit per musculos, qui a superius descen-
dunt & ad superiora trahunt: & aperiendi motus: sit e contratio
modorū molendi cum transuersione.

In mādib-
lis sunt tres
motus.

Musculi claudētes: sunt duo magni, & magnas hītes cordas
qui musculi tēporū uocantur: qā tēporibus alligantur iter cranii
& ossa parī: & in hoīe sunt parūne grauaret caput: & etiā quia
homo masticat res nō multū duras: & illi musculi habēt magnas
cordas, terminatas extremitati inferiori mādibularū: & sunt ualde
molles, qā sunt prope cerebri, a quo habent tres nervos, duos a
tertio pari, & unū a quarto: & p̄ se quē ipsoꝝ solutio est pessima:
& ideo Gal. xi. de util. c. iii. inquit, si igitur sicut Hipp. dicebat, quæ
sunt propinqua: & cōmunia: & prima, maxime malignantur, non
sūt propinquus q̄ tēporales musculi, nec per plures nervos cere-
bro magis cōmunicat alius musculus: Rationale ē e audire eorū
passionis principia: & p̄ suā nobilitatē natura locauit ipsos in an-
tro tēporū inter ossa unde quaq; ipsoꝝ custodiētia. Musculi oculo
rū sunt etiā ualde nobiles, quia sunt propinqui cerebro: sed non
habēt tot nervos sicut isti: & isti duo tēporales musculi adiutant
a duobus aliis musculis, qui p̄ interiorē partē buccæ incēdunt ad
mādibulas p̄dictas: & illos musculos tēporaliū cordē nō orīun-
tur ab extremitate musculi, sed a medio ipsius ut sint fortiores.

Solutio mus-
culorū tēporū
pessima.



Musculi uero aperiētes oriuntur a loco dicto arabice Al-hiliri: et
quæ sūt duo ossa acutāncularia: & sagittalia dicta: addita occipiti:
& ista ossa sunt post aures: & hi duo musculi descendēdo unīuntur
& efficiuntur unus musculus, postea sepantē: & ex ipis fit corda: ut
fontes sint, deinde iterum rāficantur: & carne replētur: & fit mu-
sculus: deinde mandibularū reflexioni obuiat: & cum contrahit
trahit mandibulā retro: & quia mandibulæ sunt graues per se de-
scendentes: sufficiunt eis duo musculi tantum.

Distinctione
ossū post au-
res.

Masticatoriū uero musculi sunt duo utriusque, qui sunt m-
gularū: & ualde neruosi sub pomis: & sunt tales: ut contrahēdo di-



neruos habeat motus ad hoc ut per ipsos molitio & masticatio co-
pleat: & isti muscoli cum una sua basi sunt circa ossa parietis: cum una
alia versus faciei partem: cum alia versus mandibulas, quilibet ut
Angulus predictorum musculorum est mixtus similitudine partu faciei in
directo ipsorum diversimode moveat mandibulas: ut aliqui volente
teste Gal. quilibet istorum musculorum esset tres musculi: & came-
ritas illa, quae est circa partem faciei est ab illis musculis pro parte.

¶ Lingua etiam exceptis illis musculis iuvat masticationem te-
nolendo cibum.

¶ Et muscoli eleuantes mandibulas sunt magni: quia habent
magnum motum: & sunt molles: quia sunt cerebro proxi-
mi.

¶ Et muscoli deprimentes sunt parui: quia facilius est deprime-
re mandibulam quam eleuare: & eleuatam tenere.

¶ Masticatorii vero sunt medi: quia mandibularum circūductio est
facilior eleuatione: & depressione difficilior.

¶ Mirabile aliqui: quod natura fecit in hōie maiores dentes masticationis
& plures quam in aliis: dicendum quod natura preparauit non solum dentes ad
incidendum cibum: sed ordinauit rationem: & artem: quibus utitur ad incidenda
cibaria: fecit etiam masticatorios maiores: & plures: quia actus mas-
ticatorius est fortior & permanētiore: quam masticationem ut plurimum
nisi forte per accidens in egrotis: non facit ars: sicut incisionem ciborum.

¶ Vides musculis ut os lambas: & caput Meri: & epiglottim me-
lius uideas: ab utroque angulo illius fixum: quod os uocat: scilicet non
suer saliter eam: & musculos predictos versus aures: in qua sectione si
posueris: consideras predictos musculos: & etiam alias faciei presertim
nasalem, palpebris, oculis: & auribus: de quibus loco suo dicet. Et
notando prius ab ipsis cutem cum diligentia: quibus uisis denudabis man-
dibularum inferiorum ossa a iuncturis suis superioribus usque ad medium
menti: in quo ipse per unam iuncturam sunt firmissime uniti. Vnde etiam
ossa predicta utrinque capit: per unam iuncturam lateralem circa aures. Notabis
etiam locum situm: numerum: figuram: colligantiam: & quantitatē. Sua substi-
tia: complexio: & iunamēta pariter. Passiones omnium modorum partium.

¶ De Anatomia Gutturis & Gulæ.

¶ Iis mandibulis ipsas cum diligentia salceserra: uel alio instru-
mento integre a suo loco moue: ut Guttur: & Gulam
melius uideas. Linguam tamen illesam et os lambas seruare
possis: horum membrorum uidere colligantiam: mandibulis amotis: ut

vestigato firū gutturis& Gulę& ossis lambdę: quod est locatū iuxta radicē linguę & caput gutturis. Hęc mēbra nū nō moueant nisi prius uidebis ipsorū musculos. sed anteq̃ ipsos uideas Anato mię gutturis. et gulę ē uacādū. Ita. n. mēbra sunt adeo p pāniculos et ligamēta iulicē colligara. q. unū absq̃ alio inestigan negt.

Guttur. S. uia aeris sub faucibus usq̃ ad pulmonē pendens antēriorem possidet firū. primo ut sua duritię sit rutela Gulę. Secūdo q̃a p istū firū est magis directū ad pulmonē. et sic melius et facilius ipi seruit. Tercio est anterius. q̃a Gula est ipso lōgiorque si esset ante guttur. uel obliquasset a fine gutturis usq̃ ad uentrīculū et deglutio esset mala. uel quod a fine gutturis etiā usq̃ ad uentriculū uersus dorsum esset aliqua incōueniens uacuitas.

Guttur. Guttur est corpus oblōgū. rotūdū. cōcanū ut cāna. cuius substantia cōposita est pluribus cartilaginibus annularibus. Sūt tamē imperfecti circuli. sicut Armillę. et a similitudinē litterę. C. ideo dicitur cartilaginee. C. formes. et semi circulares. sunt tamen semi circulo maiores. et secūdum partem non circularē obutant Gulę mediāte pāniculo leni. et aliquantū duro. pfecte sphericor ipas intra et extra tegere et ligante. et ultra pāniculū intrinsecū regerem guttur a summo ad imū sunt alia ligamenta cōplentia guttur uersus Gulā. ubi cartilaginee sunt incōplete. Istę tamen cartilaginee absq̃ pāniculo sunt p proprie instrumentū uocis.

Gutturis. p̃s supior cōinet epiglottis / Larynx et nodus gutturis et iterdū Gurgulioet Brōchi et gutturis caput dicit. reliquū uero ip̃ius sepe uocatur Trachea Arteria. et spiritalis fistula. et Arteria uocalis. et aspera Arteria. et pulmonis cāna. et larynx a findēdis uocibus ut aliquibus placet. uel a fando dicta. et Gar. ganet Gargateon. sed Larynx ut plurimū ab interprete librorum Gal. de util. partū i latinā linguā capitur pro ip̃ius parte sup̃e. ma. cōinet tamen pars inferior dicitur Trachea. et guttur a gar. tien so dicta. quia inde garritus uenit. et Aula. prima primi cap. de masculis gutturis. per guttur intelligit hoc mēbrū. Sed non tertio. per guttur intelligit illud spaciū quod est post palatūi quo est uia cibi et anhelitus. quod a latinis faux seu fauces dicitur.

Hoc mēbrū uocatur etiā brōchiū seu brōchi ad similitudinē certi pitcis. et etiā uermis terrestris brōchiū dicitur. cuius corpus est oblōgū. cartilagineū seu squamosum et ānulare sicut ē uipa.

Guttur.

Guttur uere
q. id sit.
Armillę.

Epiglottis.
Larynx.
Nodus Gut
turo.
Brōchi
et
Gurgulio
et
Arteria
uocalis.
et
aspera
Arteria.
et
pulmonis
cāna.
et
larynx
a
findēdis
uocibus
ut
aliquibus
placet.
uel
a
fando
dicta.
et
Gar.
ganet
Gargateon.
sed
Larynx
ut
plurimū
ab
interprete
librorum
Gal.
de
util.
partū
i
latinā
linguā
capitur
pro
ip̃ius
parte
sup̃e.
ma.
cōinet
tamen
pars
inferior
dicitur
Trachea.
et
guttur
a
gar.
tien
so
dicta.
quia
inde
garritus
uenit.
et
Aula.
prima
primi
cap.
de
masculis
gutturis.
per
guttur
intelligit
hoc
mēbrū.
Sed
non
tertio.
per
guttur
intelligit
illud
spaciū
quod
est
post
palatūi
quo
est
uia
cibi
et
anhelitus.
quod
a
latinis
faux
seu
fauces
dicitur.

Huius membri una pars binas diuisa est partes a dextris una a sinistra a sinistris q̄ superiore pulmonis parte ingreditur: ab hinc per totā pulmonis substantiam semper minuēdo: per cētū ipsius usq; ad extremitatē sinistris partitur fibras: ad ipsum totū & ad cor ducendo & reducēdo spiritū suo mō quo patuit i pulmonis investigatione.

Hoc membrū nō ex una sola est cartilagine: sed ex pluribus coarctis exterius & coarctis interius: una iuxta aliā est aliquā distātia: ligamētis & pāniculis unitis aut mediātibz pāniculorū uillis qui sunt longitudinales: & suorū musculorū neruis: possit extendi & trahi i suis motibus: & est durū moderate & leue ut sit sonorus: & est sensu priuatus: ut testat ex trisecis lēdētibus: & est sphericū: quia est minus apertū lēdētē suę cartilaginis uersus Gulā in cōpletę sunt: ut sua duritie resiliant deglutitis: id cōplet tracheę cānalis posterior: a ligamentis & pāniculis p̄dictis: q̄ sua mollitię obediūt deglutitis: & pp hoc i necessitatibus gutturis coarctas: ita ipsam cōdētibus ipsius pāniculis seruit Gulę in buccellis magnis deglutitis: & Gutturis pāniculis facilliter obediūt i deglutionibus: quia hōrā anhelitus et deglutitiōis est diuersa: & nō solū gittur in hoc seruit Gulę: sed etiā Gula gutturi in anhelitu: quia tēpore anhelitus Gula est uacua: sicut guttur est uacūū spiritū deglutitiōis tēpore: q̄ in deglutionibus semper claudit epiglottis.

Gutturis ē ps posterior nō fuit cartilaginea: sed pānicularis ut humectaret facili: aliquid humidi bibēdo: uel libēdo: sicut sepe p̄tingit i magnis calōribz & i febribz: & ut etiā facilius p̄stentū educant materię i pectore: p̄tētē: sicut p̄stat i pleuritico morbo.

Et hoc membrū sagaciter fuit cartilagineū & pelliculare missū pp duo. Lpp sonū seu uocē: & pp anhelitū. Ideo seruit ipsi et uocē et nō est sonorū uersus Gulā: quia ibi est lene et quasi carneum: et ideo si tracheę et epiglottis nō sunt sicca decēter sed humida: fit rauco doctēte Galē libro de uoce et anhelitu: ut p̄stat ante postū: uel cibū liquidū: q̄ uox clara est et sonora: sumpto uero potu p Gulā humectate tracheę ipsi proximā et unitā: nō clara uox sed distinet si supflue hūmectet potu: uel teumate sit rauco doctēte: Et ideo senes pp hanc partē humiditatē rancē sūt: et corpora sicca clario rē et magis sonorā habēt uocē humidis: et si uiaq; uocis instrumēta apiātur: tūc subito multus exit. A et tūc iste est anhelitus: et si cōstringatur: cū anhelitu: ē aliquod audibile: diuersum diuersitate



istram etiā p̄stiterit: & si epiglottis p̄stingit: uox / si uero sola cīnat
 fiet quoddā: q̄ ē iter anhelitū & uocē: & hęc ē tuncedo: hęc Gal.

¶ Ex p̄dictis patet gutturis substātiā uasculis p̄nīculus interior est
 siccus solidus & durus: ut resistat catarrhis: & sc̄reatibus malis &
 uapori capnoso respirato a corde: & ut resistat motibus gutturis
 in uoce. Situs / figura / & colligantia / & numerus & iumenta
 gutturis: ac sua quātitas / sunt conspicabiles. Sua complexio est
 frigida & sicca. Passiones omnīū modorū patitur.

¶ De Capite Gutturis / quod Epiglottis dicitur.

Is p̄dictis ad sup̄remū Gutturis deuenio- huius mēbrī
 substātiā principalis est ex cathilaginis pluribus: ar-
 tificiose & magna diligētia inuicē cōiunctis: ex q̄bus resul-
 tat uox & uitę cōseruatio: has cathilagines inuicē ligāt mūsculis
 ligamēta & p̄nīculi tegētes totā trachēā itra & extra.

¶ Hoc mēbrū teste Gal. non est ex una sola cathilagine: sed ex
 pluribus dissimilibus figura & quātitate: ut merito numeri dila-
 tari possit & cōstringi p̄p̄ anhelitū & uocē. Ex suę cathilagines
 sunt ad minus quatuor: quāq; una nō ē pura cathilago: ideo au-
 thores cōmuniter ponūt in epiglottidī tres cathilagines: q̄ sunt
 purę: Prima pura cathilago est dicta p̄tralis seu sc̄utalis uel scu-
 riformis: quia formā gerit sc̄uti: ipsius cōuerum est ante uersus
 obcauū uero est cōuersum ad epiglottidis cētrū: sc̄ilicet ad uiam
 aeris: & hęc est aliis maior: quę a nobis ī ant̄erioti parte colli sub
 cute uidetur eminens notabiliter.

In epiglotti
 sunt quatuor
 cathilagine
 tres purę.

Sc̄utalis.

¶ Post sc̄utalē uersus Gulā seu Meri est secūda pura cathilago:
 quę nomine caret: nec a gręcis / nec a latinis nomen habet: &
 ideo uocatur cathilago innominata / seu nomen nō habēs: hęc
 secūda habet suā partē inferiōrē perfecti circuli: cū qua est retro:
 ante & a lateribus: unita cum sup̄remo circulo trachēę atterit: &
 uersus anterius est cū sua circulari parte sub sc̄utali similiter unita:
 & sc̄utalis habet duo additamēta notabilia: quibus amplectitur
 secūdas: itē dūg simul unitę cōponunt totū porū aeris circula-
 rē: ante: retro: & a lateribus totaliter cathilagines & durum.

Nomen non
 habet.

¶ Tertia cathilago etiā pura uocatur cōmuniter cymbalaris: &
 a Gal. uocat̄ Antyotica: q̄a est alligata itra cathilagīnē secūdā
 ipsius sup̄mo uersus porū aeris ī opposito ossis hyoidei. Hęc ter-
 tia est tanto minor secūda: quāto prima est maior secūda: & hęc

Cymbalaris
 Antyotica.
 Os hyoidei

carthilago iudicio meo nō est una sola / sed duę unitę taliter q̄ ut
dētur una sola: & hec gerit i sui apertione tūc ualuarti duę parul
libelli: quartū una clauditur uersus aliā: & opposito modo operan
tur in sui apertione: & hec carthilago quādo clauditur in suo sup̄e
riori: & etiā in inferiori: facit foramen latius q̄ in ipsius medio: &
tunc habet tale foramen: quale / seu qualia habet rubea in suis ex
tremis. Maius tamen superius / q̄ inferius: ideo Gal. dicebat oca
uo de iuuamentis / q̄ ad esse uocis oportebat epiglottida esse pri
mo amplā: deinde strictā: & deinde iterū ampliā: & quādo hec
clauditur obuiat scutali: & quādo aperitur suę partes seu sua la
teralia uersus carthilaginē nomen nō habentem.

¶ Supra has tres carthilagine est quarta. q̄ est corpus mēbrano
sum / carthilagineū & pingue / simile linguis fistulę / assimilāt ē
hedere folio & linguę humanę: & ideo Gale. ipsā uocat / glottida
uocatur etiā sublinguistis: hoc est principalissimū uocis organū
& glottis nō est mēbrū ex pura carthilagine / quia durū difficul
ter plicatur: nec ex pura mēbrana / quia in claudēdo duplicaret:
sed est cōposita ex mēbrana & carthilagine: propter decētē clau
surā: & in ipsa est etiā pinguedo / ne exsiccet / tū motu fere cōt
inuotum etiā spirando & respirando aerem exsiccatem: hoc mē
brum habet claudere epiglottida deglutionis tempore: Circa
latis etiā claudit: hec a retro / glottis uero antierius / taliter q̄
nec in uocantibus: nec in deglutionibus aliquid ingredi potest
pulmonis cānam nisi uolenter.

¶ Et epiglottis non est ex una carthilagine: sed ex pluribus ut
possit dilatarī & cōstringi in diuersitatibus uocum formandis: &
ideo natura dedit istis carthilaginibus & etiam gutturi musculos
seruētes / quos quatuor unū primā carthilaginei secundę: &
istorū duo sunt intra claudētes epiglottida: & duo extra.

¶ Sunt & alii quatuor qui ligant secundā cū tertiā. scilicet cimbala /
n / quorū duo sunt posterius: & isti apert Cymbalare ad postero
ra trahētes: & duo a lateribus ipsam etiā ad latera trahentes.

¶ Sunt duo alii musculi circa scutalem carthilaginē intra epi
glottida / qui claudunt cymbalarem.

¶ Sunt etiā intra epiglottida duo alii musculi circa radicē cimba
laris: claudētes etiā epiglottida: & isti. n. sunt p̄ptū carthilagini /
bus epiglottidis: nulli p̄tū a diacētū copula dicitur Gal. 7. de uti.

Stoma.
Sublinguist.



Epiglottidis
m. p̄ptū m.
suis.

¶ Glottis etiā habet unū par musculorū quibus mediātibz clau-
dit sup̄nū epiglottidis: & isti sunt fortiores aliis: teste Gal. viii. de
tuamētis: & isti relii sūt musculis pectoris: & aliis musculis ap̄le-
ribz epiglottida: & forte secundum aliquos q̄ isti sunt ultimi duo
immediate descripti.

¶ Ultra p̄dictos sunt etiā alii octo musculi: quorū duo sūt p̄til-
cāz pulmonis teste Galen libro de uoce & anhelitu: & isti sunt
in cānali gutturis: & istos Auc. dicit esse apud gulam.

¶ Est aliud par musculorū gutturi seruientes: non principaliter ta-
men: sed seruit etiam mēbris uicinis: & hoc par continuat tertiā
cartilaginem cum Gula.

¶ Et sunt duo alii gutturi seruientes: ad destructionē quoq̄ sit rau-
cedo. Et isto mō erūt. x. musculi seruientes epiglottidi & gutturi.

¶ Et hanc cōprehendit error aliquorū modernorū / qui credūt in
hacibus esse duos proprios musculos ip̄sis seruientes: putantes q̄
Auc. prima p̄tini de musculis gutturis: per guttur intelligeret fau-
ces: sic fecit nona tertiū: sed hoc negamus / quia faux nō est ali-
qd determinatū mēbrū: ut latius diximus i nostris sup̄ Mūdino
cōmētariis: Et iō recte iudicare intrēdētes nō cōfidāt i nobis: q̄
interpretēs de gr̄corū & de Arabico i latinū (sepe ignari) capiunt
unū palliū: & isto mō fere oēs scē dē sūt spūtiē interpretū uarietate.

¶ De Gula.

Ost Guttur inestigāda est Gula: q̄ locū gutturi p̄sternit
p̄ ante spinā rener: hęc a fauēbz p̄ collū & pectus cōri-
gua Aortę Arterię & sp̄nē septū trāuersum perforādo

ad uētriculū descēdinhęc gulā aliq̄ latini: ciborū ministrā & disp̄-
sitorē: Arabes Meti: gr̄ci Oesophagū: q̄si serēs comesta uocāt.

¶ Hoc mēbrū directe usq̄ ad quartū sphondylū pectoris inclusue
descēdit: deinde paulisp̄ obliquat ad dextrū cōdens locū Aortę
descēdēti: ne deglutita sp̄diāt Aorte motus: & cū est nō multū
dīstās a septo trāuerso: par subleuat: ne chylū cōprimat uenās
& ut melius firmetur pro substitutiōe p̄dictorū neruorū descē-
dētū: deinde iterū circa decimū sphondylū incipit obliquari ad si-
nistrum: & sic obliquata ad uentriculum descendit.

¶ Huius mēbri substantia carnea est & pellicu latis: longos attra-
ctōis seruientes habens in interiori panniculo uillos: aut oris &
labiorū terminatos: & latos in exteriori expulsiōis seruientes: ex

*Sublimi terr
uicis. Bann.
n. c. epiglotti
di sunt q̄.*



*Esoph.
Liborū minist
ter. p̄. m.
Oesophagus*

pulsionem ad inferius & etiā superius se cōtrahendo haurientes: illo modo uilli longi & lati iuuāt deglutionē: iuuāt etiā uomitu & secundum aliquos Gula etiā habet uillos obliques in tunica intrinseca uersus exterius: qui retinent/ sed ego credo q̄ expelāt se cōtrahēdo/ sicut faciūt musculi obliqui abdominis: & Gulę hęrent duo nerui descendētes a cerebro utrinq; unus, a quibus oriuntur tenerrimi. Dicti nerui uocis: Gulę ē pāniculus interior tegit linguā et omnia oris membra.



¶ Et Gulę pāniculus interior est densior in sui sūmo: q̄ in imo: et ibidē dēsiōr q̄ in uētriculo: et densior ī uētriculo q̄ in primo intestino/ quia materię digestę nō requiritur eque fortis resistentia in tactu: sicut indigestę: et hic pāniculus interior continuatur oritur attractio ciborū sit cōtinua: et hinc indicatur q̄ Gula est pars uētriculi cōtinua ipsi cū gradatione. Et epiglottis et oīa mēbra oris inuoluūtur a mēbrana intrinseca Gulę: teste Gal. ī libro de moribus liquidis. Tertia etiā cartilago Epiglottidis alligatur Gulę per duos musculos: teste eodem in libro de uoce et anelitu ob quā colligatiā in deglutionibus epiglottis ascēdit: et Gula descēdit/ dū ipsius uilli lōgi cōtrahūtur a faucibus uersus uētriculum: et cōcta a uētriculo uersus fauces Gula ascēdit/ et quā primum res deglutēda p̄transiit locū propriū Epiglottidis/ et relaxatis Gulę uillis/ Epiglottis subito descendendo ad pristinū locū: ad inuāibus Gulę obliques et latis uillis cū grauitate rei deglutēdę sit deglutio dicer aliter sentiāt aliqui. Epiglottidis etiā ascensus secundum aliquos iuuatur a uillis longis/ locatis in interiori mēbrana Gutturis/ qui alliganrur Gulę usq; ad oris extremum.

¶ Non motus
epiglottidis.



¶ Et sunt aliqui dicētes Epiglottida etiā ascēdere uolūtarię/ quā cū uolumus ascendit. et illo modo habebit ex motu uolūtario et naturali motū cōpositū. Aliter tñ sentit Gal. ī libro de moribus liquidis: tenēs q̄ tāntū naturaliter ascēdat epiglottis/ in culus ascēsu/ necessario musculi Glottidis trahūt ipsam ad inferiora: et forte nō uolūtarię mouētur tales musculi/ quia Epiglottis ascēdēdo attracta a uillis p̄dictis secū ducit glottida: sicut alias cartilagine. In culus ascensu necessario glottis deprimi/ quia est alligata suis propriis musculis/ qui sunt uniti cū sua parte inferiori uersus tracheā: et cū superiori ipsi glottidi: qui nō ascēdūt cū glottide/ et ideo ipsam ad inferiora trahūt: et illo modo etiam nō uoluntarie

semper in deglutionibus per ascensum epiglottidis clauditur glottis modo predicto: quo fit ne bibita & deglutita transcant ad gutturam in horam qua festinat deglutio anteq̃ cōpleatur ascensus epiglottidis: & tunc natura cū tuā expellit in cānam ingressa si potest. In historia. n. habetur q̃ Fabio prætori & Anacreōni poese contigit suffocatio: huius uue passē azino. Illi pīllo in lacte auisio. Clauditur tamen glottis uoluntarie a suis musculis: quando scilicet volumus retinere inspirationem & respirationem: & illo modo predicti musculi glottide ipsam claudunt interdum per se: & interdum per accidens.

Figura gulę est oblonga in superiori parte in faucibus dilata: ita ut tuba: & est non cānulata. Est enim tāq̃ intestinū: cuius orificium inferius uentriculo est cōiunctū: ubi notabilem habet sensum propter notabiles ramos nervorū a cerebro ad ipsum terminatos. Sua quantitas patet. Numero est unū mēbrū: colligat orī & epiglottidi firmissime: taliter q̃ est difficultate unū ab alio separatur. Colligatur etiā gutturi p totū: Cordi per arterias: hepati per uenas: & cerebro p p̃dictos nervos. Sua cōplexio idēit ad calidū nō excellēter: erga est ualde p̃icularis. Sua iuuamēta sunt ducere deglutita ad uentriculū: & multa superflua reducere ab ipso ad extra per os. Passiones omnium modorum patitur.

Qui cum diligentia cupit gutturis & gulę habere inuestigationem. p̃mo uideat ipsorū situm: incipiendo ab ima parte notando Gulam: & ascendendo notet cum gutture ipsius colligantiam: seu falce uel alio ingenio ab invicem sepando: itēq̃ prope epiglottida: notando musculos p̃dictos: aliquibus quorum uidebis nervos reuerſiuos alligari.

Visus musculis separet gulam in suo supremo ab epiglottidis: & notet ipsius cartilagine: notādo etiam situm ossis lambdę: quod cum duobus suis maioribus additamentis amplectitur cartilagine scutalem: & cum minoribus subſtinet linguam: uideatur deinde epiglottidis tres cartilagine p̃dictę: & quarta cartilago unita cum pinguedine & pellicula glottis dicta: quā mediā te sit epiglottidis clauso: scindat deinde lingua suas p̃dictas partes notādo: & hec sufficiant pro Anatomia mediū uentris: in quo sui p̃osius: & nō incongrue: quia hec discipulis traduntur.

DE Anatomia Ventris loquitur.

Venter superius.
Cephalus.
Caput qd fit
et vltimus.

Enter supremus nominatur caput: quia ibi sensus initium capiunt quod greci Cephalus dicunt: & caput de presenti sumitur pro eo toto quod collo subsistat: in quo continentur membra animata. Cerebri: de parte capitis anteriori facta est aliquarum partium (melioris ordinis gratia) inuestigatio.

Sinopse.
Occiput.
Tempora.
Aurium locus
intercaput.
Bregma.
Cremaster.
Cauda capitis.

Hic venter in homine insignis est propter ipsius contentum: qui habet partes communes & proprias. Communis alia est ante alia post alia lateralis alia superius alia inferius: Anterior sinopse posterior occiput laterales tempora & aurium locus dicitur: & superior dicitur intercaput / verrea & cacumen. Inferior vero dicitur basis capitis & membrorum suorum: An caput sit propter cerebrum vel oculos alibi diximus.

Cutis capitis

Partes proprie alie sunt continentes alie contente.

Continentes sunt omnes partes exteriores. Primo pilus: qui tamen non sunt numerandi in partibus capitis: nisi improprie: quia non sunt membra sed numerantur tamquam superfluitas aliquando utilis.

Pericranium.
Almocrium.
Sutura mater.
Circulus ossis
membrum.
Cauda Testa.
Cranium.
Dura mater.
Pia mater.

Secundo cutis: quae est grossa aequaliter carnea: ut in ipsa bene firmetur pilus: & ut sit scutum partibus sibi inferioribus.

Sub cute est diminuta caro vel nullae: excepta fronte & temporibus.

Post cutem & carnem est paniculus circumscribens totum os capituli: dictum grece pericranium & Arabice Almocrum: & ab aliis quibus xinzia mater: & circulus ossis membrum.

Post pericranium sequitur os capituli / calua & testa a latinis dictum: & grece cranium / siue cranium: quia durum.

Cetera sunt paniculus durus: & paniculus lenis: hic pia mater & secundum lile vero dura mater dicitur: & supra os in imo capitis in sua paniculi durum: multitudinis usus ponit Rete mirabile.

Intra predictos paniculos est substantia medullaris cerebri: cum suis uentibus glandulis uermibus: & nervis a cerebro ortis: pia mater & dura ab aliis ponitur inter continentes. Nasus vero & maxilla: aurium: pariter & oculi: & omnia membra faciei: ponuntur inter partes in capite contentas: non sunt tamen in ventre supremo contenta.

Capilli.

Capilli igitur sunt primo examinandi / qui generantur gratia materis: uaporosae eleuatur a toto ad caput: tamquam superfluitates propter calorem totius: & inde sunt pilus capitis / capilli dicti: gratia si

nis facti. quia sunt ad decorem : ut aliquibus placet : & ut tueatur caput ab extrinsecis multis.

Cutis capitis de se patet. hęc caret motu. nisi in fronte & tēp-
oribus. & ideo p̄statur musculis. paucū etiā habet sensum.

Exceriendo totā cutem a capite uidebis p̄niculū pteraneum. *Perianē.*
dictū. undiq; inuoluentē caput. sacrum ut dura mater suspēdatur
craneo per cōmissuras & per multos alios poros cranei. hic p̄ni-
culus est etiā ibidē. ne craneū obulet cuti & carni capitis sine me-
dio. & ut craneū ipso mediante sentiat. & ut huc p̄niculo inhe-
reant venę & arterię per exterius caput cibantes : & quę per cō-
missuras & alios poros intant & exeunt a capite.

Post istū p̄niculū est os cranei dictū. quod per totum a peri-
craneo detege. formā ipsius cōsiderādo. q̄ debet esse rorūda : ut
firmioris capacitatis & minus apta ledi. & est leuiter a lateribus
cōp̄ssa faciens p̄iorā ante. & puppim postat. sui uētes sunt lō-
gimeliū serulēres operationibus intellectus. & q̄libet forma de
utis ab ista est praua. & quāto plus distat ab ista ē deterior. Hoc
os nō est unū cōtinuū. nec durū. densum ut sunt multa alia. sed
rari. siringosum seu spongiosum. multū grossum. & cōmissu-
ris seu iuncturis aliquibus compositum.

Suę tamen iuncturę nō sunt nodatiles : sed serratiles. dentales
et squamose. quia nō mouētur. et craneū est tale ut iuncturę suę
sint firmiores. et ut si uni patri cōtingat leſionalē illeſe maneat :
et etiā ut ultus medicinę capiti pro cerebro leſo applicandę me-
lius suū imprimat effectū : et ut uapores eleuari a toto et a cete-
bris facilius exeant et reſoluantur. et ideo ipſius ſuprema pars est
tarior quacūq; alia parte. nec ibidem est ualde durū. quia cacu-
mini non accidit leſiō sicut alius partibus. bilioſus tamen Mars
omnia leſit. est etiā tale. ne grauaret corpus. est tamen in fron-
te groſſus. quia ē mollius ibidem. duas tamē habet partes : quas
aliqui uocāt tabulas. intra quas est uacuitas notabilis. ne grauet
corpus. et at inter illas sit aer implātatus ſuſcipiens odorem. et hęc
pars est mollior alia. quia ſuū contentū est mollius.

Os uero poſterius est durius. quia cōtētū poſterius est durius
est etiā durius os poſterius. quia oculi ſuo uſu nō poſſunt tueri
ipſum. est tñ groſſius et durius in lateribus. ut ſit ſonorū. quia ibi
dē intra ipſius ſubſtātiā debuit locari organum auditus.

*Craneū & ſua
bona forma.*

*Capitis ſchem-
ma ſunt dēta-
tes & q̄ quid*



Pars etiam huius ossis in occipitio collū uersus est dēsa, grossa, compacta & dura; & etiam lateraliter post aures, quia ibidē alligatur ceruicis cordē ualidē, quē magnos & fere cōtinuos habēt motus; & post aures sunt certę eminentię acutę & clauales & acule res dicendurę ualde quibus alligantur mūscoli in uultu mēbra oris & faciei ac collū mouentes, quę si molles essent p̄dictis motibus non resisterent.

*Eminentie
clauales & a/
colato sunt*

Et circa tempora hoc os est etiam durū / quia ibi sunt mūscoli magni mouentes mandibulas: & ideo omnia hęc ossa lateralia uersus posterius sunt dura ut petra; & petrosa dicuntur.

Os petrosa

Pars etiā inferior huius cranei dicta os basilare est dura, maxime in directo palati, ubi sunt nerui optici in crucis formā situati per quod ibidem perforatū ut cribrū descendit superfluitas humida aquosa cerebri; & hic locus cōmuniter dicitur colatoriu.

Colatiū uol

Hoc os basilare i sui supremo nō est planū sed inæquale / quod potest optime uideri in cluiteris / sicut & alię cranei partes; & etiam omnia totius corporis ossa / ad quę uidenda non accedat qui nō est legitimus medicus.

Numerū ossū totius capitis & noia commissurarū suarū optime dixi in cōmētariis super Mūdino. Ideo a multis narrādis breuitatis causa supledeo, maxime quia de ipsis scribētes nō coincidunt.

*frontis
Coronalis uol
cra uol.*

Pars huius ossis primo occurrēs est illa in qua sunt loca oculorū frons dicta, quę terminatur in prima iunctura serratili occurrētē; quę dicit coronalis, sic dicta, quia ut aliquibus placet ibidē cōtinatur Reges, uel forte, quia hęc cōmissura genit formā quasi arcualem, seu circulatē & coronalem, a summitate capitis descēdendo utitur usque ad angulos locorū oculorū qui sunt uersus aures.

*Commissura
lambdę.*

In opposito huius ossis est unū aliud os terminatū in iunctura serratili posita in capitis postrema parte, quę uocatur commissura lambdę, quia assimilatur illi litterę gręce quę libda uocatur, hęc commissura habet etiam formam arcus.

*Commissura
sagittalis.*

Inter has iuncturas est una alia cōmissura etiā serratilis in summitate capitis posita ab ante retro potrecta; & hęc uocatur sagittalis, quia recta incedit ab unaquaque p̄dictarū arcualiu iuncturatum a j illam, sicut stat sagitta ad arcum.

*Commissura
quadrata.*

Ad latera huius ossis supra duo ossa paria in partibus temporum sunt due iuncturę squamosę, utrinque una, quarum ossa in

seniora super equitant ossa superiora.

¶ Primę tres luncture uocantur nere per directũ intra cranium penetrantes & istę ultimę obliq penetrantes uocatur medolę.

¶ Inter istas cõmissuras laterales ascendēdo uersus sagittalem est etiã utrinq; una alia lunctura squamosa q̃ nō uidet nisi raro i ca pibus a tēpore maceratis uel in ultimare decoctis inter quas de sagittale sunt duo ossa (utrinq; unũ) rariora ceteris ossibus capi tis quę Gale; uocat ossa bregmaris & Autē. primā primũ uocat craneũ & locus ille ubi copulat iunctura coronalis cũ sagittali uocatur ab aliquibus Bregma & Zuendech: & capitis fontanella in qua os ultimare puenit cõcreuit & ibidē ponitur cauteria & ce/rata & alia localia pro catarrhis & multis aliis morbis: i aliis capi tis partibus sunt etiã multę alię luncture de quibus nō fit sermo: quia de ipsis Medici nō curant tantũ sicut de p̃dicatis.

Cõmissurę
oculta.

Ossa bregma
nec Craneũ.

Bregma.
Zuendech.
Capitis fontanella.

¶ Ex p̃dicatis patuit capitis situs: substantia & figura. Sua quãti/tas patet. Sua luuamēta & colligantia sunt pto parte dicta & di/cuntur. Numero est unũ. Numerus partium dictus est & etiã cõ/misurarũ cranei: quarũ tres sunt serratiles directe intra penetrã tegulę sunt squamosę obliq penetrantes. Sua cõplexio est cõple rio partium componētium ipsum. Passiones omniũ modorũ parti tur quę si sint in uelaminibus & in ipso cerebro: mala indicantur: plus & minus secundum locum & morbi qualitatem.

¶ De Dura Matre.

¶ Iis p̃dicatis ut cõmodius uideatur intra craneũ cõten/ uerari diuide caput a collo circa tertiu sphondylum inde loca craneũ supra aures parum (circum quaq; usq; ad in trisecam circūferentiam ipsius taliter ne lēdas duram matrem) semper seruando situm p̃dictum.

¶ Hoc facto eleua os totum superius locatũ a suo inferiori / cum aliquo eleuatorio apto de forti: quã undiq; alligatur firmissime dure matricem in cõmissuris q̃ in multis aliis ipsius poris.

¶ Eleuato craneo uidebis durã matrē etiã muringã dictam quę est p̃niculus satis grossus ñrueus & ualidus: est tamen porosus: ita cerebro ex eĩt uapores. Sua figura ē plana: extēla i circularē formã cõphēdens totã itra se cũ pla matre cerebri medullã.

¶ Itē i eleuand
do cranium.



Dura mater
muringa.

¶ Dura mater est a proa ad pupam per longum dup licata: & in ducto sagittalis cõmissurę penetrat per quãtitatē duarũ unciarũ

Inttra substantiâ cerebri/ dextrâ partem a sinistra diuidens : dupli-
cat etia posteriùs per latum/ diuidendo cerebrû posteriùs ab an-
teriori: hæc secûda duplicatio nō est inuicem alligata : ut alia pri-
ma / quia prima per ligamēta aliqua & per uenulas est inuicē cō-
iuncta : taliter q̄ in ipsa est uacuitas apta tenere intra se aliquid &
in ista uacuitate ab ante usq; retro sunt multę uene a quidez p̄-
dictis ascensę / quę ibidē a duplicatiōe prædicta cōpitiuntur : & cō-
pitię exprimūt sanguinē ad multos ipsarû ramulos: qui sunt cō-
tintui ramis pię matris nutrientibus cerebrum.

Lacuna.
Plata.
Fouea.
Palmentū.
Terna uena.

¶ Versus occiput i ista duplicatione est certa uacuitas uocata la-
cuna: & platearū & fouea tē palmentum/ in quam pars huius san-
guinis exprimit: & sere semper ibidē est sanguis aliquis/ propter
quem: Errophylus istâ lacunâ uocauit tertiam uenâ: quia hæc ua-
cuitas est oblonga ut uena: & alibi q̄ in uenis/ arteriis/ corde: & i
ista lacuna nō reperit sanguis sub forma sanguinis: & istam dupli-
cationem Aulic. uocat T orcular.

Torniat.

¶ Sua quantitas/ sinus/ colligantia: & complexio patent. Numero
est unus pāniculus/ sua iuuamēta ultra prædicta/ sunt uessire ce-
rebri cū pia matre/ secūdū longum latum: & profundū. ipsam
circuendo: & in ipsam ut supra patuit penetrando. iuuat etiā me-
diando iter os durū & piâ matrē satis mollem. iuuat etiā in sub-
stentādo uenas/ cerebrû & mēbra sibi uicina nutrientes. Passio-
nes omniū modorū patitur/ sua solutio notabilis / est praua.

¶ De Pia matre.

Pia mater.
Secūdina.

¶ Vb ista ē alia mēbrana tenuis subtilissimis arteriis & ue-
nis p totum iirecta/ imediate cerebro alligata/ dicta pia
mater & secūdina: quia nutrit cerebrû sicut secūdina foe-
tum : & iudicio meo in istis minimis arteriis ramis in pia matre
undiq; dispersis subtilatur & preparat sanguis seu spiritus ult-
lis/ ut in cerebrû substantia & in uētribus ipsius efficitur animalis
ut in cōmentariis super Mundino diximus.



Cerebri uer/
max mēbra

¶ Hęc mēbrana neruea & tenuis est/ & alligat durę matri in sum-
mitate ipsius a prora usq; ad puppim p multas uenulas/ & cū ali-
gbus uenulis alligat circa latera capitis: & ē alligata per totū sub-
stantie cerebrû/ quod nutrit: & secundum sensum duo uermes in
tra cerebrû uermes locati trahunt ottum a uenis & arteriis istis/ a
quibus defertur spiritus ad intra uentres: & etiā sanguis partes ce-

rebi intrinsecas nutriendis. In parietibus etiam ventris est aliqua portio p[ar]te matris / portans sanguinem & spiritū / sanguinem ad partes sibi vicinas nutriendas / spiritū vero pro animę operationi bus: sicut faciunt vermes antedicti.

¶ Ex prædictis sua substantia / figura / numerus / colligantia & situs patent: patet & quæritur: quæ nō solum cerebrū extra: sed etiam intra ventres: & in multis suis plicaturis seu anfractibus notabili / ter ingreditur: licet aliqui dicant in postremo vētre nō esse partem matrem propter ipsius substantię duritiem: nutritur tamen hæc pars: ideo habet venas aut prima / minores tamē. Sua cōplexio inata est frigida & sicca / iuuamēta parēt. Passiones omnium motorum paritur: quæ sunt deteriores q̃ in dura matre.

¶ De Medulla Cerebri.



Ost partem matrem occurrat Cerebri substantia medulla
p Improprie dicta: quia non nutrit: nec humectat ossa sibi
vicina: sicut aliorum ossium medullę / sed ossa capitis nu
triantur ut ipsam conseruent.

¶ Sua substantia est conspicabilis / mollior ante & superius / q̃ post
& inferius / quāritate excedit cerebri aliorū animalū quantitas: tū p[er] spiritū aialū multitudinē: tū ut sua cōplexione frigida & humida p[er] ratioē cōtēperet ipsos / qui a corde calidissimi veniunt.

Cerebrū maxi
mū i homine
& p[er] quid.

¶ Suus situs patet: & etiā figura / q̃ est talis supra: & per totam
qualis est forma cranei: habet tamē multas plicaturas manifestas
in primo aspectu: & etiā multas absconditas / quæ vidētur in ipsius
sectiōe: ita q̃ p[er] totū ingredit[ur] pia mater ipsi anexa. Sua colligā
tia ex p[re]dictis apparet: & apparet ex suorum nervorum cognitione.

¶ Numero est unū mēbru. Duas tamen habet partes / quæ non
sunt totaliter ab invicem sepatę: sed notabiliter unitę.

¶ Vna pars notabiliter in magnitudine aliā excedēs: est ab ante
usq[ue] tetro replēs totā cōcavitatē cranei: ante & in medio a sūmo
usq[ue] ad imū: & tetro replet tantū partē sup[er]iōrē cranei: etiā i dire
cto maioris p[ar]tis ossis lambdę: & hæc p[ar]s vocat[ur] cerebrū anterius.

Cerebrum an
terius.
Cerebrum po
sterius.

¶ Alia pars longe minor prima cerebellū ab Aristo. dicta: & pri
ma solidior replet capitis posteriorem & inferiorem partem: & hæc
suum suum habet i postremo capitis sub parte prima antedicta
in hac tamen parte cerebri posteriotē cerebellum dicta: non est
aliqua concavitas seu ventriculus: ut notant multi: est bene tecta

circūquaq; a dura & pia matre / & sensus hęc omnia mōstrat. Pri-
ma pars ante dicta diuisa est notabiliter a dura & pia matre in
duas partes secundū capitis longū in dextrā .i. & sinistrā partē
ut sua substantia & sui uentres sint distincti & duplicati.

¶ Primo igitur in altero laterē talis duplicationis / cū rāsio dis-
tinger moue (lateraliter secundū superius & inferius) p̄tā manē
simul cum notabili quātitate cerebri descendendo per tres digi-
tos plus & minus secundū q̄ inueniēs ipsius uentriculos.

¶ In quolibet .n. latere talis duplicationis reperies unam notabi-
lem uacuitatē q̄ uentriculus est dicta / quē ē per longū potrecta
aliqua lītēr obliquatā uētiūs posterius lateraliter descendens.

¶ Viso uno latere : uidē & aliud : in quo eidebīs idem ubiq; sicut
in antedicto : & hī uētres sunt diuisi a substantia cerebri : ut si cōtin-
gat uni parti nocumētū ne cōtingat alteri : & operationes unius
partis talium uentriū sūt similes alteri sibi parti.

¶ In isto uētriculo utrinq; circa basim est una substantia pellica-
laris rubea / uermis dicta / ex uenis & arteriis cōposita / q̄ ab uno
extremo ad aliud cuiuslibet uētriculi tendit / q̄ motū habet secū-
dum aliquos agiens & claudēs uentriculos uoluntarie.

¶ Infra tales uermes ad ipsorū latera est certa pars cerebri emi-
nens / quā multi assimilant naribus humanis in figura / q̄ in eleu-
gatione pariter & clausione uentriū se cōtangit / in a breuiatione
uētiō & dilatatione ipsorū ab inuicē separatur.

¶ In istis uentriculis antedictis cōmuniter in parte ipsorū ante-
riori ponitur phantasia / sensus cōmonis & imaginaria.

¶ Visis p̄dictis moue notabilem cerebri medullę partem : ut
diligenius uideātur alię cerebri uacuitates : notando in basi an-
teriori p̄dictarū duarū uacuitatū unum foramen / quod est cōc
p̄dictis uacuitatibus / per quod spiritus ad alios uentres rēdit
& etiā aliq̄e humiditates in ipsis contentę descendēdo exeunt
ad certā uacuitatē rēdentem uersus os basilare circa locū ubi est
certa caro glandosa sub incrustatione netuorum opricotum.

¶ Hęc uacuitas uocat a Mundino lacuna / ab Aulic. caput rose :
& ab aliis Embotū / quia est lata superius / strica inferius / undiq;
circūdata a p̄niculo tentū usq; ad os basilare : & p̄ istud Embotū
(ad p̄dictū os ibidē ut cribrū subtilissimis poris perforatum)
euacuātur ut plurimum humiditates superflue cerebri / quę po-

Duo uentres
in cerebro.

Uermes cere-
bri ubi sunt.

Uentres in cere-
bro.



Lacuna Mundini
Embotū.
Caput rose
Embotū.

ita in anfractibus multis ossis basilaris supra os palati locatis in
grossantur ab aere p nates attracto: & ē a calore naturali: & de/
mū extra mittūtur per nates & os mediāribus faucibus in ea for/
ma quę omnibus nota est: propter diuersas causas diuersam ha/
bens substantiā: colorem: quātitatē et figuram: ex prædictis pa/
tent cerebri iuamenta: quę tamen alia sunt ab Aristō. & alia a
Galen a sequacibus: quos uide. Passiones omniū modorū pari/
tursia solutio est igitalis: non semper sed ut plurimum.



¶ Iuxta illud Embotū uersus posterius etiā sub uentre seu uentri/
bus antedictis: certa uacuitas oblōga aequaliter / cuius parietes
sunt sicut nates antedictę: quę claudunt & aperiunt talem uacui/
tatē quādo opus est: uel a motu prædictorū uermis: qui in media/
tesunt supra ipsas: uel alio motu a spiritibus facto.

¶ Et istam uacuitatem cōmuniter Authores ponunt pro uen/
triculo medio: in quo dicunt esse uirtutem cogitatiuam.

*Uentriculus
medius secundum
dū eodem opō
monon.*

¶ In posteriori parte huius mediū uentriculi est foramen paruum:
quod tendit ad unam aliam uacuitatem / quę descendendo est
uersus locum ubi est principium nuchę: et hęc uacuitas non est
in cerebello antedicto ut putant multi: nec est circūdata undiq;
a substantia medullari cerebri: sed est inter posterius et anterius
cerebrum sita: circūdata notabiliter uersus cerebellum a pia ma/
tre ipsam regente.



¶ Et inter istam ultimam uacuitatem et uentriculum medium
antedictum est certa caro glandosa conarium dicta: quia est in
forma conii siue pini: hęc glandula ibidem sustentat multas ue/
nas pē matris: ascendentes uersus cerebri centrū / ut ipsum nu/
triant: et hęc glandula transcolat multas humiditates ad mediū
uentriculum antedictum: a quo ad embotum prædictū et inde
ut supra patuit: expurgantur.

*Caro glando
sa conarium di
cta.*

¶ In ista uacuitate ultimo loco dicta: quę est post medium uen/
triculū: dicta uentriculus posterior: Authores cōmuniter ponūt
uirtutem memoratiuam. Ego autem aliter sentio.

*Uentriculus
posterior secundum
dū eodem opō
monon.*



¶ Et dico primo uirtutem apphensiuā: cogitatiuā: et memorati
uā esse in primis duabus cōcauitatibus pro anteriori uentriculo
positis: tam in parte dextra q̄ in sinistra: et apphēsiua seu sensus
cōmunis est in parte ipsius anteriori: et cogitatiua in medio: in
posteriori uero diuisa est memoratiua.





De organo
etc.

Et dico uentriculū antedictum / quem auctores ponunt pro
medio uentriculo non esse pro cogitativa / sed est uia pro exur/
gatione superfluitatum multarū cerebri & pro defendendis spiri/
tibus ad certum antedictum uentriculū / qui spiritus non ser/
uunt uirtuti memoratiue / sed uirtuti motiue & sensitiue / qui ue/
niunt a primo uentriculo antedicto / sensui cōmuni sentientes &
hinc comprehenditur q. nuca uirtualliter habet ortū a parte an/
teriori cerebri / ut etiam nuca substantialiter oritur a parte an/
teriori cerebri / tum ex ipsius colore / tum etiam ex cōtinatione
quę tamen ē etiam cōtinua cerebello posterius locato / maiorem
directionem tamen & etiam colligantiam habet cum cerebello
cum cerebello p̄dicto. Hęc tamen melius & ubertius diximus
in cōmentariis super Mundino. Sed ut p̄dicta melius intelli/
gantur quales poni hic inferius duas accomodauī cerebri figu/
ras / in quibus aliqua ex p̄narratis cōphendi possunt ut uidet.



Clēs in hoc
 pōuit figurā
 dūriūm in
 parum a cōre
 bōpōmū m
 dūmū pōm
 ad pūpū tēg
 tū pū mām
 vū vū dū / In
 stōrā bō pē
 i cōrē mōdū
 lūcū nōtūbī
 bō cōcōmū
 fūmū mōdū
 sū pū rōnō
 i mūlū cōrē
 bō mōdū /
 q bōbū p al
 tōrū pūmū vū
 tū dūmōpū
 mōdū bōcū / In
 mōdū cōmū
 ē vērū dūmū
 lūcū fūmū
 mōdū / In hoc
 cū figurā
 mōdū cōrē
 bōmū dūmū
 ē mōdū cōrē
 vūmū mōdū
 dū ē pōmū

e' in bac fedi
 da figura viri
 a beatis qui
 a finibus de
 no modeste
 corbo habes
 bono pff'v'
 tres divinos
 e' in vltimo
 possit esse
 hodi epema
 figura de no
 tate / e' inter
 f' et embu
 c'omp'et'as
 me l'as e' po
 b'oris va m'
 dris de tois
 f'no pol'ge

DE ANATOMIA

De Nervis a Cerebro ortis.

Septem pars
nervorum.

Nervus.
Nervus.

p

Osti p̄dicta sunt vidēdi nervi a cerebro ortiq; sunt cōter
septē pars/de quolibet partē est utrinq; unus/similis suo
sortio. Nervus a gr̄ce neuron dicitur: est membrum cō
simile/album/substantia viscosum/figura oblongum & rotūdū/
ad separā dum tenax & durum/sensus & motus organum:& p̄
sensitivū sunt molliores & frigidiōres motuū.

Cariculae
mamillares.



Nervi optici
visus.

Eleua igitur leuiter cerebrū a parte anteriori incipendo:& in
uenies in directo superioris partis nasi duas substantias albas oblo/
gas (utrinq; unā) herētes p̄e matri/quartū capita sunt aliquāto
lū grossa/q; a multis uocātur cariculę mamillares:& sunt instru
mēta sensus odoratus/quas Galenō uocat nervos:quia sunt mol
les/in directo ipsarū p̄mculi cerebri & os frōtis sunt perforati ut
cribrū:ū p̄p odores/nō p̄p subtilitates cerebri expurgādas i ne
cessitatibus:quę ut plurimū expurgātur p̄ colatorū: qđ est in di
recto embori antedictę sibi ante i craneo ē certa uacuitas ueta
bilis aere ut plurimū repleta/in quo aere secundū aliquos ab istis
cariculis primo percipitur sensus odoris.

Post cariculas p̄dictas:uidebis duos magnos nervos:qui ser
uiunt oculis pro usu:& hi uidentur incruentari de hoc tamen ad
huc sub iudice lis est.et hi uocā optici seu uisus:q; secundū aliquos
sūt cōcaui seu p̄forati:hoc tñ negat sensus in mortuo animali.

Post istos est unum par nervorum / quod ponitur pro secun/
do parte:& hi dant motum oculis.

Nervi p̄ mo
tu oculorū.
Cūde onis
nervi vocat

Post istos est tertiu parquod paulisper unitur quarto / a quo
postea separatur:& descendendo spargitur per faciem:& intra &
infra os basilare unitur cum sexto pari nunc dicēdo:& simul fa
ciunt nervos p̄dictos descendentes ad membra ventris medil
& inferioris:& ab istis oriuntur reuersui.

Nervi gustus

Postea sunt nervi quarti paris descēdētes ad palatū p̄ sensu gu
stus:& hi sunt subtilēstis q; tñ capiūt tertiu par p̄ quarto:& ecō
tra/sicut diximus i cōmētariis:& ibidē dixim⁹ cām talis erroris.

Nervi auditus.

Est deinde quintum par quod utrinq; difeminatur intra os ba
silare in directo aurum:& serui sensui auditus.

Nervi e septi
mū par ner
uop ardra.

Postea ē sextū parquod miscet tertio ut p̄dictū est:postea est
septimū parquod qđ obliquū ē:dat motū linguę:& etiā aligba
musculis epiglottidi seruientibus:dat et sensū gustus ipsi linguę.

E Horū nervorū subtilitas est oibus nota: sunt tñ posteriores an-
terioribus duriores: quia pars cerebri posterior est durior antero-
re/ pp sensus iteriores. Sua figura/ quantitas/ situs/ numerus et col-
ligatio patent. A cōplexione nō sunt multū sicci: et ideo nō habēt
fortes motus: et sunt frigidi natura. Iuamēta sua etiam patent.
Passiones omniū modorū pariūtur/ quę oēs sunt prauę propter
colligantiam suā cū cerebro & propter suas operationes.

*Tenui posse/
motus sunt ex
tremo diano-
ntion.*

¶ De Rete Mirabili secūdū cōem opinionē:

et aliquid de Nucha.

Illis pōictis deponē totū cerebrū cū illa portio de Nuchę:
u q̄ est inter spondylos: quos scāssi et cum capite seruāssi:
prius ip̄ius notādo sitū/ subtilitātē/ numerū/ et figurā/ sua
colligatiō cū cerebro est dicta sup̄ius. Quātitas ip̄ius et alia ip̄i
requita melius notabūtur ex dicēdis: si cuius initio iuxta cerebrū
est certa naciuitas cōtinua naciuitati cōiter posita pro uentriculo
memoratiue uirtutis/ p quā trāseūt ad suos nervos spiritus a ce-
rebro missi pro sensu et motu. Et Nucha (sicut et cerebrū) uelut
a dura et a pia matre/ ut sensus demonstrat.

Nucha.

*Nucha uelut
a dura et pia
matre.*

**¶ Illis notatis sup ē sola dura mater: q̄a remouendo cerebrū re-
mouet et pia mater/ pp ip̄os iulcem firmā et cōtinuā colligatiā.**

**¶ Inter durā matrē et os basilare in regione i crurialationis neruo/
rū opticoŕū ubi est collatoriū antedictū/ ascēdunt p os basilare
duę notabiles arterię: una ē a dextris alia a sinistris: ut supra pa-
tuit in cap. de Aorta ascēdēte/ a quibus ut dicūt cōmuniter Au-
thores supra os immediate sub dura matre efficiūtur multi subri-
lissimi ramis: ut cō mirabiliter unus supra altū uniti instar retis:
occupantes ante/ retro et a lateribus magnū locum. Deinde ex
istis multis ramis iterū enascūtur duę arterię similes ptimis/ a qui-
bus efficiūtur p̄dicti parui rami: et hę duę uenę postea iterum
factę magnę supra craneū ascēdunt ramificate usq̄ ad ventres ce-
tebri: ip̄is portando spiritus subtiliatos in isto Rete mirabili.**

*Rete mirabi-
le secūdū opi-
nionē cōm.*

**¶ Et iuxta istud Rete aliqui dicunt esse duas glāndulas ip̄sum sub-
sistentē: et dicūt iuamēta istius Retis esse: ut ibidem causetur
spiritus uitalis subtilis: ut melius ad minima diuisus alteretur:
et efficiat ur animalis: et forte ut ex uaporibus a cibo eleuatis: et a
cerebro condensatis inferius cadentibus: sui minimi rami facilius
oppulentur: et somnū causent.**

*Iuamēta re-
tis mirabilis.*

Est id in Rete ego nūq̃ uidē credo naturā nō opari per pla/
ta id quod pōt p pauciora / sed natura pōt subtiliare hos spiritus
in minimis ramis arteriarū ascēdentū supra durā matrē hęcusq̃
osū basilariē per piā matrē usq̃ ad cerebri centrū ascēdētē set
go nō datur ibidē inter durā matrē & os basilare hoc Rete / mol
tas alias rationes super hoc dixi in cōmētariis super Mūdino / ad
quos breuitatis causa remitto legentes / inter alias rationes ex
perientia sensualis est mihi Autigauē si datur hoc Rete est supra
durā matrem imēdiare infra cerebri medullā ex q̃bus arteriis mi/
nimis ibidē sit certa mēbrana continua & similis pię matri / in ra/
mis cuius subtiliaē spiritus vitalis & sit animalis : & sic subcellatus
trāsit ad uētres / mediātibz p parte uermibus cerebri añ dicitis

De Naso.

Isis p̃dictis occurreret sermo de osse basilari / sed quia
ip̃sius anatomia / maxime de suaz partiū numeroz ab au
thoribus ponit diuersa / & etiā quia hoc os melius specu
lat i cōmētariis / q̃ i cōi sectiōe. Ideo de ip̃so sermonē p̃tingome
mittēdo hui⁹ artis cupidos ad cōmētaria nostra / & ad cōmētaria

Edicamus ergo aliquid de naso / q̃ de p̃senti capis pro parte illa
p̃cipua emīnē / q̃ a sup̃eliorē cētro equali porrecta iugo utrāq̃
aciem discernit & munithulus mēbri partes inferiores laterales
Gal. uocat alaria / aliter alulę dicūtur / sua pars sup̃ior ab aliq̃bus
dicitur lepor & summū nās / inferior etiā lepor & imū nās / pars
media exterior ē dicta colūna / & ip̃sius interna pars diuidēs dex
trā partē a sinistra uocatur diaphragma / septū porrectū / interū
niū nās / & aliquid uocāt nās inferiora foramina nates / & uia a nās
bus p̃ supra palatū ad fauces ab Aui. quinta tertiū uocatur Cla
lasm / sed de p̃senti a nobis cauernositates supra palatū in osse
basilari locatę nates uocātur / in quibus sup̃fluitas cerebri humi/
da trāscolarā ingrossatur / de qua aliquid diximus supra.

ENās substantia est ex cuti / musculis / cartilaginibus / & ossibus
& p̃ncipulo regente ossa sua . Sua cutis est taliter musculis eius
unita / q̃ separari nequit / nisi difficulter . Sua pars anterior & inferior
est cartilaginea / superior uero ossifera . Sui musculi sunt duo par/
ui : dum tamen unus est a dextris / alter a sinistris uersus inferius
magis / quia ambo oriuntur a p̃ncipis mandibularum / & mouent
alas nasi ad quam partem uult homo.



Nasus.

Alaria.
Nasus.
Lepor.
Colūna.
Diaphragma.
ma.
Septū poru
mū Inferiū
Nates.
Clas.
Nasus.

Nasus.

¶ Post musculos sunt tres cartilaginee/ una in medioſq̃ duæ/ *Cartilaginee*
terales : quæ ſunt molliores media / quæ dura eſt ſatis. ut teneat
naſum (quem diuidit intra per medium) rectû & firmum.

¶ Oſſa naſi ſunt duo triângulata : ſiñti cõtigua. verſus angulos la *Oſſa naſi.*
chrymaꝝ pforata foraminibus parvis : a quibus humiditates i oculoſq̃
ab oculis in naſum : & a naſo in ore penetrare poſſunt : & p
hoc guſtatur ſapor medicinarû poſitaꝝ in oculis a lingua.

¶ Eros frontis in directo naſi eſt perforatû ut cribrum : ut ſeruiat
pro odore : & ut p ipſa foramina exeant humiditates ſuæ ſuæ a ce
rebroſtrâſeûdo prius p foramina q̃ ſunt in ſuis pânicleis circa ca
rîcularum mamillarum loca.

¶ Ex prædictis uſa eſt naſi ſubſtantia : Numero eſt unû mēbrum :
diuiſum tamen in duas partes ad interiuſur ſi una pars ledatur
altera ſirma ſit : ſua figura/ quantitas/ ſitus & colligantia patent.
Sua complexio ponitur frigida & ſicca. Sua iuuamenta ſunt ad
decorem & ad ducēdû & reducēdû aerem ad pulmonē : ductit
etiam materiam/ per colatoriu ad cauernas ante dictas miſſam/ *Colatoriu*
extra ſe/ quæ cauernæ dicuntur de præſenti nares.

¶ Paſſiones omnium modorum patiuntur : & ſua ſolutio facili/
ter cõſolidat / in ſui inferiori extremo interdû applicatur ſanguis
ſuæ ad ſepharî et ad id genus/ Sua ptopria paſſio ē leſio uirtutis
odoratusq̃ ipſi poteſt cõtingere principaliter ppter oppilationē
factâ in foraminibus exiſtētibz in oſſe baſilari i directo prædicta
rum carîcularum mamillarum.

¶ De Palpebris.

Alpebræ a palpitâdo genē etiâ dictæ/ ſunt pellicule oculoſ
p los & gētes oibus noſq̃. Sua ſubſtãtia ē ex cartilagine
& mēbrana / cū minima & ſorte ut aliquibus placet : cū
nulla parte carnea : exceptis ipſaq̃ muſculis : & ē cartilaginea ut
i ipſa pili liganturq̃ ſtât recte : dura ut melius tueat̃ oculos i di
citur ciliata celandis oculis eſt etiâ cartilaginea/ quia melius re
ſiſtit extrinſeciſ : & ut ſit erecta qñ apit̃/ quia ſi eſſet pellicularis :
deprimereſ faciliter : & cute tegitur propter tutelâ & decorem.

¶ In ſuperioribus palpebris ſub cute ſua : eſt mēbrana a pieranlo
ortasq̃ intra ſelectiſ ſuam inuoluens cartilaginem extra & intra
uſq̃ ad tunicâ corneâ cõiunctiua mediâ re regente muſculos oculoſ
li : & in inferioribus ſimili modo eſt mēbrana orta a mēbrana

Palpebræ.
Sens.

Ciliæ mēbr.

pomori faciei ossa tegere: & isto modo uidetur quod cōiunctura tunica oriarur etiā a pāniculo tegēte ossa inferiōra faciei in multis tñ individuis ē aliqua caro/cū aliquibus uenarū fibris immediate super praepdictū pāniculū/que palpebra inuerſa/ſenſui patent a quibus uenis aliis cauīs eodiuuātibus/ſit in oculorū angula/ & ſebeli & uerucarū genus: & alii aliqui oculorum morbi.

Tarſum.

¶ Circa iſtā cartilaginē quā Gal. uocat Tarſum: eſt aliqua plin/guedo humectās palpebras neceſſitatis cōme exſiccēſ pp motū ſuū ſere cōtinuū: Supiores ſolē mouētur/ inferiores uero minime.

¶ Et utriusq; ſuus motus eſt ex tribus muſculis teſte Auic. quorū unus apertus eſt in medio palpebre/ duo uero alii ſunt in angulis oculorū/ qui claudūt: Gal. tamen. x. de uſil. cap. 9. nō uidetur ponere niſi duos muſculos/ quorū unus dicitur eē in angulo uerſus autem/ quem dicit apertū/ ſi ſolus moueatur/ & alius in angulo naſi/ quem dicit claudere/ ſi etiam ſolus moueatur: & ſi ambo equaliter mouentur/ non magis palpebra claudūt q̄ aperiūt: & hęc ſemi clauſio uocatur ab Hipp. curua palpebra/ quē inſert in morbis malū in duriū: & etiā Gal. ibidē cap. x. dicit q̄ nō q̄ cognouit muſculū p̄dictū ad angulū naſi locatū/ quia uidit ibidē magna applicatū cautēria propter ſiſtulas: & tamen adhuc remāſit motus in palpebris/ qui nō remanſiſſet/ ſi eſſet ibi muſculus.

¶ Et aſſerit. at. de uſil. cap. 14. q̄ cutis muſculoſa frōtis: & pomori faciei ſuo motu ſufficit ad clauſionē & apertionē palpebrarū: & alii addūt cū iuuenēto muſculos. Aſſerit. tñ ſecūdo q̄ partibus aialū. c. 15. dicit palpebras moueri nō uolūtarie/ ſed naturę inſtinctum/ ibi tñ uidet. q̄ habet motū propriū & cōem: cōis ē a motu frontis & pomorū faciei/ proprius uero eſt a ſuis p̄p̄iis muſculis/ qui habēt ſuos neruos annexos palpebris & muſculo mouēte frontē: & muſculis rēporalibus & pomorū faciei/ utriū aſt iſti nerui ueniūt a nucha/ an a cerebro ſenſu nō percipiūt. Inquit tamen Auic. quod in ſola palpebra ſup̄iore ſunt muſculi/ quia ſunt propinquiores ſuo principio. ſc. cerebro/ qui ſunt parui: & alii dicūt ipſos eſſe ſine cordis/ de ſitu quorū alii inter ſe ſunt diſcordes.

¶ Et palpebre inferiores teſte Auic. nō mouentur: quia motus ſuperiorū ſufficit ad p̄fectā clauſionē & apertionē ipſarū/ ad inſiſcē & inferiores ſunt minores ſuperioribus: & oculis magis cōiuncte/ ne pp magnitudinē & ſepationē ipſarū ab oculis/ aggregarent in ſe



Curua palpebra.



lipitodinem: & lachrymas: & alia extranea: teste Gal. x. de util.

¶ In substantia palpebrarū i quolibet angulo: seu cātho neruus na-
sum: sunt duo foramina parua sensibus manifestarunt in supiore
palpebra: aliud in inferiore: p quē exēit lachryma: & i isto angulo
sunt carnes spōgiose: q̄ ita se tenēt talē humiditatē lachrymae:
ut humectēt mēbra sibi uicina: ne exsiccent: & tales humiditates
herdū ueniūt a naso: & etiā a cerebro p uenas suōs pāniculorū.

¶ Situs palpebrarū: numerus: quātitas: figura: & colligantia pa-
rēt: substantia ē tacta. Sua cōplexio ponit frigida & siccatiuamē-
ta sua sunt tueri oculos a minutis & lenibus. Oſia uero adiacētia
tuetur ipſos a magnis & duris: & iouāt in ſomno siēd oculi pili: u/
uāt etiā oculos ne i palpebris aptis puluis & alia minuta iſos iſe/
dāt: & sua nigredine corroborāt uisum: & nō sunt ualde spīsi: ne
obſcūret uisū: nec nimis rariāt phibeāt minuta ſitate ad oculos.

¶ Paſſiones omnīū modorū patiūtur: & inter alias patiūtur ſuorū
piloꝝ inuersionē: q̄ curatur cauterizādo quēlibet pilū inuerſum
in ſua radice cū acu aurea: poſtea curāt ut alla loca cauterizata.

¶ De Anatomia oculorū.

Iſis palpebris occurrūt oculi ab occultādo dicti. Occultā-
tur. Inter palpebras: ad quos uidēdos ſcinde ptimo os
frontis in directo iſforū: taliter ut ſaltem alterū corū ul/
deas modo infra dicendū: notādo ptimo neruū ſuū qui opticus
eſt dictus: qui perforādo iſpius tunicas: uerſus centrū iſpius ten-
dit: & iter cōiunctiū & Sclerotica ē notabilis pinguedo: & caro
glandoſa: ſuſcipiens humiditates: ſicut facit caro glandoſa radicis
linguē: quas extra riuat: interdū per naſum: & per foramina quē
sunt in palpebris ante dicta: quibus mediātibz: tam pinguedi-
ne q̄ humiditatibus: ſeruantur oculi ab exſiccatione.

¶ Ibidē ſunt etiā ſui ppti muſculi: q̄ ſunt ſeptē: quorū unus mo-
uet ſuſum: alter deorſum: & unus alius dextrorſum: & alter ſini-
ſtrorſum: & duo trāſuerſaliter tēdētes mouēt circulariter: ſeptimus
uero ē ppe neruū opticū: quē ſuſtinet: & eleuat: & iſpum tuel a
laxitate: dū oculi firmātur i ſultu cōtinuo: & ideo hic ſolus ſumat
oculū: iſtū muſculū aliqui dicūt eē duplicatū: & aliqui triplicatū
& hi oēs muſculi hñt ſuos neruos a ſecūdo pari neruorū: cerebri.

¶ Viſi p̄dictis ſepara muſculos: pinguedinē p̄dictā: ſimul &
carnem glandoſam a ſuis pelliculis: quē ſunt realiter quatuor. Po-

*Angulus.
Lachryma.*



*Cura ditionis
inuerſi.*



Oculi uide.

*Neruus opti-
cus.*

*Coniunctio
Sclerotica
Pinguedo.
Caro glandoſa.*

*Muſculi oculi
ſuū.*

*Centus: ſi/
mura.*

Septem tunicis

nuntur tñ cõlter septem/ quia differunt aliquantulò subilitatib/ situi colore/ figura/ quantitate et complexionè/ colligantia tamen nõ differunt. Differunt etiam aliquantulò in iuuamentis.

*Membrane.
Oculi tñ
tres humores*

C In istis pelliculis/ q̃ mēbranę et oculorum tunice vocatur/ sunt tres humores/ aliqui tñ a dñt quartũ/ quẽ ethereum vocant.

*Quarta hu/
moris.
Continua
videt.
Paniculo
circi ossalia.*

Tunicarũ igitur istarũ primo ante incipiendo/ occurrit cõiun/ ctua/ sic dicta/ quia coniungit oculũ capiti/ et hæc oritur a pira neo/ et a pāniculo circi ossalia/ tegente inferiõta faciei ossa/ et a pel lica intrinseca palpebrarũ/ orta a p̃dictis pāniculis/ et hi pānicu li et tegunt orbitas oculorũ/ et hæc sola est vere una tunica.

*Cornea ubi e
videt.*

Ista cõiunctua tamen nõ tegit antetortũ oculũ/ sed in loco ubi ipsa deficit ante oculũ in medio/ est secunda tunica/ quẽ quia dia phanes est ut cornu/ cornea nominatur/ hæc secũdũ aliquos qua tuor habet tunicas subiles/ ut cõpertũ est in suis ulceribus.

Huic corneę uersus posterius est continua una tunica nõ lud/ da/ sed opaca et dura. Ideo Sclerotica dicitur/ quẽ posterius tegit totũ oculũ. Hęc tñ est maior corneę/ et istę duę ab aliquibus po/ nuntur pro una/ solum propter colligatĩ/ quia ambę per cõtinua tionẽ unius ad alterã iunguntur seu alligantur duę in unũ.

*Sclerotica.
Cura.
Coronoides.
Foraminis
pupilla.*

Post istas etiã ante incipiendo/ est una tunica dicta uene/ et coro noides/ foraminis/ quia ẽ perforata sicut coronas/ et sicut gra num unę/ quãdo remouetur a suo suspensorio seu racemo/ et hui foramen uocatur pupilla. Suis color est uariis/ sed sepe niger et Iridialis/ seu Lazuleus/ uel Ceruleus.

Huic uersus posterius cõtinua/ una tunica/ quẽ est fere similis magnitudinis/ qualis est uene/ et etiã eiusdẽ coloris/ et hæc uocat secũdina/ quia ipsa et ẽt uene oriũ/ a pia matre secũdina dicta/ uel ut aliq̃ placet/ hæc secũdina nutrit oculũ/ sicut secũdina foetũ.

*Secũdina e
videt.*

Post istas tunicas sunt duę alię tunice etiã simul continuę/ una antetortũ/ alia posterius/ q̃ est longe maior antetortũ/ antetortũ uo/ catut Aranea/ posterior Retina/ Aranea est subtilis dẽsa tamen/ lucidior adamantina gẽma/ Retina etiã est subtilis/ sed nõ lucida ut Aranea/ et Retina pro parte hetet secũdina.

*Aranea.
Retina.*

*Humores
tres.
Crystallinus
humor.*

Inter has ultimas sunt duo humores. Vitreus et crystallinus/ vitreus est posterius et lateralis/ sic dictus quia assimilaf uitro lique facto/ in parte cuius anteriori locatur humor crystallinus/ sicut lo cata est gẽma in annulo/ humor vitreus est longe maior cristal/

lino/ sed crystallinus est durior nitro: & lucidus est ut gēma. Iste etiam duę antedixite tunicę oriūtur a nervo optico secundū Au-
thores: & ideo etiā iste duę tunicę ponunt pto una/ quę tñ si sint
una uel duęficur etiam alię parum censerunt medico legitimo.

¶ A loco continuationis secundū cū uuea ante uersus/ Inter par-
tem Retinę & totam Araneā est humor dictus albugineus quia
assimilatur albugini oui. Hic tamen humor est paucus & fluidus
in mortuo animali/ qui in directo pupillę uenit usq; ad cornē/ &
ibidem est lucidus diaphanes magis q̃ alibi/ & ideo aliqui hunc
humorem uocant ethereum/ & sic ponunt in oculis quatuor hu-
mores/ & quia secundū & uuea uidentur oriri a pia matre/ aliqui
ponunt ipas duas et etiā Cornē et Scleroticam pto una tunica.
Cetera diximus oculis spectantia in cōmentariis nostris.

¶ Ex p̃dictis uisa est oculorum substantia/ sunt siti in suis orbi-
bus. In duobus foraminibus magnis in frōte locatis/ & nō sunt
multū extra eminetes/ ne ledantur ab extrinsecis/ & propter hoc
habent supercilia extra eminentia/ & inferius ossa pomorū faciei.
Sua numerus/ colligantia/ figurā/ & quantitas patent.

Oculus sit or-
bita oculop.

Supercilia.

¶ Sua complexio propter humores ponitur frigida & humida/ &
propter pānculos ponitur frigida & sicca/ & pto multitudine spi-
rituum ponitur calida. Sua iuuamenta sunt omnibus nota. Pal-
siones omniū modorū patiūtur. Sua propria passio/ est uisus ab-
latio/ diminutio/ & corruptio.



¶ Si hęc omnia nō potes uidere in uno oculo/ uide in ambobus:
uide scilicet in uno mūsculos/ & carnem glandosam cum sua pin-
guedine/ simul & cōiunctiuā. In alio uero uide tunicas & humo-
res. Docta tamen manus difficiliora perquirir.

¶ De Auribus.

Ost oculos occurrunt aures/ sic dicte ab hauriendis uo-
cibus/ uel quia audes sunt uocum/ & tā cartilago ipsa/

p rūsq; foramina dicuntur aures/ sua pars suprema exterior
dicitur pīna/ uel pīrula & lobus/ inferior uero simbra & lobus uibi
sunt cerę uenę notabiliter fluentes/ si soluantur/ sua pars inte-
rior dicitur Scaphus.

Aures e. vñ.

Pīna pīrula
Lobus.
Simbra.
Scaphus.

¶ Sua substantia est cartilaginea/ ut sit ab extrinsecis rura & so-
nora/ moru ut plurimū carent/ in ipsarū ima partes aliqui putant
esse uirtutem memoratiuā. Ideo uolētes memorari ipsas partes



Conchilicæ



212 Implan-
ta-
mentum,
auris.



cōficant:ueritas est / q̄ illa cōcauitas postrema primi uentriculi duplicati cerebri/in qua ego pono uirtutem memoratiuā tendit oblique uersus aures / & sonit̄ q̄ propter hoc cōficatio talium partium iuuat memoratiuam.

¶ Hęc mēbra tegūt cutē aliquā tamen habent carnē simillā me unitā suę cuti. In ipsis nō est sensus nisi diminutus. Sua figura est omnibus nota / sunt anfractuosi: sicut conchilicę: ut melius si- ne impetu intrudet in ipsis aer faciens sonum.

¶ Suū foramen est in osse ḡtossiore quactiq̄ alia parte cranii. In tra quod est certa uacuitas:quam claudit quidā pāniculus subel- lis & solidus / secūdum aliquos ortus a neruo audituuo / qui est ex quinto pari neruorum cerebri.

¶ In p̄dicta uacuitate / quā ante uelat p̄dictus pāniculus: est aer implātatus / qui suscipit species auditus / quas dat neruo audi- tuo dilatato in pāniculū / qui uocat̄ meninx auri: & tunc sensus auditus cōphēdit undā uocalē & oēm aliū sonū ipsi adueniēt.

¶ Et huic pāniculo intra p̄dictā uacuitatem adiacent duo officu- la parua / apta moueri ab aere ibidē p̄ximo moto / q̄i suo motu se inuicē pcutiūt / a quibus secūdū aliquos causantur oēs species soni: plus & minus secūdū aerem extrinsecus motum.

¶ Sunt aliqui uolentes p̄dictū pāniculū oriri a pia matre / quę transiit cū neruo audituuo ad p̄dictā uacuitatem: de suo rāmen ortu uide cōmentaria nostra.

¶ Ad hęc bene uidenda requiritur docta manus / cum tenaculis / falce / serra & malleo apto / quia p̄dicta: tā neruus / qui uenit ab intrinsecosq̄ Meninx corrupte Murynga dicta / quę est uersus fora- men auri cum ossiculis p̄dictis: cum difficultate uidentur.

¶ Ex p̄dictis uisa est intrinseca & extrinseca auris substantia: sonus firmus / quāditas / figura / numerus & colligātia patēt. Sua cōplexio est frigida & sicca. Sua iuuamēta sūt oibus nota. Passiōes omniū modorū patiūtur. Sua propria passio est lesio uirtutis audituę.

¶ De Mandibulis superioribus:

¶ Iis auribus / ne aliqua pars capitis intacta maneat / ad fa- petiores mādibulas uenio / q̄ postposire sunt p̄dictis mē- bris / melioris ordinis gratia. Iis mādibulis sunt tātum duo propria ossa: sub naso & per longū palati unica commissura di- uisā in quibus sunt dentes / qui sunt / figura / nomine / & numero

213 Mandibule
superiores.

similes illis, qui sunt in inferioribus mandibulis.

¶ Secundum aliquos hæc mandibulæ supiores. xii. & pluribus sunt constitutæ ossibus: improprie tamen: quia ipsi ad dñt oculos ossa & ossa parisi & pomoræ faciei: & alia ossa duobus ante dictis ossibus.

¶ Harum mandibularum substantia numerus, quantitas, situs, figura colligantia & complexio patent. Sua iuuamēta sunt, quæ inferiores & quæ palati. Passiones omnium modorum patiuntur.

¶ De Anfractibus supra Palati.

Faucibus supra palati ad foramina nasi ē ita amplata.

a bice Chasium dicta: per quā clauso ore continue spirat & respirat hōshuic supius uersus: sunt certę Cameræculę: Anfractus seu Cauemę sub colatorio ista embotum cerebri possit: quarum parietes: ossiosę: subules et pelliculosę sunt. hinc per nasi foramina et per fauces ad os cerebri grossa excrementa extra trahuntur hæc uacuitates ab aliquibus uocantur nates.

¶ Ad ista bene uidenda: uiso prius magno foramine ossis basilatis per quod descendit Nucha: & bene inuestigatis illis sphondylis colligatos cum capite eleuasti ferre, uel falce diuide os basilare per mediu usque ad palati inclusiue: & predicta ossa optime uidebis.

¶ De Anatomia Extremorum:

e XPedito capite in sectione comuni primo occurrit pars colli posterior Tenon: & Cereix dicta: cuius situs est ab osse capitis basilari usque ad septimum sphondylum a capite inferius descendendo inclusiue.

¶ Hęc pars habet partes contentas & continentes: continentes sunt cutis, musculi, mēbranę & sphondyli.

¶ Contentę sunt mēbranę nucham tegentes, ipsa nucha cum suis nervis, uenis, & arteriis.

¶ Continentiū alię sunt extra, alię intra, quę sunt extrinsecę superiores, alię inferiores: & alię medię.

¶ Exteriores superiores uocantur ab aliquibus fontanella colli: & est locus ubi primus & etiā secundus sphondylus copulatur capiti. hic locus ab Aulic. 4. primi uocatur Alchadam, in quo dantur cauteria multa ad diuersas capitis dispositiones: & ibidē ē positū setones.

¶ Sua pars infima ab Aulic. dicitur Alchael, siue Alchel: & pars

Nucha.

media inter hæc uocatur nucha:

C Ab Alchadæ usq; ad Alchadâ inclusiuè inter quælibet sphondylum dantur cauteria actualia puerisâ p̄seruatione ab Epilepsia: & est remedium singulare.

E Inter partes continentes exteriores etiâ ponit̄ cutis primo occurrēs q̄ ē excoctāda: ut alię partes exteriores continentes uideantur. musculi, q̄ i hac sectione postponuntur p̄ causā dictā i Anatomia p̄tū āteriorū collig tū collū excoctādo possunt̄ iuestigari aliquo modo cōfusis: & ipsos iuestigabis: notādo prius ipsorū quantitātē substantiā, firmit̄, cōplexionē: & figurā: postpositis: numero, colligātiā: & ipsorū iunamētū: q̄ integre nō possunt̄ cōprehendi: p̄ ante positā sectionem capitis: & partiū āteriorū colligibū: uisio: cūrit collī ossa: inter partes continentes posita.

E Hęc ossa sphondyli dicuntur: & sunt septē: q̄ sunt subtiliores ceteris: q̄a debēt esse leues: ne grauēt corpus: & sunt tales: q̄a Noytios: Nucha corrupte dicta: est grossior ibidem: & descendēdo semper subtiliat̄: q̄a dimittit̄ partē suę substantię pro quolibet sphondyli. Primus tū sphondylus arlas ab aliqbus dictus: capiti unitus: in parte posteriori est grossior aliis sex: habet tū latius foramen: & maior pars sphondyli usq; ad os sacri habet alas & sinerita: q̄a bus hęc primus cauet̄: ut caput possit̄ melius flecti ad posteriū: & ne laceret neros iuxta se a nucha exētes. In isto etiâ sphondyli uersus sup̄tus sunt duę foueę: in quibus intrāt duę buccellę ossis basilaris: iuxta illud magnū foramen: p̄ quod exit uncha: Habet etiâ duas alias foueas: sere similes uersus inferiū: in q̄bus ingredit̄ tur duę buccellę secūdi sphondyli: licet sint aliq dicētes istas buccellas ēē in primo sphondyli: & ingredi in secūdo: Primus sphondylus p̄ ligamēta fortia unitur capiti: sup̄ quo flectit̄ lateralit̄.

C Post primū sphondyliū sequit̄ secūdu Epistropheus dictus: eo q̄a p̄ ipsū collū uertit̄ q̄ differt ab aliis in figura. Hic. n. sphondylus i suo sumo habet certū additamentū: quod Hipp. uocabat Dētē a iunioribus teste Gal. uocat̄ Pynnoides p̄ suā formā acutā: & hoc additamentum ingredit̄ in certā foueā: q̄ est in primo sphondyli distincta a foramine: p̄ quod exit nucha: & p̄ hoc caput tu te mouetur ante: retro: & secūdu rotundū seu obliquū: abq̄ dislocatione sphondyloꝝ p̄dictoꝝ: quę esset facilis: si ipsi nō resisteret p̄dictū additamentū: quia iunctura secūdi sphondyli cū primo:

Sphondyli
colli septem.
Nucha
Nucha.

Primus sphondylus.



Dētē Py-
nnoide.

est laxior omni alia: in tota spina reperta. Alię etiā spinę colli sunt
curtę sunt laxiores suis inferioribus: & habent sua ossa simenlat
bifurcata: & parua, ne grauarēt corpus. Tertius sphondylus col-
li Aroo gręcę dicitur: alii colli sphōdyli partiali carent nomine.

¶ Post sphondylos colli sequuntur duodecim sphondyli quibus
unūtur utrinq; duodecim costę: & isti uocātur sphondyli dorſi: Sphondyli
dors.
qui gręcę dicuntur Rachis.

¶ Post istos sequitur quinq; sphondyli lūbares & tenales dicti:
& ibidē sunt Renes & duo musculi dicti lūbi: istā regionē Auic. Sphōdyli lū
bares & tena
les.
uocat Alchatim: & gręcę dicitur Osphys: & hi sunt maiores alii
& locus qui est inter supremū illorū: & infimū sphondyliū costa-
rum a Gal. dicitur Gluturum: & ab Homero Acrusta. In ista regio
ne alligatur diaphragma. Alchatim.
Gluturum.
Acrusta.

¶ Post istos sphondylos sequitur tres alii: qui nō sunt sphondyli
nisi improprie: quia nō sunt similes ueris sphondylis in figura: &
hi ab Auic. uocātur sphōdyli Alhauis: & ab Auer. uocātur ossa Alhauis.
Ossa Aigē.
Agi: & a Gal. os sacrū amplū: & teste polluce dicitur etiā Atlas
eo quia totius corporis molē sustinet: sed hoc os sacrū secundum
Gal. constat ex quatuor ossibus: quibus cōtinuātur ossa anchę:
quę utrinq; cū isto osse sunt firmissime unita: & mandato naturę
aperiūtur seu separātur ab inuicem in partu. Ista etiam ossa an-
charum: aperiūtur in tali tempore in pectine ubi etiam natura/
liet in aliis temporibus sunt firmissime unita. Os Sacrę.
Ossa anchę/
nm.

¶ Post ista ossa prius posita ab Aul. tria: sunt etiā tria alia ossa nō
dura ut supiota: sed cartilaginea quasi: uocata ossa Alhosos &
caudę: etiā nō a firmātur ueris sphondylis: & nō dicitur sphō Ossa alhosos
Ossa caudę.
dyli nisi improprie sicut tres supiotes immediate descripti, & sic in
torum cōmuniter ueris: & non ueris sphondyli sunt numero: xxx.
quorum omnium substantia: est ossola cum aliquali cartilagine: Sphondyli
sunt. xxx.
intra suas iuncturas posita: & oēs firmiter per ligamenta sunt cō
iuncti: ne ex motu facilius disloccentur.

¶ Sua quantitas: figura: situs: & colligantia: est cōspicabilis. Sua
complexio patet: sua iuuamenta sunt tueri nucham et suos ner-
uos intra ipsos locatos. Sunt etiam fundamentū totius corporis
sed principaliter hoc faciunt sphondyli tenum et Alhauis. Pas-
siones omnium modorum patiuntur.

¶ Ad hos sphōdylos bene inuestigādos requiritur cōmetetia:



adiuuantibus aliquantulum nostris super Mundino cōmētante: & de
sua substantia interior bene uideat. simul & sua medulla cōmuni-
ter nucha dicta magna falce diuide sphōdylos p medulla capite
usq; ad caudā/seruādo melius quo poteris nuchā & suos nervos
illelam/facta tali sectiōe/sua ossa cōsiderabis:& etiā cartilaginū
& mēbranā partē ipsorū intrinsecā regentē:& etiā ligamēta/quis
hę uertebrę/ seu sphōdyli iuicē uniūt: his uilis ad nuchā rede.

¶ De Nucha.

Nuestigatis sphōdyli partes cōtinentē intra ipsos tam in
collo q̄ alibi uidēde sunt: quaq; Nucha (dicta gręce No-
tēos & Myelos) ē principalior cū suis nervis: alię partes

Nucha e sui
herui.
Suo pāntē
ē i sphōdyli

sunt duo pānculi duris: & unus lenis/ durior ceteris/ hęret ossibus:
alter ē loco durę matris: etiā durus: & alter ē lenis loco secundine
seu pię matris: omnes circūdantes ipsam nuchā & nervos:

¶ Substantia nuchę ē uiscosa/ humida cū aliq̄li soliditate: & ē fini-
lis substantię cerebri: quę tñ durior ē q̄to plus descēdit/ idurecit
magis: & teste polluce i colore ē subflauior cerebro: nec ē medul-
larum putat aliqui/ sicut neq; cerebrū. Sua figura oibus patet.



¶ Suus situs et locus est ap infima capitis partes descēdendo usq;
ad secundū supmū sphōdyliū rēsi ielusiue: et istū locū nō transiit
sed ab isto loco ista. Tota nuchę substantia in multos diuidit̄ ner-
uos: q; descēdēdo usq; ad ultimū caudę sphōdyliū p ipsos diuidit̄.
Numerus/ et q̄tiras patēt/ colligat oibus mēbris/ ad q̄ uadit̄ sul-
nerui. Colligat etiā hepatis & cordis: mediāte Aorta & chili: p cer-
tas minimas uenas & Arterias ad ipsam tēdētes p foramina sphō-
dyloꝝ. Hę uenę & arterię pforāt mēbranas p̄dictas duras: ipsam
circūdantes: & igtediūt mēbranā lenē a pia matre ortā/ qua me-
diāte ipsi herēdo ut subliētē nuchā nutrit̄ & uitalizat. Sua cō-
plexio cōtinet ponitur frigida & sicca: aliqui tñ aliter sentiūt.

¶ Sua iuuamēta sunt: ut ab ipsa uadāt nervi ad mēbra nō in tāta
distātia/ sicut si uenirēt a cerebro: & ut nervi sint magis distincti
se iuicē nō impediētes: & ut sint sicciiores: & ne ex sua lęi de ime-
diāte ledať cerebrū: & ē si nō esset nucha: cerebrū esset maius: &
nimis grauasset mēbra iseriotā. Passiōes omnīū modorū patitur.

¶ De Nervis a Nucha ortis.

¶ Vid sit Nervus/ alibi diximus/ nō solū ipsoꝝ substantiā
sed figuram & cōplexionē. A capite igitur ad ultimū

ſp̄nē dorsi deſcendēdo ſunt nerui a Nucha orti/ & hi ſunt. xxij. par/ & unus neruus ſine ſocio/numerando ſic. Primū pat neruo-
rum exit a primo ſphondyli/ unus neruus eſt a dextris/ alter a ſi-
niſtris/ ſicut ſunt etiā ſemper in oībus alijs ſphōdylis. Et ſecūdu
par exit ab intermedio primi & ſecūdi ſphondyli. Et ſimiliter eſt
tertū par iter ſecūdu & tertū ſphōdylū colli/ & deſcēdēdo uſq;
ad Anū q̄libet ſphōdylus h̄et unū pat neruorū/ ipſi correſpōdēt
aut in oriſcio q̄d eſt iter ſe & ſui ſocii/ aut i oriſcio ſibi prop̄rio:
ſed ultimus ſphōdylus Alhoſusq; eſt cōtiguus primo ex tribus
oſſibus Alhoſos/ ſiue caudē habet ſui par neruorū/ ſicut & ſphō-
dylū ſibi ſup̄iores. Sed inter ipſum/ & primū de ſphōdylis Alho-
ſos eſt aliud par neruorū/ & p̄ illud par duplicatū ſunt triginta
unū par/ & unus neruus impar/ quia deſcēdēdo in primo ſphō-
dylū eſt unū par/ & inter primū ſphōdylū & ſecūdu colli/ eſt unū
aliud par/ & inter ſecūdu & tertū/ eſt etiā unū aliud par/ ab ulti-
mo uero oſſe/ quod prop̄ie cauda dic̄it/ exit unus ſolus neruus:
& ut ſic ſunt triginta unū par neruorū/ & unus neruus ipar.

Cliſtorū cōligāria eſt notior a quo q̄ ad quē/ & cōligāritur maio-
ri parti mēbrorū habentū motū/ ſuus ſitus & quātitas pater ſi/
cut & numerus. Iuuamēta illorum neruorū ſunt date motum &
ſenſum. Paſſiones omniū modorū patiuntur.

Ex p̄dictis parer q̄ in humano corpote ſunt triginta octo pa-
ria neruorū/ & unus neruus/ qui in totū ſunt ſeptuaginta ſeptē:
exceptis illis duobus qui uadūt ad naſum pro uirtute olphatiuā:
qui cōiter nō nomināritur nerui: quia ſunt molles nimii. Ego n̄
uoco ipſos neruos/ inquantū ſunt organa ſenſus odoris/ & ut ſic
ſunt ſeptuaginta nouē/ quorū 63. neriūt a nucha/ & 14. a cerebro
uel 16. cōnumeratis ſecti carūculis/ mammilla ſibus: de q̄bus ſupra
dictū eſt in anaromia neruorū cerebri/ q̄ poſtea ad ſimiles ramos
& uillos terminantur/ quos non cōprehendit ſenſus/ & ſunt illi. L.
Nerui a cerebro uenientes ſunt paria ſeptem/ ſeu octo.

Nerui nuchę colli ſunt paria octo.

Nerui nuchę dorsi ſeu coſtarum ſunt paria duodecim.

Nerui nuchę renum/ ſeu Alcharim ſunt paria quinq̄:

Nerui nuchę Alhouius ſunt paria tria.

Nerui nuchę Alhoſos cū duob⁹ neruis iter ſphōdylis Alhoſos
& Alhouius ſunt paria tria/ & unus neruus ipar a cauda exiēs.


xxij. par ner-
uorū & unus
neruus.




triginta paria
neruorū & unus
neruus totus
ſunt. uel i to-
tū ſunt.

In ista figura potes facili-
ter uidere numerū sphon-
dylorum / Et scias quod
a substantia primi sphōdyli
erexit duo nerui: unus ab
utroq; latere: & numerum
neruorū potes notare in
extremitate linearum in
tali figura positarum.

Nota tamē lector q̄ ista
figura nō habet ueram si-
militudinem cū sphondylis
nisi in numero sed sua ue-
ra figura melius uidetur i
figura subsequēte / quia illa
est uera sphōdylorū for-
ma. Ista tamen sphōdylorū
primā figurā hic posui. q̄
in hac melius uidetur si-
tus et numerus neruorū
nuchę q̄ in figura subse-
quente.



Uetus neruus folio.



DE ANATOMIA



u

Iis prædictis ad uenas manusi phlebotomari solitas pri-
mo deuenio/cum quibus etiã uidebimus cartilagineis
ossa medullã & ungues/posse positis talit̃ mēbra tū
leulis: qui in cōi sectione nō mōstrātur. Musculorū tñ notitiã est
Chirurgicis maximū iuuamentum: esse Auer. primo colligeret
Ideo/ q̃a in p̃senti nō possunt mōstrari/ ponemus in fine op̃is cer-
tas imagines aliquos mūsculos/ maxime exteriores demonstran-
tes. Ponemus etiã imagines ossa principalia indicantes.

¶ Primo igitur occurrūt duo mēbra latet aliter locata/ q̃ ab hu-
meris usq; ad extremitatem digitorū/ Magnę manus a Gal. sunt
uocatę hęc mēbra de p̃senti ites habent partes .

¶ Prima pars a superiori incipiendo cōmuniter dicit̃ adiutorii:
supra quod est spatula/ q̃ etiã ab aliquibus ponit̃ i magna manu.

¶ Sub prima parte adiutorii dicta: est secūda dicta brachiū/ & in-
ter has est iunctura dicta cubitus/ cōmuniter tamen brachium a
multis sumitur pro prima & secūda parte antedicta .

¶ Sub secūda est tertia pars parua manus dicta : & ista ē proprie
manus/ ab emanādo dicta/ quia ab ista parte fere omnia artifi-
cia emanāt. Inter istā & secūda: est una iunctura ex pluribus ossibus
cōposita/ dicta arabice Raseta: & Akam/ & gręce Carpus .

¶ Iistis notatis/ excortabis totā cutē magnę manus cū diligentiã
a collo usq; ad digitorū extremitates/ & uidebis primo uenā Ba-
silicā. i. Regiã/ antiqui ante Arisī. istam uenā uocabāt lecorariã:
& adhuc seruat illud nomen/ quia cōmuniter dicitur uena hepa-
tis: dicitur etiã Ascellaris/ seu Axillaris/ quia ut supra patuit in
Anatomia uenarum/ hęc uena transit per Ascellam.

¶ Est enim Ascella locus ille utriusq; oßeauus/ qui est infra hume-
ros in parte laterali inter supremā partē pectoris & supremū ad-
iutorii/ qui quia in respirabilis est/ in multis grauiter olet. minime
enim cōtra tūt esse Arisī. i. proble. in his locis est notabilis pars
carnis glādosęque suscipit cordis aliqua extremetas/ sicut & car-
nes quę sunt circa inguina: & in collo circa guidez nō multū di-
stantes ab auribus/ quę suscipiunt supfluates hepatis & cerebrũ
& ista loca uocantur emulctoria cordis/ hepatis & cerebrũ. Iste ē
carnes sunt straguli magnis uenis circa ipsas locatis.

¶ Hęc uena Ascellaris & basilica dicta/ descendit per iterius & in/
ferius brachii cū arteria sibi sortia usq; ad centā distantiam: deinde

Signate ma-
nue res p̃ces.

Prima pars
adiutorii/ su-
pra q̃d est spa-
tula Brachii
Cubitus.

Partes man-
us & manus.

Raseta/ sicut
Carpus.

Uena basilica
Regia.
Lecoraria:
Hepatica.
Axillaris.
Brachialis.
Trifida q̃d ē
pp q̃d graui-
ter olet.

Emulctoria.

Locus basi-
licæ.

*ſola uena notabiliſſime manifeſtatut circa ſiſturā cubiti in parte in-
trolea: & huius phlebotomaf: & cōfert principaliter morbis pe-
ctoris: quia immediate eſt unita uenis nutriētibz ſuas partes.*

*Baſilica phle-
botomata ad
qd cōfert.*

*A collo uero p exterius ab humeris ad iſtā ſuncturā: p adito-
rium tranſit una uena dicta ſparularis: humeralis: & cephalica: q
eū circa ſuncturā cubiti phlebotomaf: quę principaliter cōfert
morbis capitis: & colli: quia immediate unitur uenis guldez.*

*ſparularis.
humeralis.
Cephalica.*

*Inter iſtas eſt una uena trāſuerſaliter tēdēs ab una ad aliam: a
quibz ſuſcipit indiſcretē ſanguinē: hęc uocaſ nigra: cōis: & me-
dia: quia euacuat a mēbris capitis: & pectoris: & cōſequēter a tota
ſuprema parte: qua mediante euacuat etiam ab inferioribus.*

*Nigra cōis
media.*

*Et cephalica ut plurimū ſola directe deſcēdit: uſq; ad paruam
manū: inter indicē & pollicē: & uocatur ab Albucāſi: & a Raſi:
& etiā a me: ueta ſunīs brachiū: & a Cauliaco: & a Canamufali: di-
ctur cephalica ocularis. Hęc igitur cōfert capitis morbis: propter
colligatā cū cephalica p̄dicta: & etiam propter directionē.*

*ſunīs brachiū
Cephalica
ocularis.*

*Baſilica uero etiā ſola: deſcēdendo ſere uſq; ad manū p̄terius
& iſterius: obliquatur uerſus exterius circa paruam manum: quę
emittit a ſe ramos inter minimū: & annularem digitorum: & hęc in
eā euacuat a pectore: baſilica p̄dicta mediante.*



*Inter iſtas duas uenas paruę manus: ſunt ut plurimū rami ali-
qui inter indicem & medium: & inter mediū & annularem: qui
indi ſunt loco uenę cōmunis: ſed ramus: qui eſt inter indicem
& medium: plus participat cum cephalica: & qui eſt inter mediū
& annularem: plus participat cum baſilica.*

*Una cōis in
manū.*

*A cephalica ſupra cubitū p exterius brachiū: deſcēdit una ue-
na a multis etiā ſunīs brachiū nominata: q ut plurimū termina-
tur in uenis p̄dictis a lateribus mediū digiti exiſtentibus: & hęc ſu-
tis brachiū nō eſt in uſu phlebotomādī: Poſſet tamen ſecari ne-
ceſſariis cauſis: educeret a capite: quia cephalicę eſt cōtinua.*

*Una ſunīs
brachiū.*

*Sepe etiam a uena cōmuni: quę eſt in curuatura cubiti: oritur
unus ramus: qui ſolus abſq; ramo cephalicę p̄dictę deſcēdit in-
ter pollicē & indicē: & ideo aliqui dixere iſtū ramū iſcium con-
ſere in morbis: in quibz cōfert uena cōmunis p̄dicta.*




*Sepe etiam ab iſta uena cōmuni inter indicem & pollicem nō
deſcēdit aliqua uena: & hoc ego pluries notauī: non ſolum in*

ista sed in multis aliis uenibz uidē ipsas & etiā arterias uariare sitū
& in aliquo individuo sui rami sunt deficientes: & in aliquo su-
perfluētes: & propter hoc (iudicio meo) multi authores sunt di-
scordes.


¶ Sepe etiā inter indicem & pollicem / est ramus compositus
ex ramo cephalicis & ramo uenę cōmunitis: & tunc euacuat a cō-
muni: & a cephalica: & magis a cephalica q̃ a cōmuni: propter
maiorem directionē. Directio. n. uenarū ad mēbra multū cōfert
ad euacuationes: teste Gal. in libro de phlebotomia.

¶ Et hęc de pręsenti sufficiant de uenis manū ad quas bene in-
uestigandas cōsiderande sunt insinuate imagines in quibus ui-
dentur situs & nomina aliqua uenarū principalium.



nono ingreditur illam ramū venat cephalicā descendens q̄ terminatur inter idē et polē q̄ ab alio bursā de sup
 alio bursā et etiam ab alio vt supra patet.

Et hic video i
 vna figura ve
 ram sunt bō
 doq ab hunc
 ro idē dō
 ut vīq ad in
 diē et polē
 q̄ vocat salu
 ailla et ab dō
 no in vna m
 parua et a q̄
 no et ab Clig
 ne et a fiqui
 bae ity ity q̄
 ab dō. hū
 bē p vno r
 mo venat ab
 mīa et videt
 in abab? figu
 ra q̄ hū bā
 lica Ei pte bō
 mēba bā
 dō et cā m
 mī et qualiter
 ab ea obliqu
 tur vna r
 mus dō p
 fūctōm ma
 nō pte tū
 curā q̄ vadit
 ter mīa et
 dūatē et v
 cā afcēdē
 a dō et a f
 quādo q̄ ē
 ramē a dō
 ne fō bā
 cū et dō r
 mī mīa
 mī et dūatē
 videt i bō
 fēpē figurā
 videt ē i fū
 dūatē figurā
 rō vna dō
 q̄ ē ramē m
 i r cephalicā
 et basilicā
 afcēdē vī
 des q̄ r a cō
 vna mīa

[illegible]

Iſis uenis ſalrē in una manu/qa ſufficit / oīa ſua oſſa ſunt

denudāda/cū qbus etiā eſt uidēda ſpatulaſacta ut ma/ Spatula.

nus ab ipſa ſuſtinetur:& ne adiutorii alibi cū pectore ſit
cōtinuū/qa facilitas opariōis manuū unius ad alterā deſtinetur:
& ſitet anguſtatio:& ſuit ſepara a coſtis/ propter ſuū fortē motū:
& quia ſic locata melius rnetur mēbra pectoris uerſus poſterioris:
& ſuit lateralitane in motu obuiet ſphōdylis/ uerſus quos eſt ſub
tilis/ & lata ut ſpatulideo uocat ſpatula/ ſua pars uerſus adiutorii
eſt groſſa/ in capite cuius eſt certa cauitas pibis dicta/ in qua reuo
luntur extremitas ſupior rotōda adiutorii/ dicta uertebrium.

Lata ut ſpa/
ta ſpatula.
Dico.
Circuſoſi.
ſcōma oſſis
Spatula.

COs ſpatulę ibidē habet duo additamenta: unū eſt ad ſupiora:
& poſterioris/ quod ligat cū ſcutula ſupiore pectoriſſe/ & uocatur ro
ſtri cotui/ cuius inuamētum eſt prohibere ne adiutorii ad ſupe
riora de ſuo moueatur loco: Aliud de dictis additamētis eſt inte
rius & inferioris/ quod etiā diſlocationē adiutorii prohibet:

CHoc os ſupra ſui dorſum habet ſubſtantiam triangulatam/ cu
ius baſis eſt uerſus poſterioris/ & ſua eminentia eſt uerſus interioris/
ne dorſi ſuperficies eleuetur in acutum/ & de ſacili lędatur/ An cu
ius extremitate eſt carthilago.

CAduerte q carthilago eſt duplex/ una quę omnino eſt durior
oſſe quacūq; alia parte alalis/ & hęc eſt i extremo ſaniori oſſis ſpa
tulę/ & in pectore & epiglottidi/ & etiā alibi in multis locis: & eſt
etiā una alia carthilago durior iſta/ quę tñ eſt mollior oſſe/ & hęc
eſt in extremitatibus oſſiū magnarū iūcturarū/ q ab Aul. uocatur
Alagualhic/ hęc imediate heter ſubſtātię oſſiū/ alia uero carthila/
go i pdictis iūcturis heter iſſi Alagualhic/ & carthilagini molliori
antedicte poſtea imediate heter in iuncturis ligamenta/ oſſa in
uicē ligāria/ & hęc optime uidētur in oſſibus uſtimate decoctis.

Carthilago
duplex.

Alagualhic.

CViſa ſpatula uide os adiutorii/ quod eſt malus de oſſibus ma
nus/ cuius figura eſt omnibus notat/ aliquatiter curua in cuius cō
cauitate ſiccur & in alis malis oſſibus eſt medulla/ dicta medul
la/ quia eſt in medio oſſium.

Os adiutorij
ſcōdalis vñ

CMedulla/ n. eſte Ariſt. ſecūdo de ptibus alaliū: eſt alimentum
ſanguinei/ & eſt cōcoctū/ cōtentūq; excrementū/ & Aul. prima
prima dicit oſſa nutrin ab ipſa: & hinc cognolci artiſcioſa natu
ra/ quę cū nō habeat ſemp uenas aptas pro oſſibus/ in ſuis poris
& cōcauitatibus ponit ſuū alimētū/ & ſi ē etiā ſupfluitaſi iſſis po

Quid ſit me/
dulla.



nit etiam extremitati: cum non habeat alius loci predictis accommodandi.

Labia ybi.

¶ Extremitas inferior ossis adiutori duas habet eminentias: quibus coniungit duo ossis scilicet brachii: faciendo cum ligamentis foribus iuncturam cubiti: & in cauitate: quae est inter predictas eminentias: ingreditur extremitas scolis isertonis: quod est maius superius: quae est curua: ut iunctura sit firmior: propter quasi continuos: & fortes motus humerus iuncturam: quae propter hoc est raro dislocatur: & si dislocatur cum difficultate in pristinum gradum reducit. Focilia brachii sunt et percuti: quia ossa uel sunt itra concava uel porosa: ut sunt leuula: ne grauet corpus.

Scolia bra/ chii.

¶ Et extremitates istos scolis: & omnia ossis: & iuncturarum manus: & pedis: sunt grossiores: quae in medio: quia in extremis debet esse magna ligamenta: propter iuncturarum fortitudinem: & in medio sunt subtiliora: cedat loci corporibus musculorum: qui necessario propter multiformes motus: debent esse multi & magis.

¶ Post ossa brachii sunt ossa radii: & ulnae: quae sunt octo propter multitudinem motuum: & etiam propter aliud.

Ossa: Pol/ ma: dicuntur caria.

¶ Postea est parua manus: pars cuius interior sine digitis: uola: & palma uocatur: pars uero ipsius exterior uelle. Arist. primo de histologiae ceteris ossa sunt quatuor: excepto pollice: alias digiti correspondenda: ex quibus componit pecten manus: & procarpum: seu procarpi: & antecarpum: & metacarpum: sunt tamen aliqui qui uolunt: quod primum os digiti pollicis sit in Ramera: ut sic pollex non habet nisi duo ossa: & aliqui dicunt: quod primum os pollicis est in pectine manus.

*Pecten man/ nae.
Procarpi.
Antecarp.
Metacarp.
Pollex.
Index.
Medius.
Anularis.
Auricularis.
Auricularis.*

¶ Post pectinem sunt digiti: primo est pollex: qui habet duo ossa extra uolam: postea est index sibi proximus: iuxta quem est medius: longior alius: postea est digitus medicus: & anularis dictus: postea est minimus auricularis uolatus. Hi quatuor habent tres iuncturas: & tria ossa: & est pollex iudicio meo habet tres iuncturas: & tria ossa: quia ego non pono primum os ipsi ferules: nec in Ramera: nec in pectine.

¶ In intrinseca parte digitorum est notabilis caro: quae est dragulum ossibus: ne laedantur in cordinis obuiationibus: terti duratur: quas necessario capiunt in operationibus manus. A lateribus uero ipsorum est minor caro: & minor in exteriori parte: quia istis partibus non obuiant laedentia in suis operationibus sicut intra manum.

Corde digito/ rum.

¶ Corda istorum digitorum maxime exteriores ingrediuntur hancuram suam superius: & quilibet digitus habet corda: de quibus in praesenti non sit sermo: quia non possunt uideri: sui musculi: quorum alii sunt in alio

In brachio locatib; chordę aliquę ad digitos ueniūt a cerulee, ut
latus dixerimus de digito anulari in cōmētariis super Mūdino.

¶ In magna ergo manu sunt. *xxi. ossa* / exceptis ossibus s; simili: *Oss manus
quę sunt ibi.*
q̄ replēt alijs iūcturas; & p^o ē os s; atulę / postea os adiutorij; o/
sica deo locilia brachij; & *g. Raserę* & *4. pectinis*; & *15. digitorū.*

¶ In fine ossū digitorū sunt ungues / quāq; iouamēta sunt ad de
corē manus & ad tutelā extremitatis digitorū: & ad capiēda mi
nuta; & ungues generātur ex sup; stuitaribus; sicut & pili: ideo cō
tinue crescūt: etiā mortuo holere; p̄dictis patet manuū substan
tia / situs / numerus / figura; & colligātia ac scia quātas patē: sua
cōplexio est qualis sunt suę partes. Sui iouamēta nō possunt de
scribi. Sūt. n. organorū organa; passioēs omnīū modorū patiūtur.

¶ De Anatomia Pedum.

His manibus: uide etiā pedes: saltem unū / qui sufficit in
illa sectione: sicut & una manus: pes igitur diuiditur in
magnum & paruum / sicut & manus teste Haly & Gal. &
pes teste Haly habet quatuor partes / prima pars dicitur ancha /
Secunda coxa / Tertia crus / Quarta pes paruus.

¶ Et primo est ipsius cutis exortāda undiq; a sūmo ad imū / In
pte cuius intrinseca sub cute ab iguinę p corā descendēdo ē unus
notabilis ramus uenę chilisq; cū ē sub poplite; ut supra diximus
tripartit;: unus directe descēdit p interius usq; ad cauiā dome/
sticę pedis; & hic uocatur saphena / q in diuersis secatur morbis.

¶ Unus alter obliquatur uersus exteriū p surā & descēdit ad ca
uillā syluestre; seu exteriōrē; & hic uocatur ischiadica / qui secatus
p̄fert dolori ischiadico: & huius bifurcationē nō cognouit Mun
dinus / nec sui sequaces; & forte qd hic ramus p̄fert dolori ischia
dico quia aliqui sui rami uniūtur cū ramis uenarū nūmētū mu
seulos & partem exteriorem coxe uersus iuncturam ischiorū.

¶ Inter illos ramos / Rasea pedis sunt uenę utrinq; p̄dictis ra
mis cōes / q̄ interdū secātur maxime si alter istorū duorū ante di
ctorū nō teglatur / q̄ sepe cōtingit / quia ut supra patuit uenę nō
seruant eūdē situm / nec numerū nec etiā quātitatem.

¶ Inter saphenā p̄dictā: et ēr ischiadica sub poplite usq; ad pedē
paruum descēdit unus ramus notabilis / qui mediū tenet iter hast
q p̄t secari loco destitūtię alięq; p̄dictorū. In infra scriptis ima
ginibus ut debis p̄dictas uenas saltē saphenā et ischiadicā.

Ungues.



Pes magnus
& paruus.

Indica: Co
xa: Crus
Pes paruus.


Cura chilis
in p̄m sub
poplite.
Septima.

Ischiadica.



Cura media.

Et in illis tri-
bus figuris ha-
betur omnes ve-
nae phleboto-
mari solitas i
pedibus: et in
illa figura q̄ ē
in medio vi-
des quatuor
vna vna su-
perior magna ve-
nosa a parte
dorsalis cor-
poris obliquas
descendentes:
et sub poplite
bifurcantes: cu-
ius vna rami-
ficus videtur p
dorsum pedis
pedisq̄ cu
traque voca-
tur Saphena
vltq; ad pedē
parū. Alter
vero ramus
videtur per par-
tem plantarem
pedis: qui vo-
catur Saphena
ramus: et isti
rami ut intē
riores q̄ eū
riores videtur
in figuris
interioribus: q̄
phlebotomari
sunt circa cun-
ctū vel circa de-
cimum pedis.



Ilis uenis pedis: musculi sunt remouēdi totaliter ab ossibus, sicut & i manu sectione factū est pp eādē causam: notādo circa īguina illā carnē glādosā: q̄ ē emulictorū hepatis: iuxta quā trāsīt ramus p̄dictus uenę chilis descendētis a quo sunt saphena & ischiadica uena: & in tali carne imbibūtur materię superfluentes hepati: ut alibi diximus.

Emulictorū
hepatis.

Remotis musculis remanent pedis ossa: quorū a sup̄ioribus p̄t̄mo occurrens: dicitur os anchę: quod os uringę est unum: hęc duo ossa in posteriori parte unīfūtur firmissime ossi sacro seu ossibus Althouli. In pectine uero se inuicem iungunt: Et tam ante q̄ retro hęc duo ossa nutu dei apertūtur in partibus: & p̄pter partum hęc ossa sunt magis curua & ampliora in fœmina q̄ i māre: & hęc ossa quatuor habent nomina, ante uocātur ossa pectinis, penis, pubis, & femoris: & ad partem posteriorem uocantur ossa anchę: & ad superiorem & anteriorem uocantur ossa ilii: & Alharthapha: & ad inferiorem in loco in quo est cōcatitas p̄xis dicta: in qua ingreditur caput ossis coxę: superius rotundum uertebrium dictum: uocātur ossa ischia & acceptabulum.

Os anchę.



Ossa pectinis
penis, pubis
femoris.
Ossa anchę
Ossa ilii.
Alharthapha.
Ossa ischia.
Acceptabulum.
Tibia.
Fibula.

Istis duobus ossibus anchartū in parte posteriori adjacent nates: a nitendo dictę: & sessus a sedēdo: in istis partibus caro est dēfiot: q̄ in ceteris mēbris: ne premente corporis molle ossibus p̄t̄maratur: & istę partes secundum aliquos habent colligantiā cum toto: ideo dicunt uentosas: & sanguifugas ibidem applicitas esse uicarias phlebotomię: & sunt obussi sensus quia parum neruę sunt: & p̄stant inter alia luamēta requiem corpori sedendo: tuentur etiam Anum a frigore: & sunt ad decorem abscondendo locum excrementorū.

Post istud os seu ossa anchę sequitur os coxę: lēgum: Interius plicatum: & exterius cōuēctū: & grossum maius omni alio corporis ossi: uacat: ut sit leuē: in quo est medulla: sicut & in aliis magnis ossibus: & iunctura Inter istud os & os anchę: uocat ischia: istud os habet d̄po additamēta sup̄ius: & duo ischia: sed sup̄iora sunt maiora: quorū unū ingreditur p̄dictū p̄iudē ossis anchę: in cuius cētro p̄ter alia ligamēta: cū uno ligamento cordoso: rotūdo: & duro: firmissime unītur: ne de facili dislocetur.

Os coxę.

Et sua ad ditamēta inferiora tūgūtur duobus sociis: cruris in parte quoq̄ anteriori: est os planū rotundū Rotula dictū: & hęc

Rotula.

Sunt.

omnia ossa inuicē ligātūr firmissime p ligamēta : & hęc iunctura uocatur Genu/cuius pars posterior uocatur poples.

*Crea/Crea
Sura.
Focilia/Alu/
dura. Colla/
Tibia/Can/
nac.*

CA Genu ad parui pedē est crus/cuius pars anterior crea dicitur & posterior sura. In ista parte sunt duo ossa prædicta / q̄ uocātūr fociliatardines/colla/tibię & cāne. Ista duo focilia differūt quāritate:nā in domestica prelocatū est longius & grossius illo quod locatur in syluestri/ & minus nō cōlūgitur cum osse coxę/sed in fra genu iheret magno focili/ut ipsū fortifloet/ & rectum teneat.

*Os Cahab.
Cauillac.*

CIsta duo focilia uersus inferius terminātūr ad unū os pedis parui-q̄ ē satis grossum ab Aul.noiatū os Cahab : ad latera cuius prædicta duo focilia faciūt illā eminentiā uttingę q̄ cauillę dicitūtur & ex his omnibus constituitur maior iuncturā pedis parui.

*Osone Alu/
pedis.
Os cahab.
Os calcanei.
Nauiculare.
Quatuor ossa
raße.
Os Aluamū
Quinq; ossa
pectinis.
Quatuordecim
ossa digitor.*

Pes etiā habet cōcauitatē inferius/ & cōuerū supius /q̄ dicitur mons & altum pedis : & totus pes cōponitur ex multis ossibus. quorū primo occutrens est os cahab predictum : sub quo est os calcanei/quod stando est uersus inferius decliue/ ante os cahabi est unum os dictum nauiculare/deinde sunt quatuor ossa rasetę quibus uersus exteriū unitur unum os sisaminum/deinde sūt. 5. ossa pectinis pedis : postea sunt. 14. ossa digitorę i lōctura media pollicis uidentur etiā duo ossa sisamina sic dicta/ quia assimilantur granis sisami.

Et cordę extēdētes digitos incipiūt in crea/ & ipsos cōtrahētes sunt i plāra pedis/ q̄ cordę cū suis musculis non possunt bene uideti nisi in corporibus in aqua aliquatls/uel in sole exsiccatis.

Ungues.

In extremitate ossiū digitorū sunt etiā ungues/ quarū iuuamēta sunt ea/quę in manibus/hoc excepto. lq̄ nō sunt pro capiēdis minutis: Ex ante habitis uisa est pedum substantia/ in quibus etiā sunt cartilagines/ Albaguabiles & ēt Arterię/ sicut in manibus. Suus situs/figura/quātitas/colligantia/ & numerus patent. Sua complexio est qualis complexio mēbtorum organicotum/ Sua iuuamēta sunt mutare locum/ & portare superiora ad libitū anime/pro ut possunt. Passiones omnium modorum patiuntur. Sequitur figurę musculorum & ossium.



In hac fi-
 ra videtur
 semel esse
 et loco
 et partem
 heredes
 potest huius
 ad a quon-
 dam reddi
 cant in p
 officandis
 ostendit
 velantibus
 valentibus
 in sectionis
 etc in alijs
 erantibus
 rurgicatur
 h.





Et hoc est
 quod in qua
 longo vicio
 omnes me
 in sub case
 in mediate loc
 neque pro
 stat utrum
 ta potuerit
 et medice
 ille figure
 sumant: p
 res in inea
 die mēto

In ista figura videtur
 maculae et lineae
 et signum
 non verum om
 nium ossium
 corporis hu
 manis. In
 ossibus capi
 tibus etia ossi
 bus poris que
 sunt in omni
 bus non
 possunt videri
 nisi in cor
 poribus deco
 ctis vel exhi
 catis in deter
 minatis.






Et Jaitha faga
 ra vidit effi
 gas polinas
 in domo vidi
 tas et deo cul
 sed quip dei
 tra vidit con
 natio commu
 natio et ge in
 gos vidit et
 legentis et q
 i medio vide
 re etiam tibi
 com straq et
 in ge lincos
 a lincos et
 vidi et de
 muliere a me
 super nolue
 i. et me om
 ny q sunt in
 pia et omni
 ras et moras
 et in po
 auctores et
 sunt et in
 bus et in
 lino et in
 cana in qua
 videri mudi
 buis et ge
 muliere con
 natio et de
 commu et
 legation ad
 vii tunc et
 flares et vi
 del vii et de
 baobab effi
 bus parat et
 et a regione
 oca in ab
 effi et de po
 maffid et
 dno per linc
 capite veris
 auron.

Obis in hac
figura nomen
fuit fons et si
tun effluat
nue et pedes.
In manu fuit
coronatus
duos fons
brachij et octo
ossa radice et
quatuor pedi
bus et quinde
cim digitorum.

Et in pede ha
bet os calcu
ne et os car
palis et os tra
pezoidale et qua
tuor ossa radi
cis et quatuor
decim digito
rum.



Quam humani corporis sectionē publice ut sit habitemus: &
 nōnulli discipulorū (ut moris est inter ipsos nato luore)
 per iocū atq; risum / caput pudēdag; subripulissent
 Parthenius amenissimo ingenio iuueris: inde
 nactus Argumentū hęc ludit.

¶ Platonis & Harpagi dissecti Dialogus.

Pla. **A**Nte meum quę nam versatur imago cubile /
 Vulnere continuo disiratur: trunca caput:
 Hanc procul in barathri fusię torquete tenebras /
 Horrida ne cliōes terreat umbra deos.
 Nanq; ego uix tali comectus membra pauore
 Hinc uidi alciden ducere in astra canem:
 Nec mihi delphobi tam sęua occurrit imago:
 Cęsa autem / & nates: depopulata manus.
 Illa nihil contra: (neq; niptoducere uocem
 Os ualet abscessum) se tamen usq; mouet:
 Fate age: & hanc dixit pto tēpote suscipe linguam:
 Quę tibi tam dirum fors tulit exitum:
 Incipit illa: silent suspensio pectore manes:
 Quorum uix fuerat tegla tanta capax.

Har. Harpagus: a: uulgo dictus: quia furta placebanti
 Lignorum ascendi pulpita moesta tritum.
 Inde ubi perfregit laquei compressio guttur:
 Artubus: e: nostris maxima facta nota est:
 Protinus hoc miserum medici petiere cadaveri:
 Inq; schola acceptum constituere sua:
 Stipantur denso subfella plurima coetus
 Quorum unus gladios telaq; acuta parat.
 Illicet abdomen districta nouacula scindit: Abdomen.
 Quattuor inq; finus disillit una: cutis. Quia.
 Derogitur nullo constructum pancreon ossi: Pancreon.
 Et peritonei bractea pāneculi Peritonea.
 Omentum posthęc succedit tegmen: & intra Omentum.
 Intestina sacer iam penetrat gladius.

Rectum.	Apparet primo repletum stercore rectum :
Colon.	Scrutari at eolum palma secunda fuit.
Cecum.	Hic manibus cecum gaudet tractare cruentis:
Quodena.	Quod p̄ decem in digitos tenditur atq̄ duos.
Ilion Jeuni.	Ilion inspicunt alii: at teiunia lenti Parca cibi longa sustinet ille mora:
Lacea.	Fit uia ut laces tolluntur / qua solet ite Sanguis & albenū est semita nota chilo. Fosse dehinc stomachus magnam rursus exit in orbem :
Stomachus & sit loma	Visitur hęc maure forma cucurbitulę.
Lien.	Cernitur hinc nigri quadrata figura lienis
Jecur.	Illinc sanguineo funditur ense iocur .
Vesica bilis.	Cui bilis uelica hęcens monstratur. & ambos Dispare quę renes limite uena subit .
Ventre.	Vnde duplex intrans uesicę in claustra meatus
Utrius.	Fert lotium & salę pondere rurgit aque.
Urina.	Seminis inde capax uas ferto aperitur utraq̄:
Uasa seminis	Hispida dehinc olidi podicis antra patent:
Voder.	Quęq̄ uehunt nocuos constricta meacula fluxus
Vent anaxi dalso.	Sanguinis & prauo pondere membra leuanti Nec satis illud erat uentis laniasse recessus:
Aqualicula.	Et uersasse eam scriula aqualiculę:
Pectus.	Pectoris effringunt costas / tetetęq̄ lacertosi
Costa.	Ne gradem nequeat pandere pleura sinum :
Uicula.	Diuiditur trinum moles dein cordis in antrum:
Cordis ues	Vnde fluit sanguis / spiritus unde fluit
Vena in co.	Dextrum uena tenet / sed lęuo arteria pendet
Arteria i co.	E latere hęc ramos spargit & illa suos.
Precordia si ut abscaphe num.	Suspensio uellunt gladii p̄cordia ductur Hęc de tutela nomina mentis habent.
Mediastin.	Hinc mediastini referatur tela profundę
Gula Summ	Quęq̄ cibum ac uocem semita bina uehiti
Pulmo.	Qui trahit alterno celum spiramine pulmo Scinditur in tenues illico particulas:
Dorsum tho ra.	Scinditur & dorsum / neu osq̄ uerthebraculus Exillit latebris multa medulla cauis.

Brachia/crura/pedes/corlo nudantur adempto:

Brachia/cru-
ra/pedes.

Al. Vix tali perit marfia supplicio:

Fortē caput quidā, pendens & ab inguine mēbrum:

Atq; pia testes surripuere manu:

Scilicet immūnis quōta pats ā uulnere ut esset:

Prēstarentq; boni chrīsticolę officium:

Plu. At non ante tibi placidas inuisere sedes

Pas erit, & stygios cymbula a dire lacus:

Quā caput, & gemino iunctum cum teste priapum

Ad solium referas nil remorare meum:

Har. Quare agite o iuuenes mitissima pectora, tam tam

Quę mihi nunc desunt reddite membra precor:

Reddite & in solo componite cuncta sepulchro

Viscera, dum stygias cernere detur aquas:

Post rapite & uestros q̄ppimum uertite in usus:

Sive illis dominq; concilietur amor:

Seu penitas terrę iuuēt explotare cauernas:

Vnde autum possit, fuluq; gēma legi:

Seu tali libeat medicamine sumere pennas:

Aetheraq; alarum findere remigio.

Har. Respuitis mea uerba? adero, noctuq; dieq;

Irato. Et uario somnos phasmate disciam.

O utinam tali mulcteris perfide poena:

Si cęlebs/capitis muneribus careas.

Sin coniunx penam amittas ut coniuge męcha

Murere in tetrum fronte furente caprum.



¶ Auctor Lectoribus.

Quens est adhuc aliqua alia de Anatomia & de Arte medica emittere/ sed ineuitabilis alterius negotii culpa/ huic operi finē imposui/ in quo multa pro cōi Anatomia necessaria/ discipulis postitis donauimus/ de cuius fine laudetur qui trinus et unus est/ quē humillimē obsecro / ut me ad maiora distingat/ qui nō est cōtētus de his/ securat ad nostra uberrima/ super Mundani Anatomia comētaria. Valete in Domino candidi Lectores/ quos semper ambimus ac ueneramus/ Iterū Valete.

Immortalis est non errare/ nō falli/ quo circa si qua errata reperies/ mortalibus ascribito/ lingua sepe peruenit animū & scriptura effugit oculos/ scitis quid trāscriptores/ quid pressores/ & quomodo scribūt ac p̄mūt/ Recognito igitur toto uolumine/ alicuius momēti errata (tum trāscriptoris/ tū impet/ foris incuna) hic posita sunt/ Multa tamen mala orthographia/ in uersas/ deficientes / ac superflūes literas / punctuationes labeculāq; obtrusi/ quas uiri docti agnoscēt emēdabūtq;. Valete.

In carta. 2. ubi legiē stomacosa/ legendū stomachosa & sic semp
In car. tertia : prima uniuersalis/ lege prima uniuersalia/ ibidē/ spiritualia/ lege spiritualia. In car. 4. & uena portę/ lege uena portę & sic semp in nominatiuo/ ibidē hypochondriū / lege hypochondrion & sic semp/ ibidē pitonion/ lege pitoneon & sic semp/ ibidē sphōdili/ lege sphōdylī uel spondylī & alibi sic semp/ ibidē acrophalū lege acrophalos. Carta. 10. ascitis/ lege & rectius ascitis/ ibidem hoc intestinū sacus & cetus dictum/ lege semper cecū intestinū. Carta undecima/ clisterizādi/ lege clysterizādi/ & sic semp cū y. Carta. 12. dodedactilon/ lege dodecadactylon/ & sic sempet. Carta. 13. nutritur a uena portę/ lege porta. Carta. 15. pyloroni/ lege pyloron/ ibidem colericas/ lege choleticas/ & sic semp cū ch. Carta. 16. sciatica/ lege & rectius ischiadica/ ibidem dyabrosis/ lege diabrosis/ & ibidē/ a dya. lege a dia. & ibidē/ & btosis seu rosis/ lege tārū/ & brosis/ & depone seu rosis/ & ibidē/ Rixis/ lege & rectius Rexis/ & ibidē/ q̄ incisio iterptat/ lege q̄ ruptio interpretatur. Carta. 18. qua mediāte urinā/ lege urina/ ibidē ascitis lege ascites.

T

Tarsus: folio. lviij. p. z.
 Tépora & usi. fo. xl. p. z.
 Tenon folio. lxi. p. i.
 Tertia vena est torcular fo. lliij.
 Testa fol. li. p. z. (p. z.
 Testiculi fo. i9. pag. z.
 Testiculi mulierum fo. xxiij. p. i.
 Tibia fo. lxiij. pag. z.
 Timi fo. xxiiij. p. i. & f. lxxvi.
 Typos fo. xli. pag. i. (pag. z.
 Torcular fo. xxxvii. pag. z.
 Thorax fo. xliij. p. z.
 Tonfillæ fo. xlvij. pagina. i.
 Trachea fo. xxxiii. & l. xxxv. p. i.
 Tubercula fo. xxi. pagina. z.

V

Vasa spermatica pparantia &
 Variciformia & epididyma / &
 Anëdor & Andros & deffetē
 tia & confervatia & parastrata
 adeniformia fo. i9. pag. i. & z.
 Vasa spermatica mulierum f. xz. p. i.
 Vallecula fo. xli. pag. i.
 Vehiculū nutrimenti fo. ag. p. i.
 Vena basilica folio lxiij. p. z.
 Vena audax fo. xxx. p. i.
 Vena ischiadica i pede l. 68. p. i.
 Vena concava fo. xxx. pag. i.
 Vena chilis fo. xxx. pag. i.
 Vena nutritiæ cor f. 29. & 36. p. z.
 Venę guidex pfundę iuamē/
 ta foli. xxxvii. pag. z.
 Vena ascendens)
 Vena audax fo. xxx. p. i.
 Vena arterialis fo. xxx. pag. z.

Venę sphragindes f. lxxiv. p. z.
 Venę guidex / appoplecticę / so
 mini. pēficles / spermaticę / iuue
 niles / iugulares / organice / fa
 goides / catotides. f. lxxv. p. z.
 Venę ascendentes)
 Vena nutritiæ cor fo. lxxvi. p. i.
 Vena chilis in cor. f. lxxvi. p. z.
 Vena arterialis fo. lxxvi. p. z.
 Venę nutritiæ mamillas & pot
 rantes materiā lactis. f. 36. p. z.
 Vena asclariis / basilica / hepa
 tis / guidex manifesta & ocul
 ra: spatularis / humeralis: cepha
 lica / spermaticę ab Hippo. fo. 37.
 Venę mamillæ fo. v. p. i. (p. i.
 Venę mater / parigibba / chi
 lificōcaua: chilis & aorta descē
 dētes: & emulgētes fo. xv. p. z.
 Venę ad mamillas fo. xvi. p. i.
 Venę plures q̄ arterię. f. xvi. p. z.
 Venę in fronte & in tēporibus
 folio. xl. pagina. z.
 Venę sub lingua & sua nomina
 folio. xlv. pagina. z.
 Vena porta & sui rami folio. xi.
 pagina. i. & fo. xiii.
 Vena ischiadica & saphena fo/
 lio. xvi. pagina. i.
 Venę guidex quomodo phlc/
 botomerut fo. xxxviii. pag. z.
 Venę manus nomina & iuaa/
 menta folio. lxiij. pag. z.
 Venter matricis)
 Vterus) fo. xxi. pag. z.
 Vulua)

INDEX.

Vitrea fo. xi. pa. i. & fo. xii. p. xi.	Vena Basilica)
Vmbilicus ueneris fo. xi. pag. i.	Vena Hepatis) folio. l. iiii.
Vmbilicus & situs locus fol. iiii. & v. pagina. i. & z.	Vena Iecoraria)
Vmbilicalis pars fo. iiii. pagina. i.	Venę umbilicales fo. xii. pag. i.
Verula folio. iiii. pagina. z.	Vena chilis & sue partes f. iiii.
Ventriculus fol. xii. pagina. z.	Vena chilis tripartitur sub pō/ pſite fo. l. xvi. pag. i.
Vermes cucurbitini ubi gene/ rentur fo. xi. pagina. i.	Vena saphena pedis fo. 68. pa.
Vinea est foli homini)	Vertebrum fo. l. xvi. pagina. i.
Vulgeta) l. xliii. pa.	Vola in manu fo. 67.
Vulgena)	Z
Ventilabrum folio. xxi. pa. i.	Zirbus folio. x. pagina. i.
Venter folio. li. pagina. i.	Zinzia mater fo. li.
Vena Regia folio. l. xliii.	Zuendech fo. l. iiii.
	Finis.



Hic finit Vbetrimae ac breues Ifagogę Anatomices diligētius
 q̄ antea figuratę: Authore Eximio Artij ac Medicinę Do
 ctore Dño .M. Iacobo Berengario Carpenſi Regij
 Lepidiſeu Lingobardię ac Bononię ducę Chir
 rurgi ordinarij in Almo Bononięſi Gy
 mnafio docente: addito Plutonis &
 Harpagi diſſecti dialogo: autho
 re Parthenio Foroiulięſi Car
 pi amiciffimo. Anno-uirgi
 nei partuſque 23. Sub
 die .xv. Iulij

Impreſſum & nouiter reuiſum Bononię per Bene
 dictum Hectoris Bibliopolam
 Bononięſem.

REGESTVM.

A. III. B. III. C. III. D. III. E. III. F. III. G. III. H. III. I. III. K. III.

